

本

州

網

目

本草綱目草部目錄第十二卷

李時珍曰天造地化而草木生焉剛交于柔而成根
莖柔交于剛而成枝幹葉萼屬陽華實屬陰由是草
中有木木中有草得氣之粹者爲良得氣之戾者爲
毒故有五形焉金木水火土五氣焉香臭臊腥膻五色焉青赤黃白黑
五味焉酸苦甘辛鹹五性焉寒熱溫涼平五用焉升降浮沉中
農嘗而辨之軒岐述而著之漢魏唐宋明賢良醫代
有增益但三品雖存淄澠交混諸條重出涇渭不分
苟不察其精微審其善惡其何以權七方衡十劑而

寄死生耶于是翦繁去複繩繆補遺析族區類振綱

分目除穀菜外凡得草屬之可供醫藥者六百一十

種分爲十類曰山曰芳曰陞曰毒曰蔓曰水曰石曰

苔曰雜曰有名未用

舊本草部上中下三品共四百四十七種今併入三十一種移

二十三種入菜部三種入穀部四種入果部二種入木部自木部移併一十四種蔓草二十九種菜部移

併一十三種果部移併四種外類有名未用共二百四十七種

神農本草經一百六十四種

梁陶宏景註

名醫別錄一百三十種

陶宏景註○七十種有名未用

李氏藥錄一種

魏李當之

吳氏本草一種

魏吳普

唐本草三十四種

唐蘇恭

藥性本草一種

唐甄權

本草拾遺六十八種

唐陳藏器

食療本草二種

唐孟詵

海藥本草四種

唐李珣

四聲本草一種

唐蕭炳

開寶本草三十七種

宋馬志

嘉祐本草一十七種

宋馬錫

圖經本草五十四種

宋蘇頌

日華本草七種

宋人大明

用藥法象一種

元李杲

本草補遺一種

元朱震亨

本草會編一種

明汪機

本草綱目八十六種

明李時珍

附註

宋雷斅炮炙論
唐楊損之刪繁

北齊徐之才藥對
唐孫思邈千金

蜀韓保昇重註
宋寇宗奭衍義

南唐陳士良食性
唐慎微證類

陳承別說

元王好古湯液

明汪穎食物

陳嘉謨蒙筌

甯原食鑑

金張元素珍珠囊

吳瑞日用

王綸集要

憲王救荒

草之一 山草類上三十一種

甘草

本經

黃耆

本經

人參

本經

沙參

本經

薺

別錄

桔梗

本經

長松

拾遺

黃精

別錄

菱

本經

委蛇

附

知母

本經

肉蓯蓉

本經

列當

開寶

瑣陽

補遺

赤箭

天麻

本經

朮

本經

狗脊

本經

貫眾

本經

巴戟天

本經

棘附

遠志

本經

百脈根

唐本

淫羊藿

本經

仙茅

開寶

玄參

本經

地榆

本經

丹參

本經

紫參

本經

王孫

本經

紫草

本經

白頭翁

本經

白及

本經

三七

綱目

右附方舊八十六新二百六十

卷之四

一

二

三

四

五

六

七

八

九

本草綱目草部第十二卷上

草之一 山草類三十一種

甘草 本經上品

釋名蜜甘別錄蜜草別錄美草別錄落草別錄靈通記事國

老別錄宏景曰此草最為眾藥之主經方少有不

非君而為君所宗是以能安和草石而解諸毒也

甄權曰諸藥中甘草為君治七十二種乳石毒解

集解別錄曰甘草生河西川谷積沙山及上郡二

西上郡今不復通市今出蜀漢中悉從汶山諸夷

中來赤皮斷理看之堅實者是抱罕草最佳抱罕

乃西羌地名亦有火炙乾者理多虛疎又有如鯉魚腸者被刀破不復好青州閒有而不如又有紫甘草細而實乏時亦可用蘇頌曰今陝西河東州郡皆有之春生青苗高一二尺葉如槐葉七月開紫花似柰冬結實作角子如畢豆根長者三四尺粗細不定皮赤色上有橫梁梁下皆細根也采得去蘆頭及赤皮陰乾用今甘草有數種以堅實斷理者爲佳其輕虛縱理及細韌者不堪惟貨湯家用之謹按爾雅云蘆大苦郭璞注蘆似地黃又詩唐風云采芴采芴首陽之巔是也蘆與芴通用首陽之山在河東蒲坂縣乃今甘草所生處相近而先儒所說苗葉與今全別豈種類有不同者乎李時珍曰按沈括筆談云本草註引爾雅蘆大苦之註爲甘草者非矣郭璞之註乃黃藥也其味極苦故謂之大苦非甘草也甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而縫濇似有白毛結角如相思角作一本生至熟時角拆子扁如小豆極堅齒嚙不破今出河東西界寇氏衍義亦取此說而不言大苦

非甘草也以理度之郭說形狀殊不相類沈說近
之今人惟以大徑寸而結緊斷紋者爲佳謂之粉
草其輕虛細小者皆不及之錙績霏雪錄言安
南甘草大者如柱土人以此架屋不識果然否也
根脩治雷斅曰凡使須去頭尾尖處其頭尾吐人
每用切長三寸擘作六七片入甕器中盛
用酒浸蒸從巳至午取出暴乾剉細用一法每斤
用酥七兩塗炙酥盡爲度又法先炮令內外赤黃
用時珍曰方書炙甘草皆用長流水蘸淫炙之至
熟刮去赤皮或用漿水炙熟未有酥炙酒蒸者大
抵補中宜炙用
瀉火宜生用

氣味甘平無毒

寇宗奭曰生則微涼味不佳炙則
溫王好古曰氣薄味厚升而浮陽

也入足太陰厥陰經時珍曰通入手足十二經○
徐之才曰木苦參乾漆爲之使惡遠志反大戟芫
花甘遂海藻權曰忌豬肉時珍曰甘草與藻戟遂
芫四物相反而胡洽居士治痰癖以十棗湯加甘

草大黃乃是痰在膈上欲令通泄以拔去病根也東垣李杲治項下結核消腫潰堅湯加海藻丹溪朱震亨治勞瘵蓮心飲用芫花二方俱有甘草皆本胡居士之意也故陶宏景言古方亦有相惡相反並乃不爲害非妙達精微者不能知此理**主治**五臟六腑寒熱邪氣

堅筋骨長肌肉倍氣力金瘡瘡解毒久服輕身延

年

本經○瘡音時勇切腫也

溫中下氣煩滿短氣傷臟欬嗽止

渴通經脈利血氣解百藥毒爲九土之精安和七

十二種石一千二百種草

別錄

主腹中冷痛治驚癇

除腹脹滿補益五臟腎氣內傷令人陰不痿主婦

人血滯腰痛凡虛而多熱者加用之

甄權

安魂定魄

補五勞七傷一切虛損驚悸煩悶健忘通九竅利

百脈益精養氣壯筋骨

大生用

瀉火熱熟用散表

寒去咽痛除邪熱緩正氣養陰血補脾胃潤肺

李杲

吐肺痿之膿血消五發之瘡疽

好古

解小兒胎毒驚

癰降火止痛

時珍

稍主治生用治胸中積熱去莖中痛加酒煮延胡

索苦楝子尤妙

元素

頭主治生用能行足厥陰陽明二經污濁之血消

腫導毒

震亨

主癰腫宜入吐藥

時珍

發明

震亨曰甘草味甘大緩諸火黃中通理厚德

草氣薄味厚可升可降陰中陽也陽不足者補之以甘甘溫能除大熱故生用則氣平補脾胃不足而大瀉心火炙之則氣溫補三焦元氣而散表寒除邪熱去咽痛緩正氣養陰血凡心火乘脾腹中急痛腹皮急縮者宜倍用之其性能緩急而又協和諸藥使之不爭故熱藥得之緩其熱寒藥得之緩其寒寒熱相雜者用之得其平好古曰五味之用苦泄辛散酸收鹹斂甘上行而發而木草言甘草下氣何也蓋甘味主中有升降浮沈可上可下可外可內有和有緩有補有泄居中之道盡矣張仲景附子理中湯用甘草恐其僭上也調胃承氣湯用甘草恐其速下也皆緩之之意小柴胡湯有柴胡黃芩之寒人參半夏之溫而用甘草者則有調和之意建中湯用甘草以補中而緩脾急也鳳髓丹用甘草以緩腎急而生元氣也乃甘補之意又曰甘者令入中滿中滿者勿食甘甘緩而壅氣

非中滿所宜也凡不滿而用炙甘草爲之補若中
滿而用生甘草爲之瀉能引諸藥直至滿所甘味
入脾歸其所喜此升降浮沈之理也經云以甘補
之以甘瀉之以甘緩之是矣時珍曰甘草外赤中
黃色兼坤離味濃氣薄資全土德協和羣品有元
老之功普治百邪得王道之化贊帝力而人不知
斂神功而已不與可謂藥中之良相也然中滿嘔
吐酒客之病不喜其甘而大戟芫花甘遂海藻與
之相反是亦迂緩不可以救昏昧而君子嘗見嫉
於宵人之意與○頌曰按孫思邈千金方論云甘
草解百藥毒如湯沃雪有中烏頭巴豆毒甘草入
腹卽定驗如反掌方稱大豆汁解百藥毒予每試
之不效加入甘草爲甘豆湯其驗乃奇也又葛洪
肘後備急方云席辯刺史嘗言嶺南俚人解蠱毒
藥並是常用之物畏人得其法乃言三百頭牛藥
或言三百兩銀藥久與親狎乃得其詳凡飲食時
先取炙熟甘草一寸嚼之嚥汁若中毒隨卽吐出
仍以炙甘草三兩生薑四兩水六升煮二升日三

服或用都淋藤黃藤二物酒煎溫常服則毒隨大
小便出又常帶甘草數寸隨身備急若經含甘草
而食物不吐者非毒物也三百頭牛藥即土常
山也三百兩銀藥即馬兜鈴藤也詳見各條

附方 新舊二十五傷寒心悸 升脈結代者甘草二兩水三

傷寒傷寒咽痛 少陰證甘草湯主之用甘草二兩
類要 蜜水炙水二升煮一升半服五合

日二服 張 肺熱喉痛 有痰熱者甘草炒二兩桔
仲景傷寒論 梗米泔浸一夜一兩每服

五錢水一鍾半入阿膠 肺痿多涎 肺痿吐涎沫頭
半片煎服 錢乙直訣 眩小便數而不

欬者肺中冷也甘草乾薑湯溫之甘草炙四兩乾
薑炮二兩水三升煮一升五合分服 張仲景金

匱要 肺痿久嗽 涕唾多骨節煩悶寒熱以甘草三
畧 兩炙搗為末每日取小便三合調

甘草末一錢服 小兒熱嗽 甘草二兩豬膽汁浸五
之 廣利方 宿炙研末蜜丸綠豆大

食後薄荷湯下十丸
初生解毒
小兒初生未可便

名涼膈丸
聖惠方
草一指節長炙碎以水二合煮取一合以綿染點

兒口中可爲一蜺殼當吐出胸中惡汁此後待兒

饑渴更與之令兒智慧無
初生便閉
甘草枳殼煨

病出痘稀少
王璆選方
蓋煎服
小兒撮口
發噤用生甘草二錢半水一

全幼心鑑
以乳汁點兒口
嬰兒目澀
月內目閉不開或腫羞

中
金匱玉函
用甘草一截以豬膽汁炙爲末每
小兒遺尿
草頭

用米泔調少許灌之
幼幼新書
煎甘草一兩二錢水六合

煎湯夜夜服之
危氏得效方
小兒尿血
煎甘草一兩二錢水六合

盡
姚和
小兒羸瘦
甘草三兩炙焦爲末蜜丸緣

眾至寶方
小兒羸瘦
豆大每溫水下五丸日二服

金匱
大人羸瘦
甘草三兩炙每旦以小便秘要
赤

玉函
大人羸瘦
四沸頓服之良
外臺秘要
赤

白痢下

崔宣州衍所傳方用甘草一尺炙劈破以

○梅師方

淡漿水蘸水一升半煎取八合服之立效

七個煨

剉以甘草一兩炙肉豆蔻舌腫塞口不治

甘草煎

濃湯熱漱太陰口瘡甘草二寸白礬一粟

頻吐

聖濟總錄大嚼嚥汁保命

集發背癰疽

崔元亮海上集驗方云李北海言此

搗篩末

大麥麩九兩和勻取好酥少許入內下沸

水溲如餅

狀方圓大於瘡一分熱傳腫上以細片

及故紙

隔令通風冷則換之已成者膿水自出未

成者腫

便內消仍當喫黃芪粥爲妙○又一法甘

草一大兩

微炙搗碎水一大升浸之器上橫一小

刀子露

一宿平明以物攪令沫出去沫服之但是

瘡腫發

背皆甚諸般癰疽甘草三兩微炙切以酒

效蘇頌

圖經諸般癰疽一斗同浸瓶中用黑鉛

一片溶

成汁投酒中取出如此九度令一切癰疽

病者飲

酒至醉寢後卽愈也經驗方一切癰疽

病者飲

酒至醉寢後卽愈也經驗方一切癰疽