

药材工作技术资料汇编

(中药知识专辑)

2

人 民 軍 醫 社

1959. 4. 北京

藥材工作技術資料彙編

(中藥知識專輯)

*

人民軍醫社出版

北京 536 工廠印刷

*

開本 787×1092公厘¹/₁₆ 印張 5 字數 121千

1959年5月第1版(北京)

1959年5月第1次印刷

前 言

去年十一月中旬，中央卫生部在保定召开了一个中医中药工作会议，会议期间分发了由天津市药材公司编印的“中药知识”这个材料收集了许多实际工作中的经验，比较实用，所以稍加整理后翻印发给各单位公阅，作为学习和工作中的参考。

为了做好中药供应工作，希望各级药工同志结合本职工作积极开展对中医中药的学习，特别要求通过各种形式的学习，达到熟悉常用中药的性能、炮制和栽种法。不断总结和交流经验，以互相促进和提高。

总后勤部卫生部

1959年2月

目 录

一、解热消炎藥..... (3)

羚羊角.....	(3)
犀 角.....	(3)
銀 花.....	(4)
牛 黃.....	(5)
玄 参.....	(6)
地 黃.....	(7)
石决明.....	(7)
連 壳.....	(8)
柴 胡.....	(8)
防 楓.....	(9)
荆 芥.....	(9)
薄 荷.....	(10)
黃 連.....	(10)
胖大海.....	(11)
升 麻.....	(12)
白头翁.....	(12)
枝 子.....	(12)
紫花地丁.....	(13)
黃 苓.....	(13)
儿 茶.....	(14)
黃 柏.....	(14)

二、鎮咳祛痰藥..... (16)

貝 母.....	(16)
甘 草.....	(17)
天竹黃.....	(18)
冬 花.....	(19)
馬兜鈴.....	(19)
五味子.....	(20)
細 辛.....	(20)
桔 梗.....	(21)
前 胡.....	(21)

絲瓜絡.....	(22)
桃 仁.....	(22)
紫 苑.....	(23)
猴 枣.....	(23)
瓜 蒌.....	(24)

三、利尿強心藥..... (25)

白 朮.....	(25)
山 藥.....	(25)
澤 瀉.....	(26)
天 冬.....	(27)
琥 珀.....	(27)
木賊草.....	(28)
木 通.....	(28)
車前子.....	(29)
秦 艽.....	(29)
茜 草.....	(30)
枳 椇子.....	(30)
蒼 朮.....	(31)
通 草.....	(31)
麝 香.....	(32)
蟾 酥.....	(33)
附 子.....	(33)
薏苡仁.....	(34)

四、鎮靜藥..... (36)

白 芍.....	(36)
菊 花.....	(36)
枣 仁.....	(37)
全 虫.....	(37)
天 麻.....	(38)
沉 香.....	(38)
龙涎香.....	(39)
胆南星.....	(39)

洋金花.....	(40)	七、通瘀理血藥.....	(60)
甲 片.....	(40)	紅 花.....	(60)
白 芷.....	(41)	三 七.....	(61)
香 附.....	(41)	血 竭.....	(62)
蔓荊子.....	(42)	蒲 黃.....	(63)
半 夏.....	(42)	牛 膝.....	(63)
玄 胡.....	(43)	丹 皮.....	(64)
桑叶、桑枝、桑椹、桑皮.....	(44)	当 归.....	(65)
降 香.....	(44)	白 芨.....	(66)
五、健胃消化藥.....	(46)	五灵脂.....	(66)
木 香.....	(46)	沒 药.....	(67)
豆 蔻.....	(46)	乳 香.....	(67)
郁 金.....	(47)	八、补养强壮藥.....	(69)
蒲公英.....	(48)	人 参.....	(69)
枳实、枳壳.....	(48)	园 参.....	(70)
山 楂.....	(49)	鹿 茸.....	(70)
胡 椒.....	(49)	党 参.....	(71)
吳茱萸.....	(50)	黃 芪.....	(72)
藿 香.....	(50)	莢 肉.....	(74)
龙胆草.....	(51)	肉苁蓉.....	(74)
六、驅虫泻下藥.....	(52)	麦 冬.....	(75)
枳 榔.....	(52)	川 芎.....	(76)
大腹皮.....	(52)	冬虫夏草.....	(77)
使君子.....	(52)	玉 竹.....	(77)
阿 魏.....	(53)	淫羊藿.....	(78)
扁 蓄.....	(53)	补骨脂.....	(78)
鶴 虱.....	(54)	九、附 录.....	(79)
大 黃.....	(54)	密丸操作过程.....	(79)
巴 豆.....	(55)	蜡丸操作过程.....	(79)
番泻叶.....	(56)	糊丸(錠)操作过程.....	(80)
蘆 薈.....	(56)	熬膏药操作过程.....	(80)
輕 粉.....	(57)	熬膏滋(汁)操作过程.....	(80)
郁李仁.....	(57)	制药酒操作过程.....	(81)
葶 苈子.....	(58)	研面散操作过程.....	(81)
大麻子.....	(58)		
草决明.....	(59)		

一、解热消炎药

羚羊角

形态：脊椎动物、哺乳类、种类很多，有胎盘类、反刍偶蹄类、都属羚羊科，面部三角形、口吻尖锐、耳朵较大、眼有锐光、形似鹿又似山羊、性情温和，善跳跃疾走，嗅觉敏感，毛柔滑而密，四肢细长、毛短蹄小，常聚群而居，处于深山中，头上角对生，长圆有轮节、无杈枝、角生长后略向后钩曲，角基中空、有骨塞、角心如笋。

产地：新疆维吾尔自治区之西北部伊犁、伊宁、綏远一带、青海之澤海沙漠地区，西藏自治区北部，内蒙古自治区的大兴安岭一带，国外产苏联的西伯利亚，蒙古人民共和国、澳大利亚等处。

药用部位为羚羊之角，一年四季均可猎取，但春季猎得者色微黄，秋季羚羊脱皮后色莹白，冬季受霜雪烈风侵袭，角表面多呈裂纹品质较差。

规格(一)大枝羚羊角、每枝重三两以上，色白角枝肥壮、皮粗肉细、骨塞占30%~40%多产自新疆、苏联一带。(二)小枝羚羊角、每枝重二两以下，色白而发青、枝细瘦，骨塞占30%俗称青条，多产自青海、内蒙古一带。(三)大头骨每枝重约一两左右、色略黄而润、底粗上细，多产自澳大利亚及蒙古人民共和国一带。(四)羚羊角尖是羚羊角锯下来的尖端一部分一般以为效力较强。

特征和辨别：(一)冲天眼，真羚羊角去除骨塞后，在角的中心，有细孔一条，扁三角形直通尖端，俗称冲天眼。伪角无此孔，如伪制亦不能呈扁三角形。(二)轮环节：在角的表面从角基开始、有轮生环节、到近尖部处轮节一面凸一面凹，凸凹处顺序环生、光滑自然，伪品轮节，二面都呈凸形环纹多是围绕不能顺序环生。(三)血巢在羚羊角的下半段、中有骨塞塞边上有直纹凸出，与角肉的凹直纹(即血巢)相连接凑合甚紧密，伪品因非自然生成，骨塞与血巢之直纹不能连接相合。(四)丝纹，羚羊角表面除轮生环节外，还有细丝纹，有条不紊，伪品丝纹则紊乱。

炮制法：去掉骨塞，用温水泡透镑片，亦有不用水(燥镑)惟羚羊性质坚硬，燥镑片张碎小，入成药多用铁锤成细粉，羚羊尖磨粉或磨汁用。

包装贮藏：木箱和瓶盒均可。

功效：有抑住血压、预防中风及退热功能，治脑溢血、脑膜炎、伤寒脑症状等症，又治震颤麻痹，用于各种热病之有犯脑倾向时如高热头疼，精神不安昏谵、瘧疾、手指擅动搐搦等，中医以为对平肝熄风、清热、安神除邪气、惊梦、狂妄，疗伤寒时气塞热有卓效。

犀角

属哺乳动物奇蹄类为犀之角。

犀牛体躯略小于象，好栖于池沼湖泽等阴湿之地或息于山林地区，以树叶青草为食，性愚钝视力甚弱，但听觉嗅觉均极敏锐，皮厚而坚甚粗糙，毛稀疏寥寥，头长略呈三角形，属

上长下短，在鼻上生一角者为“单角犀”，除鼻角外另在额头骨处又生一角者为“双角犀”。

犀角的用法：

入湯剂多镑片或磨汁冲服或剉末吞服。

入丸剂磨細粉。

外敷磨汁涂之。

犀角性苦酸咸寒无毒。

效能：清热解毒、溫病大热、癰疹毒热、吐血衄血、譫語神昏、痈疮肿毒、惊风抽搐、（錢氏小兒方）用犀角尖磨濃汁飲之、治消毒解热。

著名方剂：犀角地黄湯“治伤寒溫病，热伤血分、吐血衄下血、妇女倒經、妊妇吐血、小兒痘疹、喉痧重症”。

清張氏医通方：“犀牛解毒飲”配連壳、牛蒡子、荆芥、防风、銀花、甘草、治胃热咽肿、便秘、痘疮、发疗。

清許剂川：“清毒化癰湯”配大青叶、銀花、連壳、生石膏、知母、甘草、地黄、丹皮、生別甲、梗米、治瘟癰身燒热重、色紫、神气不清、口渴思凉，可吃水果，并可加郁金汁以解火毒。

入紫血散：治大人小兒癲狂，一切煩热。

入局方至宝丹：治中风不語，癲狂扰乱。

入牛黃抱龙丸：治小兒恍惚惊悸，痰涎壅塞。

明李时珍本草綱目論犀角曰磨汁治吐血、衄血、下血及伤寒蓄血、发狂譫語、发黄发斑、痘疮稠密、內热黑陷、或不結痂、泻肝凉心、清胃解毒。

銀 花

別名：金銀花、忍冬花、双宝花、双花、蜜銀花、济銀花、山銀花、土銀花、頂銀花。

产地：河南嵩山五指岭下之密县、登封、巩县、荥阳一带，山东平邑、費县蒼山、蒙阳、鄒县、滕县、峯县等县，广西貴县、崇善，安徽滁县、泰安、六安，浙江金华、兰溪、新昌，陕西南郑、洋县，四川万沅，貴州安顺、毕节，湖南宁远以及广州、江苏、辽宁等省均有出产。以河南所产品質为全国之冠，山东出产数量大。近年来每年山东的出产量均在80万斤左右，除供应国内医药应用外还运銷外国。据統計1956年山东出口的金銀花就有十六万八百余斤。

种植金銀花在山东有扦插、压条和分株三种繁殖方法，其中以扦插繁殖法为最好，因为金銀花扦插生根容易，并便于剪取插条运往其它地区进行扦插繁殖。因此在山东平邑、費县、蒼山等县农民多年来均采用扦插法来繁殖金銀花，不論在春季和雨季均可，但山东一般多在七、八月間。但無論在什么时候扦插，均应掌握在三种花采摘完毕，大雨透地时进行，因为这样既不影响金銀花当年产量，又可保証插条成活。

产季五月采摘要在太阳出来之前，采含苞未开的花蕾，花蕾以白色为好，如青色的还没有成熟。从开花至摘花期时为时仅短短半月，所以要掌握時間，集中力量采集白色含苞的花。如当天摘不下来，第二天花开放了质量就有影响，如果太阳出来以后，花蕾就要发軟采下来容易敗坏。

原生藥加工：采摘金銀花时期正是雨季，因此农民多掌握在晴天的早上进行采摘，并且摘下来的鮮花，要根据品質的优次，分別放置，分別晾晒（河南产区一般通风阴干）。晾晒时

要找干燥有太阳的地方，先鋪上席，然后把摘下来的金銀花放到席上，攤的薄薄的，当天把它晒干，这样花的色澤好。但須注意攤好后就不能再翻，如果再翻动就会就花变黑，降低质量。如当天不晒放上一夜，第二天再晒也会变色。如果采后不晒就堆起来，容易发生霉烂，造成損失。另外摘下来的花也不要放土地上晒，因为放到土地上晒，花不干淨，并且如遇阴雨天气收集时經過翻动，容易变色，降低质量。

品質鑒別：主分三大类：（一）南艮花又称怀艮花，主产河南密县，又分东山貨和西山貨：（1）西山貨（密县、登封所产）质高，主要原因黄土高原雨量少、气候冷，采收期与东山相差迟15天，故所产色青白、有骨气、握之刺手，用沸水冲之，其头朝下。又以密县产最好，故又名密艮花。（2）东山貨（汇水县以南荣阳所产）色黃白，握之泡軟。此外，鄱陵、扶沟、南阳亦产，但品質較差，其中以密县产最多，占五指岭全部产量50%强。（二）东艮花又称济艮花，主产山东平邑，花色略黃，骨气較軟弱，有时花苞已开，致品質較低，惟产量大，銷售面广，其中以平邑产最多，占总产量的50%以上。（三）山艮花又称土艮花，多系野产品，主产安徽、广西、浙江等省，花色板紅，花苞多已开放骨气軟弱，且多梗叶，品質較次。

包裝：“南艮花”一般装极箱，箱內四周衬紙，箱外血料混合固封。“东銀花”因为除銷往国内各省外，还出口远銷南洋各地，它的包裝共分为两种，一种是草席包裝，一种是广东蒲席包裝。（一）草席包裝，先在双层草席里鋪一层防潮紙以防金銀花受潮变质，降低质量，席包长约3尺（99公分）寬1尺7寸左右（53公分），每包淨重120市斤，装好后的席包，表面要整齐，并且需用麻繩捆好。（二）广东蒲席包裝，是用机器打包，每包淨重120市斤，現在出口的金銀花多采用这个办法包裝。山銀花，一般装麻袋和席包不一。

保管貯藏：在貯藏时必须注意以下两点：第一要防虫蛀，第二要防受潮发霉变质。因此必須把它貯藏在干燥的仓库里，垛底要垫起离地約1尺，并且經常注意檢查，以防虫蛀或受潮。

泡制：拣淨枝梗草叶洗淨阴干备用。

功效：为散热解毒，消炎治溫热腸炎下痢均有效。并为外科良藥，成藥有金銀露，取花蒸餾香气芳郁、味甘、能开胃寬中散暑清火，小儿飲之解疮毒。南洋侨胞用以代茶作飲料。

牛 黃

基本脊椎动物哺乳类，为牛胆囊之結石，牛生黃石，即不思飲食，身体日漸消瘦，此即为牛生黃之預照，杀牛后胆有硬块时即为牛黃。将胆汁放出取黃晾干即为藥用之牛黃。但亦有少部分生在胆管內及肝胆之間的，名管黃、肝黃、均供藥用。

規格形态：牛黃分京牛黃、东牛黃、西牛黃、管黃、肝黃。国产牛黃、进口牛黃分金山牛黃、印牛黃、又分尖子黃、大片黃、小片黃。

牛黃有长圓形、扁形、三角俗称乔麦粒形、四方形、米粒等形象。

京牛黃、东牛黃、西牛黃外褐黃色，內有間隔均匀薄层，褐黃色及黃色。西牛黃有部分层次間帶白膜者，正齐不碎者佳。管黃、肝黃、质坚实褐黃色和綠黃色、无层次破碎者次。国产牛黃是人工制造者，圓球形及扁圓形或者是牛黃粉。金山黃及印度牛黃外褐黃色，层次間隔均匀，印度牛黃层厚且帶白膜，以正齐不碎者佳。

牛黃晾干法：取得鮮牛黃后，大致晾干方法分以下两种：

將鮮牛黃从胆內取出用灯心草裹之挂放阴凉处，約經七八天即可全干，如此晾干色澤鮮

艳，质量較佳。

將鮮牛黃从胆內取出后用通草裹之，外用毛头紙包好，放在較暖和地点使其阴干，其色澤鮮艳，质量亦佳。

鮮牛黃严禁日晒，以防起白点及破裂。

品質鑒別：京牛黃、东牛黃、味清香、外褐黃色及黃色、色澤鮮艳光潤、質細膩、破碎面有間隔均匀的薄层，鮮黃者佳。外土黃色，无光澤質粗糙，破碎者味腥臭次。

西牛黃：味清香，略帶青草味，外褐黃色及黃色，色澤鮮艳光潤，質細膩层薄者佳，品質略次于京牛黃及东牛黃。外土黃色，无光澤，質粗糙破碎味腥者次。

金山牛黃：棕黃色及黃色，略有清香味，有裂紋，外层光亮，但不細膩层次厚，次于京牛黃，不破碎者較佳。外粗糙色淡，破碎灰黃色者次。

印牛黃：外土黃色及黑黃色不等，土腥味，层厚，次于金山黃。外土黃色及黑黃色破碎質粗糙有白膜层者次之。

真偽鑒別：鮮牛黃以針刺之拔出后針不帶黃，或口嘗有一种很敏感的清涼芳香味微苦，質輕松者为正品。

偽品：口嘗发酥，溶化特別苦，无清涼芳香味的感觉，質坚硬，以針刺之拔出針上帶有黃者为偽品。

干牛黃破碎面有显著之天然层次，且薄而均匀，口嘗有一种很敏感的清涼芳香味，將牛黃蘸水涂于指甲上（俗称透甲）用水洗一时不掉黃色者为正品。

偽品：口嘗发酥特別苦，但无清香味，涂于指甲上經水洗則无黃色。

产地：河北、河南、山东、山西、內蒙等地产者为京牛黃。辽宁、吉林、黑龙江及朝鮮进口者为东牛黃，陕西、甘肃、青海、西藏、四川等地产者为西牛黃，美国及南美洲的阿根廷、烏拉圭、巴拉圭、智利、玻利維亞等地产者，澳洲亦有出产为金山牛黃。年产約 300 斤至 400 斤，印度产者是印牛黃，但进口商品其他国家亦有出产。

儲藏方法：放干燥处，防潮湿风化变质。

主治效能：有强心、解热鎮疼利胆作用、治癲狂、小儿惊风抽搐等症、适应于伤寒、肺炎等热病。

玄 参

外方用名：大元参、黑元参、烏元参、奎角参、陈元参、潤元参。

市場別名：元参、川元参。

科目形态：系玄参科草本植物家种于山野平地，亦有少数野产。莖方高五六尺、叶淡綠色，对生有柄，卵形或长卵形鋸齿边。夏秋間开淡黃綠色之唇形花，花后結蒴果为小卵形。根为肥大之直根，形似酒瓶，鮮时白色經加工后其色变黑，“玄”黑色之意。其莖微似人参，故名玄参，供药用。

产地：“浙江” 甯桥、临平、石門、石灣、东阳、义烏、磐安、台州、温州、桐廬；“四川” 瀘州、金堂、宜宾、巴中、达县、万县、培陵、溫江；“陕西” 南郑、汉中、城固；“貴州” 遵义、綏阳；“湖北” 建始、恩施、通城；“湖南” 平江以及甘肃安徽等地均有出产。

采制：四、五月及九、十月为采收期，以九、十月所产品质优，其他季节較次。采得以后，去掉莖蘆，堆放屋內进行发汗，用稻草盖之过三天后翻动一次，再盖好稻草发汗在七、八天

后取出，以日光晒干，（有的地区采用盖过后晒干）便成为黑色有油润的玄参。

品质：玄参分家种和野种二种，家种质坚肉厚，野产质松肉薄；浙江玄参为家种，枝头肥大短壮；温台一带所产长枝为多，内色乌黑油润；四川玄参，枝头瘦小而瘪，内带白心，有的有筋；陕西玄参，枝头长瘦，内色黄褐；贵州玄参为野产，形似带皮天冬，体质较软，皱纹较多，内色黄白，质松肉薄。一般认为浙江所产品质较高。

包装：一般装筲箕每付约160—200斤，有的地区用麻袋或席包装。

保藏：玄参容易发霉变质，因此在保管中必须注意。进仓库时必须检查，没有干透的必须晒之干透，堆放高燥通风仓库，清明后亦可用硫磺熏过后日光晒之，可防蛀防霉变质。据经验谈当年产品内色不能黑透，故应用隔年货最佳。但此品易发虫蛀，故不宜存之过久。

泡制功效：用清水洗净泥沙，润潮使软，去蘆切半分厚横片。主效解热消炎，治咽喉疼痛，清肺热咳嗽，肿瘤瘰病滋阴液，清肾火作为强壮剂。

地 黄

外方用名：生地、鲜地黄、干地黄、熟地黄。

市场别名：鲜生地、生地黄、毛元、熟地、大直皮、小生地、中生地、大生地。

科目形态：系玄参科多年生草本植物，多数栽培亦有少数野生，茎高尺许，全枝密生短毛，叶厚而互生，长椭圆形，锯齿边有皱纹，夏季开紫色或淡黄色五裂之唇形花，作排列状，实似小麦，地下根大小长短不等，皮赤黄色，采制地下根供药用。

产地：“河南”温县、博爱、武陟、孟县、沁阳一带；“河北”津郊、保定专区；“浙江”苕桥、临平以及陕西、湖北、等省均有出产。

采制：九月至十月为采收期，鲜货形似山薯，皮赤黄色，肉粉红色。刨出后为吸收它的水分，用火在炕上焙之，内部渐变黑色，而生粉液，焙至九成干此即原货。如做园货在炕焙时长条的用手捻圆，即为园形成货。炕焙时注意油质渗出，影响质量。“熟地黄”系将干地黄经蒸晒而成，（津市蒸三天三夜）加黄酒（每百斤加75斤黄酒）而制成。

品质：鲜生地又叫鲜地黄，条长大小如小指，黄赤色肥大润泽为优。

干地黄又叫生地，皮灰褐色，肉紫黑色，个大形圆为优。

熟地黄又叫熟地，以个大色黑如漆，味甘如飴为优。

熟地制法：将生地去净杂质，洗净泥土晒干，每斤用黄酒12两，共装入铜罐内，盖严封固，将铜罐放于大锅内，隔水蒸之，待锅内水沸，连续蒸两昼夜取出，将熟地倒在铜槽内晾晒，俟外皮粘液稍干应用。

包装贮藏：鲜生地一般采用蒲包或荆条筐，必须保存于砂土中则脂润。

干地黄：荆条筐或麻袋装每付200—300斤、保藏容易耐贮藏，越陈越好，置阴凉干燥处即可。

泡制功效：鲜生地洗净切咀为解热止血药，仅可清热，不入补剂。

干地黄洗净泥土切片为除寒热积聚五劳七伤下血，血虚、糖尿病、肺结核之潮热等有效。

熟地黄切片为滋肾补血强壮剂。

石 决 明（又名海决）

石决明为介壳单片之贝壳，附石而重，形圆如卵而扁，口阔，外有疣状之吸水孔九至十

个，（故又叫九孔石决明）大小依次并列，其中四、五孔皆开口，具有不正齐之漏纹，外部兼沾有苔类，外观如岩石，其内面带珍珠色有光彩。大小不等，随产地与种类而异，大者七、八寸，小者一、二寸不等。

产于我国台湾、海南、广州、旅大、青岛等沿海地区。

生产季节一般在四月而夏秋之间产量较多，十月间天气转寒产量则减少，采捕时渔民必须潜水捞取，剥去其肉，外壳即为药用之石决明。

包装有草包或麻袋装每包约150—200斤。

功效：治肝肺风热，青盲内障用作眼科药，又为解热驱风药。

連 壳

科属形态：木犀科，落叶乔木，树高约5—6尺，枝干长条状，形似石榴树，叶椭圆形，有锯齿边，春季开黄白色四瓣花，花落后结蒴果，形似枣核，果皮坚硬，外皮有显著之白色斑点，青色及黄色。果壳两瓣组成，壳内光滑，有一竖立隔膜每隔内含有若干枚子实，长棱形，其子实有油质，味芳香，其果壳供应用。

产地：山西之沁沅，晋城、阳城、路安、黎城、安泽；河南之辉县、济沅、恒庆、滏池、伊阳、洛阳；湖北之紫荆关；陕西之雒南、丹凤、白河、商县、洵阳、耀县、潼关，以山西产量最大。

采制：青壳六月间采集，采集后放入蒸笼内蒸约20分钟，视连壳全部蒸透后（连壳裂口）取出以烈日晒干即可。

品质鉴别：青壳色绿瓢大者品质佳，棕绿色秕瘦者品质次。

落壳：棕黄色瓣肥大者品质佳，灰黄色秕瘦者品质次。

规格：连壳分青壳、落壳两种，青壳色绿正齐瓢大，无枝棍者佳；棕绿色，瓢小秕瘦者，代枝棍者次。

落壳：棕黄色瓢大，均匀无枝棍者佳，灰黄色秕瘦不均匀代枝棍者次。

包装贮藏：席包装，放干燥处，防潮霉烂变质。

炮制：将连壳用搓板搓成两瓣，去净心及杂质即可供药用。

功效：主治寒热瘰癧，痛肿、结热等症，利尿、通经解毒。

柴 胡

科属形态：繖形科，多年生草木植物，自生于山野。春季自宿根处生芽，夏季抽出长茎，高约1—2尺，叶互生，披针形，先端尖，底部窄细，有平行叶脉，茎质硬，夏秋顶端开复繖形黄色小花，花落后结实，根褐黄色，或红褐色，内黄白色，柴性、内性两种，根直生有权，其根供药用。

产地：河北省之涞沅、易县、石家庄、通县、唐山、张家口、承德等专区均产；山西之榆次、长治、雁北等专区及陕西、内蒙、东北、河南、安徽、江苏、浙江、四川等地均有出产。

采制：初夏采集，采制后去净茎苗及泥土晒干即可。

包装贮藏：席包装及筐装、竹篓装，放干燥处，防潮霉生霉变色变质。

炮制：北柴胡、软柴胡、红柴胡用水洗净泡透润之横切片，晒干即可供药用。竹叶柴胡

去淨杂质即可供药用。

功效：腹泻、胃中結气、飲食积表、舒肝开郁、解热。

防 楓

外方用名：楓肉、北楓、笔防风。

市場別名：关防风、东防风、西防风、口防风、云防风、泡水防风、山防风、白毛茸。

科目形态：系繖形科多年生野生植物，莖高一尺至三尺，莖平滑中空，叶三、四羽状分裂，叶片狭长叢生有长柄，质坚无毛有光澤，头尖锐，夏天开五瓣白色小花，嫩叶可作膳食。有雌雄二种，雄防风不开花，体肥质优，雌者开花結籽，采取其根莖为药用。防者御也，本品为疗风要药，故名防风。

产地分布东北、内蒙、河南、山东、云南、陕西、甘肃等省、主分五种商品类型。

(一) 关防风又称东防风、苏风，主产黑龙江之安达、泰康、林甸、龙江、泰来、洮南、白城以及内蒙东蒙之突泉、通辽等地所产統称关防风。外皮淡黄或灰白，有横順皺紋，枝粗性柔糯，肉厚而有滋潤，內色黄而有菊花心，一般认为品质最优。

(二) 西防风又称口防风，生产内蒙呼和浩特，大青山脉之武川、丰鎮、托克托、察素齐等地，統称西防风，品质較关防风为次；內紧坚硬，条粗，外皮灰白或灰黄条长，少滋潤。

(三) 云防风，主产云南蒙自、三溪、尤謀等地，体硬肉結，枝杈多。

(四) 泛水防风，主产河南荣阳、泛水、涉县、济沉，山东即墨、棲霞等地，外皮淡黄多皺紋，內色橙黄，肉帶木质而堅結。

(五) 山防风，主产河北易县、唐山，山西交县、平陆、武乡等地，皮白細，枝杈多，內色淡紅质松泡，品质較次。

采制：春秋二季，均可采到，一般以春产为好，采回后，去其泥土、殘穗及毛須，晒干后，按粗細长短分別捆成半斤左右小把再晒純干，每百斤可晒成65斤純干貨。

規格：以干燥外色淡黄或灰色，枝粗性糯，肉厚而潤脂，內有黄潤菊花心为好，弯曲而瘦如鼠尾者为次。

包装貯藏：一般采用麻袋或席包装，防风易受虫蛀，在春末时用硫磺熏一次，再經阳光略晒后，稍一通风，放置高燥通风仓库。在八、九月間接前法熏一次可以防蛀。

泡制：去蚯蚓头节，用水洗淨，潤透使軟切薄片。

功效：为解热鎮痛药，可治感冒头痛、頸部强直，关节痛等，并有利尿作用。

荆 芥

科属形态：唇形科，一年生草本植物，家种与野生，莖高二三尺不等，方莖紫紅色，有細笔毛，叶对生，羽状分裂，裂片窄长，叶腋間对生枝杈，夏季莖頂端开淡紫紅色唇形花，成穗状花序，长约三至五寸不等，花落后，結細小的子实，其全草有强烈的芳香味，全草供药用。

产地：河北省之承德专区、通县专区、保定专区、石家庄专区、邢台；辽宁省之綏中，山西、河南、山东、江苏、浙江、安徽、四川、貴州、江西等地均产。

采制：秋季采集后将全草晒干即可，（鮮荆芥物分咀晒干即可）荆芥穗是将荆芥穗掐下晒干即可。

品質鑑別：荊芥莖紫紅色、堅實、味芳香者佳；莖綠褐色，質松泡，味臭者次。

規格：荊芥分、全荊芥、芥穗，全荊芥、紫紅色、莖葉穗俱全，不碎者佳。芥穗即純穗，無枝梗及葉、雜質者佳。

包裝：席包裝。

貯藏：放乾燥處，防潮濕生霉變質，因荊芥屬於氣味藥，若受潮濕即失去療效。

炮制：用淨水將荊芥泡後，潤透橫切一分咀曬干即可，芥穗用手搓碎去淨枝梗雜質即可。

功效：散風熱、清頭目、利咽喉、消痞腫。

薄 荷

科屬形態：唇形科多年生草本植物，春季自宿根處生芽，莖高二、三尺，方莖中空、對葉生橢圓形，邊緣有鋸齒，葉柄短，葉腋間輪生淡色唇形花序，六七月間采割，采割後又生出芽，至九月間再割，其地下根莖橫生，新根白色，老根土黑色，其地上莖葉味清涼，供藥用。

產地：江蘇之嘉定、太倉、南通、崇明、蘇州、海門、常熟、啟東，浙江之杭州、苕橋、臨海、寧波，江西之吉安、福泰、吉水，河北之安國，河南之禹縣，山東泰安等地均有出產。

品質鑑別：江蘇、浙江產者其莖紫紅色味芳香清涼，品質佳，河北安國產者其莖紫綠色均有，莖粗大，味芳香清涼，略帶腥臭味，品質較差。雜路薄荷味短且臭，品質最次。

包裝貯藏：席包裝，薄荷葉席包裝及蕒裝，放乾燥處，防潮濕，其揮發油溢出變質，薄荷是清涼劑，夏季不生蟲。

炮制：將葉去淨，其莖用淨水泡透，橫切分咀，曬干即可供藥用，葉揀淨雜質即可供藥用。

功效：解穢惡、散頭風、心昏眩，並可供工業及食品業調劑用。

黃 連

別名：川連、小川連、川雅連、真川連、雅連、野連、嘉定連、味連、南岸、北岸、運連、峨嵋連等名稱。

產地：四川峨嵋淡雅、嘉定、龍池等地一帶所產為野連，四川涪陵專區石柱縣之黃水壩、橋頭壩、石家壩，湖北來鳳、巴東、恩施（施南）、建始、利川、宣恩等地，因位於長江南所產為南岸連或稱南連，其它是萬縣專區所屬城口、巫山、巫溪的大連、大昌，湖北之房縣、山竹、竹溪等地所產品質極佳，因地屬長江岸稱北岸連或北連，一般認為南連以蠶勝，北連以質勝。南北岸連總的稱味連，天津市坊稱川連，雲南維西、騰中、麗江等地所產為運連，貴州織金、納雍、赤水等地所產亦稱野連，湖南桑植、東安、道縣、城步、新寧、汝城、宜章等地有野生和栽植品，陝西鳳泉、鎮坪、安康、平利亦有種植，其它如浙江金華，安徽，蕪湖，福建沙縣，內蒙古自治區亦有發現。

種植時間每年約分春秋兩次，以春季四月至六月栽培者為最佳，一年生小苗，二年後苗高約四寸，葉青色，香味很濃，枝頭分節，每一節為一年，培植四年後可以采創，但品質較低，最好七年采創，則年分已足，根條肥壯。藥用其地下根莖，形似連珠而色黃，故名黃

連。

產季和原生藥加工：每屆十月採掘其地下根莖，先放在室內通風一、二天再置于火坑中，用炭火烘烤，烤時隨時攪動，使受熱均勻至完全乾燥后用竹制槽籠撞擦，去掉其根須及沙土即成。

品質鑒別：（一）“峨嵋連”野連的一種，又叫連王、鳳尾連、加定連多產峨嵋高山，表面褐色，內深黃而充實，硬刺軟蘆略帶短苗，品質為黃連之冠。（二）“雅連”野連的一種，多產雅安峨嵋一帶，形細長而彎曲，多做單枝狀，上有細長的苗，外皮灰黑，內色金黃或黃綠色多連莖捆把，品質亦佳。（三）味連又稱鷄爪連，天津市坊稱川連，為四川、湖北之種植品，以長江分界，分為北岸、南岸兩種，種植的刺都是軟性，蘆都是硬性。（1）北岸連外色深黃，內色紫色，體肥質堅，皮細光滑條勻，不帶莖苗，品質雖不及野產，但在種植品種中質量最好。（2）南岸連外色淡黃，內色深黃，體瘦質松，皮粗多毛，不帶莖苗，品質較北岸連劣低，但產量豐富。（四）雲連多是野產，一般在雲南山區，內外包淡黃，體瘦條細，質堅無毛（亦有部分多毛者），不帶莖苗，質量亦佳。（五）貴州、湖南、陝西、亦有栽培品，色淡條細。（六）土黃連亦稱野連，產浙江、福建、安徽，品質較次，條細而小色暗淡。

黃連以外皮紅黃色，粗皮脫落處顯赤紅色，肥壯無毛似蠶之拘攣狀，內色赤紅者為最佳。

包裝各地所產各不一致，有用麻袋、木箱，也有用竹蓆。根據它品質要求，使之不被壓碎、不受水漬的黃連比較名貴，故以木箱包裝為宜，不但能保證不被壓碎，且能保證其質量潔淨，並不易受潮。

保管養護黃連不生蟲含潮容易發霉，已發霉即直曬後撞擦去淨，並將灰毛掃淨，（倘受水則變黑色）在產地宜于足置高燥通風倉庫。

炮制法去淨泥土及須根，洗淨切片或搗碎生用，亦有酒潤切片，一般有下列三種：

（1）酒炒：用黃酒將黃連噴勻微炒至紅黃色，因酒性熱而上浮，用酒炒，取其引藥性上行，以治上部火熱，如頭暈目赤牙痛等。

（2）姜炒：用鮮姜熬汁浸炒，法每斤黃連用鮮姜一兩先將姜搗汁盛入噴咀壺內，再把黃連放入鐵鍋內置爐火上炒至色微黑將姜汁勻噴于其上，再微炒即成。因鮮姜性溫，能治黃連之苦寒，故適用於中部，除胃熱而不傷胃。（3）萸炒：用吳茱萸熬汁浸炒，因吳茱萸味辛性燥，能助黃連除濕熱之功，主治泄痢諸症。

功效：清心火、除濕熱、止泄痢、治頭暈、目赤、煩燥、腸辟泄痢，瘡瘍腫毒等症有效。
中醫普通用量三分至一錢，大量一錢至三錢。

胖大海

別名：大海、安南子、大發、大海子、大洞果。

象梧桐科植物之干燥果實。

產于越南泰國。

產季一般在年四至六月。

品質：形狀似橄欖，外皮深棕、褐黃、有皺紋似核桃，以水泡之裂皮發脹，膨脹性特大，味微甘。

功效：清凉性，消炎鎮咳、祛痰藥，适用于重伤风、干咳者咽喉噪痛、咽喉干灼、咳嗽声音不出，干咳无痰、牙龈肿痛，以及喉头气管粘膜发炎等症有效，又可用为潤腸通便藥，大便干燥及便秘也有疗效。

升 麻

别名：黑升麻、火燎升麻。

科属形态：毛茛科，多年生宿根草本植物，野生于山野，春季自宿根处生芽，莖高三、四尺，园莖中空，叶为杂三出叶，边缘有大锯齿，頂端尖，有长叶柄，夏秋間莖生白色穗状繖形花，根黑褐色，呈不規則之块状，有多数窟窿及多数須根，其块根供药用。

产地：河北省之保定专区、通县专区、唐山专区、張家口专区、承德专区、石 家 庄 专 区，辽宁省之本溪、海城、辽阳、綏中、岫岩、凤城、寬甸、开沅，内蒙之大青山，山西、吉林、黑龙江等地均产。

采制：秋季采刨，采集后将須根晒干，再将升麻用火燎之，燎时要注意火的大小，以免火大将升麻燒坏或火小燒不掉須根，視其須根燎掉时，即可取出晒干即为成品。

品质鉴别：以北口产者块根肥大，无須根黑褐色者佳。根块瘦小有須根者次。

包装贮藏：筐装及席包装，放干燥处，防潮湿生霉，夏季可翻晒一次，以免虫蛀。

炮制：用淨水浸透略潤横切厚片晒干即可。

功效：解热、解毒、疗头痛、风热、肿毒、咽喉肿痛。

白 头 翁

形态：生于山野向阳处，春天出土最早，全株密生白棉毛，叶由根生，羽状深裂，里面有茸毛，四月間由叶梗生叶处中間再生出花莖，长2—3寸，頂端生一花，倒垂，长园形，成壶状，由6个大的花瓣組成交叉成两层，外层瓣的茸毛較內层长，里面平滑无毛，紫青色或紫紅色，花落后变为白色的长細毛，形似蝇拂，根药用，根为不規則扭曲园柱形，有纵紋粗糙，长2—4寸，外皮褐色，內黃褐色，頂端靠叶处密生白色茸毛。

产地产季：安徽、湖北、山东、河北及东北各省均产。4—5月采集开花时佳。原生藥加工：采挖后去掉莖叶除淨泥土及細須根，保留頂端白茸毛晒干。

規格包装：頂端有白毛发白色，中匀条者佳。席包、筐装。

儲藏：放干燥处，防霉防虫。

炮制：洗淨潤透切厚片。

用途与效能：清热凉血疗伤风治赤痢。

枝 子

科属形态：茜草科，常綠灌木，野生与家植，干高四五尺，叶对生，有短叶柄，叶卵园形，有光澤，夏季开六瓣回旋花，白色味芳香，結果橢园形，有六、七条纵棱，頂端尖，基部略尖，形似青果个小，果皮紅黃色，皮薄，內皮金黃色，內仁集生长园形，紅黃色，子实扁圆形，似辣椒子紅黃色，其果实供药用。

产地：江西之平凉、南昌、樟树、水丰、高安、新淦，湖南之湘潭、衡阳、郴县、邵阳、常德专区，湖北之咸宁、鄂城、长阳，浙江之溫州、金华、兰谿，福建之泉州，

江苏等地均有出产。以江西产量最大。

采制：秋末冬初采集，采集后放开水锅内煮约20分钟，视其煮透为度，捞出后放日光下晒干或用炭火炕干，以保持其色泽。

品质鉴别：江西、江苏产者皮薄色红仁饱满品质佳，浙江、湖南产者个大皮厚品质较差，福建产者个特大皮厚，根据习惯品质最次。

包装贮藏：竹蓐装或麻袋装，放干燥处，防潮霉烂变质。

炮制：去掉杂质，用碾子轧碎过细筛炒用和生用。

功效：清火利小便止血，胃病忌用。

紫 花 地 丁

科属形态：堇菜科，紫花地丁属，越年生草本植物，每年五月间种之，来年五月间即可成熟，春季丛生蔓莖，长约四、五尺不等，莖细有棱，叶互生，花叶形似香菜叶，四月间叶腋抽出花莖，开紫色四瓣小花，花落后结蒴果，长约五分、宽约1分许，内有黑色光亮子实，扁圆形，边缘刀状，其全草均供药用。

产地：天津专区、盐山、静海，山东掖县，河北之石家庄专区，江苏之苏州，浙江之嘉兴等地均产，辽宁亦有出产。

采制：五月间采集后以烈日晒干即可。

品质鉴别：天津专区、盐山产棵小莖软黑子苦味，色绿，无根不碎者佳，苏州产者色淡黄，子为灰绿色，叶及柄均有白毛，无苦味。

包装：席包装，江苏大多用竹蓐装。

贮藏：放干燥处，忌潮湿，霉烂变质变色。

炮制：用清水洗后润之，横切三分嘴晒干即可。

功效：治一切痈肿发背、疔、疽、瘰病、无名肿毒、恶疮。

黄 芩

别名：黄芩茶根、枝芩、枯芩、绿芩、东芩、凉芩。

科属形态：唇形科。多年野生草本植物，春季自宿根处生芽，莖高二尺余，叶对生，无叶柄，呈披针形，顶端尖锐，叶腋间生小枝，夏季顶端开紫色唇形穗状花，花后结实，形似球状，其根外皮棕黄色，直生，年久者条粗，内有空心，其根供药用。

产地：河北之永德专区、隆化、平泉，保定专区之涞沅、易县，石家庄专区、唐山专区、张家口专区、邯郸、平山、迁安，山西省之汾阳、交城、永济、夏县、长治，内蒙之大青山，辽守之凌沅、朝阳、北票，陕西甘肃、山东之沂蒙山区及胶东莱阳等地均有出产。

功效：为清凉解热剂、对胃肠炎症之呕吐、下痢、黄疸、肺炎发热有效，并治小儿鼻血，山东、胶东产者为东芩，河南之涉县等地产者为凉芩。

采制：春秋两季采制，以秋制者最佳，采制后晒半干，用荆条筐筛去外部老皮，再晒至七、八成干时，二次筛之筛后晒全干再筛之，视其外面无老皮时即可。东芩及凉芩大多数不去皮晒干即可。

品质鉴别：条长均匀，黄色，无空心者佳，承德专区产者条粗长质坚实，空心小品质佳，条短粗柴性，空心带皮绿黄色者品质次。凉芩柴性，外褐黄色内绿黄色次之。

規格：黃苓分黃苓王、枝苓、黃苓瓣、涼苓、東苓。

黃苓王：條粗長，質堅實、外皮黃色、不帶原皮不破碎者佳。

枝苓：條均勻，質堅實無空心，內外黃色，不碎者佳。

條苓：條略小於黃苓王，少許帶空心，內外黃色不碎者佳。

黃苓瓣：條粗開瓣狀，外皮粗糙，質較松不碎者佳。

涼苓：條大小均有皮，褐黃色，紫性，內綠黃色次之。

東黃苓：條大小不均，外帶褐色老粗皮，內黃色，不帶殘基者佳。

包裝—貯藏：黃苓王箱裝，枝苓、綠苓、黃苓瓣、涼苓、東苓筐裝及席包裝，以筐裝者多，黃苓嚴防受潮，若着潮濕則變成綠色，根據習慣變綠色後即變質，不合藥用之，此貨不易生蟲，放干燥處即可。

炮制：將黃苓放開水鍋內煮之，使其柔軟撈出即橫切片晒干即可，若不及時晒干即變成綠色，遇陰雨時要用火坑干以防變色。制酒黃苓時，每十斤黃苓用黃酒一斤拌勻微燜，用文火微炒，凉干待用。

儿 茶

別名：方儿茶、甘密、方茶。

系儿茶树的树干熬煮而成。

产于緬甸、印度尼西亞，以緬甸產量最大。我國雲南思茅專區亦有生產。

產季是12月至翌年3月，雨季雖可煉煮，但因水多泥污，生產品質不及旱季。但因天氣過熱，水源缺乏，有時又無法煉煮，故盛產期在12月至3月較多。

加工：據了解將儿茶树的树干砍成碎片加水熬煮而成。

鑒別：真品口嘗味苦帶澀，如略帶甜味，即為摻有其他種雜物，將儿茶放於掌心，加以少許水搓之立即翻白者為優，否則便是摻有假貨。

包裝：一般採用麻袋包裝，每包120市斤。

功效：中醫一般用作生津止渴，消毒去濕瘡，並為仁丹中之主要原料之一。

黃 柏

科別形態：芸香科落葉喬木黃柏樹之皮，樹干高一、二丈，外皮破裂呈灰黃色，內皮金黃色，葉茂盛對生似羽狀復葉小葉橢圓形，頂端尖銳，有細鋸齒邊，夏季開淡黃色小花，呈圓錐狀，果實球狀，熟則變黑。

川黃柏肉厚金黃色代微綠。

關黃柏皮薄厚不一，外色深黃色內色淡黃。

山黃柏皮薄而卷曲不平，外色褐黃，內色淡黃。

產地季節：四川省成都馬邊、酉陽、通江、峨嵋，年產約10萬斤，貴州的貴陽、修文、黔西、大平、定坤年產約15萬斤。陝西、安康、南鄭、及關中的耀縣、拘邑、歧山、雒南，年產約8萬斤。吉林的敦化、三叉子、新漢、通化、臨江、輯安、樺甸，年產約20萬斤。遼寧省海城、蓋平，年產約2萬斤。熱河、福建、雲南，均有出產。四月至八月均可採剝。

由樹上剝下皮後，刮去外面粗糙老皮，鋸成長方形晒干或陰干。

規格包裝：分川黃柏、關黃柏、山黃柏三種，川黃柏裝箱筐均可，關黃柏用鐵絲（作繩