

陳素菴婦科補解
中

胎前雜症門卷之三

惡阻

痰逆不思飲食

胎動不安

下血

漏胎

卒然下血

因驚胎動

胎上逼心

毒藥傷胎

心痛

心腹痛

中惡

腰腹背痛

少腹痛

心腹脹滿

咳嗽

吐血

衄血

子煩

躁煩面赤口干

中風

風瘕

鬼胎

傷寒

時氣

熱

胎死

瘧

霍亂

泄瀉

下利

二便不通

子淋

遺尿

尿血

腫滿

胎氣

腹中兒啼

生瘰

腸風下血

暑

食

無故悲泣

不語

胎肥

心悸

喘急脇痛

瘧

皮膚干澀

忽然耳聾

牙痛出血

大頭瘟

癰痛

吐吮

兩胯腫痛

多汗

目赤腫痛

墜跌傷胎

誤食毒物毒藥傷胎

喉痺

吐酸

似妊非妊

腰痛

舌腫或痛

足痿

陰戶腫痛

肛門腫痛

五更泄瀉 不寐

乳自出

胸痞

頭眩目暈視物不明

水氣成臌

陰吹

傷濕

起動胎血暴下

悲哀胎逆

憂鬱胎燥

胎瘦不長

胎前難症門卷之三

前方按月隨經養血安胎無外或無內傷無
難症無更病故以四物四君為主而隨經主治以
安胎言之也至以外感六淫內傷七情或傷食
停飲積痰害血壅生難症致傷胎元則又因病
立方如以安胎為主而他症之藥十之二三別氏
以本辨症為標何者謂急何者謂緩因立胎
前難症門于後

妊娠惡阻方論第一

金匱妊娠惡阻者惡心阻食也產家謂之子

病巢氏謂之惡阻俗曰病兒黃婦人孕素怯
弱或受風寒或消風取涼或中脘有宿痰受妊
之後經血既閉飲食不搏元氣不宣通遂使肢體
沉重頭目昏眩如食酸鹹身臥少起甚或憎
寒壯熱心中憤悶嘔吐恍惚不能支持如不可
作之症治之但診六脈俱勻者乃妊脈也宜豁
暖守中理氣養血則胎自安白朮散主之
白朮 砂仁 陳皮 人參 甘草 茅薤 茯苓 薤白
烏藥 香附 枳實 白芍 黃芩 姜炭
蒲惡阻之症孕婦則皆有之元氣旺者輕擇合

嗜酸貪眠懶動自舒即止等症弱者嘔吐煩
亂四肢沉重惡聞肥甘甚或中下全全不思飲食
全任由累月百日後服首調理始獲安痊是
方一石以補氣芳脾芳以養血妙陳霍亂初起時
以溫中和胃竹茹芳以點後烏藥以理氣姜
末和薑湯以生津液嘔止思食去烏藥所加
全後如生脾脾油 六君子酒 七味白散
脾脾油可去姜末 六君子酒去平五加葛根薑末
七味白散加五時
妊娠懷逆不思飲食方論第二

疾逆不思飲食

金方妊娠懷遠不思食者因水飲停結積聚
而懷少不害身必成病好食嘔逆甚則傷
胎皆因胃氣不調風冷未虛并懷飲留聚中
室此惡阻更重自更妊三月至九月皆有忌
而不食者非真情懷溫胃則胎自安安胎飲主

四君四物陳皮紫蘇香梗砂仁大腹皮

砂仁竹茹姜炭

補按惡阻一症自一月至三月男女不同時
經血初開胎氣未充母素怯弱或以懷飲風寒
害于上中二焦致嘔吐阻食此症全忌懷積

有傷胃氣氣逆則嘔自升嘔緊胸膈飲食
不能下咽故不思食或有終十月不食者逆攻
肌肉消瘦胎動不安產子亦瘦小亦嘔但
嘔之本在脾脾土健旺則嘔飲自消水穀
之氣能生陰血而胎自安是方四君以壯脾土而
助養血安胎陳妙順氣除逆時並蘊芳化嘔
丸養生津和胃葛根亦健引入心於但煩腹
皮寬脹之脹正性太溪性氣盛嘔身伴肥交
喘者均用之

妊娠胎動不安方論第三

金方妊娠胎動不安者抵衝任二經血虛胎門
子戶受胎不實也然亦有飲酒過度房事
太多而胎動者有登高上二廁凡入陰戶衝
傷子宮而胎動者有因擊觸而胎動者有
暴怒傷肝胎動者有用力過度傷筋胎動
者凡一切胎動之症膠艾安胎飲主之

阿膠艾葉黃芪杜仲以熟地附人參茯苓
無地以黃芩白芍白身黃白

補按胎動不安者左右或上或下時時動致使
孕婦心煩不安四物佐以杜仲則補血固腎

參苓佐以黃芪則補氣健中然必加膠艾者
膠固井中並煉而成所以陰涼血艾能調和經
絡孕婦好飲任者墮胎傷胎宜加黃芪高
根或風傷胞門宜加秦先防凡子宮力傷筋
倍加川熟杜仲

妊娠下血方論第四

全書妊娠下血似月信至者或孕婦血盛
氣衰或孕久要血則經血妄動風勝則生
血肝木動搖不能藏血也血盛者元人必
侏肥身瘦孕傷于風不可服補煖劑

無盛算涼血而邪傷營則于安胎藥中加桂
以一二味蓋誤服致凝之劑則新血不生舊
血不下後日必有心胸中暴注之變生秦光酒
止血安胎

秦光杜仲川斷艾葉地榆桑寄生白茅燕
何膠防己黃耆桑木黃芩白茅燕白

補桂湯主治主血營行脈中漸行脈外血
屬陰風血傷營血則肝火動而魂不藏
風主木搏陰血消燥則血下行而胎不安是
方秦光防己以黃芩也秦光益肝胆

二經血而能去血以養血則諸血乘入厥陰
參上至髓海下入丹田防氣通行十二經
如地榆黑五苓炒涼血杜動艾芽安胎養
血養木益氣附陳行氣清以而和引以燕白
烏才之者盡矣按血盛者不宜服此而以涼血
為主先防苦辛四味不可通用或附亦宜量加
宜加生地黃老倍黃者白芽

妊娠漏胎者論第五

全方妊娠經血不時而下名曰漏胎蓋衝任二
經氣虛則胞內泄不能制其經血故血不時

下也久則面黃肌瘦胎漸瘦而不長宜大補
氣血用十二味安胎飲

黃芩 熟地 白芍 黃芪 人參 茯神 梔子
杜仲 阿膠 桑寄生 麥冬 甘草

補血偏胎與十血不同或因久病氣血兩虧
漸積所致或因男女真慾所致但妊娠全
賴此經血以養胎漏而不已胎必受損母亦
致病傷胎之所由生也是方氣血並補衝
任調四物去川芎四君各換神女有血氣
而致神壯慘所膠桑寄生各安神養心補

此藥能助腎水有奇功

妊娠卒然下血方論第六

全方妊娠卒然下血其漏胎下血不同漏胎者
或一月或半月血來點滴淋漓而來不甚多且
無痛楚卒然下血者血來甚多如崩如敗俗
名血崩又名血海敗血然暴下腰痛腹疼此
因衝任氣虛或勞力惱怒所致或飲食生冷
觸冒風寒或受暑不調吐傷胃氣或傷脾
氣卒然損動血來或塊或凝精神昏耗咬牙嚔
口舌乾甚此必係胎氣上逼下墜可宜安胎飲

艾葉以熟杜仲以酒壯腰黃耆地榆黃芪

以膏酒中白身熟地人參茯神桑

補此方論一森要在平然二字平然者平
婦不覺血來迅速非尋常漏胎比也是方
四物加杜仲以六補陰血四君去茅加黃附
以六補元氣壯腰以固脫地榆以涼血但無桑
勢必迅雷不及掩耳用藥如大將登壇不
假平但小勇至于內傷飲食生冷外感風
寒暑濕則必宜候胎元稍安之後徐緩加
減內傷如養血益智仁外感如葛根防己

吐衄產皮厚朴產集

河和痰老扁豆澤河

妊娠因面胎動方論第

全方妊娠腹中搏已四五月或有太衝怒內
傷心氣而大子肝怒入于腎肝腎氣虛胎動
不安間有言要墜下損傷胞絡甚者無
不止視孕婦面赤舌青口無沫者兒死
母生唇舌俱青者子也俱死面青舌赤沫
出者子活母死舌強赤色而下血不止胞絡
胎枯子亦必死如母面跌仆胎動不安無下
血者宜保胎