

產科

第五十三章

產後子宮發炎

五百零四此症不及前項之多，惟獨子宮有病，或牽涉他具，根原胎盤不盡出，留有碎塊在內，致潰爛，子宮損傷，或因胎嬰位置不整，或用鉗具，及他手法所損，或受冷，或噴收斂藥水，皆能害之，竟致子宮爛死，更有天氣不正，冷熱不定，惡露不到，亦足害之。

證據 此項證據與產後腹包膜發炎證據相同，惟脈息略數，中數約一百至一百十至，尋常惡露甚少，極臭而有酸性，小便難，且有痛，摸之覺子宮加大，按之甚痛，面貌恰不及腹包膜發炎之收縮，迨其繼也，炎盡退，子宮料變軟，或生癰爛。

死

五百零五驗病 痛較子宮尋常痛更劇且久延其與腹包膜發炎異者醫手可在腹上周圍按摸而不加痛若腹包膜發炎手不可近而此則重按始加痛脈息微弱惡露更臭遍身皮膚熱而乾其人疲乏沈下甚速在子宮爛死發炎其沈倒不若是之速須二三星期之久然後殞命腸發炎證據更多於腹包膜發炎

決病 脈息甚微弱惡露甚臭乳汁不至加以腸發熱重劇證據往往殞命居多

剖驗 一統腹包膜有微細血管子宮脹大子宮料變軟而

脆，子宮體質內有膿，子宮上面有一種帶膿稠質，子宮與膀胱間，或直腸間，有假內衣，兼有綠色微細片，此片或法愛孛林蛋白質，子宮周圍有黃色腐形物，牽連於腸，子宮尋常桃紅色，而此變為黃灰色，子宮本體內隙道，襯有假皮，雜血與惡露，子宮肉筋料大半變軟，此皆常有之徵驗，廣筋夾層內，並骨盆連網料內，及卵核血管筋間，皆有膿水。

治法 腹上及膀胱間，多用螞蝗，加以胡麻子粉，或麩皮饅頭

屑，以沸水調成厚漿敷之，或法蘭絨浸於加松香醇之熱水

等敷之，

敷法有二項，一用定質物重敷，一用流質輕敷。

以弔取其血，其時疑有此病者，

須與以大服鴉片，與治腹包膜發炎同，兼用一二服茄路米。

如是子宮發炎初起可卽止此證不可大瀉惟令大便通順而已熱水加鴉片酒噴入肛門較爲妥穩病之凶層過後腹上可用弔炎藥法斑駁松香醇之類或用碘酒敷之病退後內服雞哪霜加以足服牛肉精汁並酒以助其力

第五十四章

子宮內廻血管發炎

五百零六子宮廻血管發炎管內有膿毒爲產後一極重症有多醫論列此事黎醫生論最詳謂產後發炎卽從此起尋常醫家以廻血管發炎爲總身體病之一端廻血管發炎爲其大徵驗往往產後發熱病斃後剖驗時並不見有廻血管發炎也

根原 發酵病之勢，如傳染傷風，子宮損傷，胎盤留下碎塊，潰爛，致害迴血管發炎，

證據 尋常產後一二日覺寒慄冷慄，子宮痛，脈息加數，痛沿至背與胯骨骨盆及腿，手按之更痛，行動亦然，頭痛兼嘔吐惡露不至，乳頭不綻而平，或惡露甚臭，亦有子宮不痛，汁多，時有一種氣味，人甚乏力，並有泄瀉，迨後脈息加數，每分時有一百四十至一百五十至，舌苔乾紅，或有一層厚而亮之渣穢物，或紫色口渴，昏暈，惡心並吐綠色或紫色流質，面顴有寒熱虛紅色，皮膚暗黃色，常常寒慄，腹內氣脹，侵偏膈膜，呼吸更難，阻心之行動功用，有冷呃，病重劇時傷於痛而

乏力、心之偪發不暢、阻其呼吸、亦有延過凶險時、至第二層病、血內有膿、

五百零七子宮迴血管發炎、血內有膿、血內有爛毒等、德國

醫生查出膿內有物、名瑟百新、

即爛毒之精

其毒極易化分、爛害

各物質、又有飛休醫生查膿內更有他惡毒物、此毒物能透過內皮薄衣、曾將此爛毒物抽入兔身皮膚、祇一點極微毒物、而迅速發散、致兔發熱滾倒、如發痧時症之泄瀉、小便有蛋白質、二十四小時即死、剖驗查兔肝與脾腎、皆重劇發炎、且有他項病形、由是以觀、一點微膿、轉展變形、與血相遇、其毒發尤劇、凡迴血管發炎、變為血內生膿證據、即有一種新

毒加於廻血管發炎所發之毒，所以各證據皆變，此證據既爲身累，又爲性靈累，其人不安息，躁急，身體顛倒，大歎氣，並出哀聲，有時厥暈，致醫生疑其有產後發狂之情，往往寒慄時來時止，出大汗，脈息急促，心前覺壓緊，呼吸促，面貌收縮，更瘦，眼目瞠視，皮膚有斑點，或有微細膿顆粒，或有皮膚發熱之紅層，一統皮膚暗黃色，其汗特有一種臭味，口氣異樣，似有青草馬料甜味，節骹胯骨膝與肩有痛而浮腫，近此等處有膿相聚，致害節骹等處，皮肉脫落爛死，此等處膿聚，恰爲其毒出路，若內陷肺、肝、腎及腸包膜、脂囊、胃腸牽連網油等發炎，亦貽累眼睛，毀壞明角罩，往往胃腸潰爛，心包膜發炎，亦所

常有臟腑爲毒所攻，無不殞命。如向愈，必久累於牽涉之證，卽大乏力，節骹相膠住，眼光受累變瞎。

五百零八剖驗

迴血管內有極多暗色流質，並不黏韌，以法

愛孛林等已隨往他處也。血塊甚軟，收縮不硬。

皆決蛋白質之故

所

流西倫渾濁，肺肝脾腎心等具有無數圓形紅斑點，近斑點

處有膿聚，此斑點卽其變膿之物。肺內瘡癰比肝更多，節骹

多膿，腕骨亦潰爛，頭腦常血聚，中且有膿，心體脹大，或變軟，

心包膜有清水汁，脾變軟或爛，內腎又變軟，有清汁遮滿，或

有膿聚其上，子宮迴血管收縮，襯衣變厚，清汁與膿布滿，

五百零九治法

治分二項，一爲受害之病，一爲害出之病，醫

生一知其證，並知其痛，亟用螞蝗多條，附其腹，與以足服鴉片，一、二大服茄路米，接用熱水敷其腹，再提其血，令嚙冰塊，及冷飲物，內服解毒之藥，如含硫養之鈉、養鉀、養鎂、養鈣養，證據顯血內有膿，暈倒一層者，卽止用發炎等藥。等如冰亟用

提血氣補身體之法，如牛肉精汁，好揮斯扣酒，或勃蘭提酒，

牛乳，如總身體證據加重，則此補物減少，而服次加多，如不

肯服，亦不必強與，行運血氣藥最靈者，阿摩尼阿香酒，每三

四小時，令服十五滴，或二十滴，如病漸蘇醒，可以輕淡之酒

代勃蘭提，如香冰酒，甚合於胃，臭爛病證，每與肝相引，所

以治肝藥用甚合，時朴道非林

卽五月
萍果

黃花郎

卽蒲
公英

及大黃

如是直腸得利，內腎主小便，皮膚主汗，其功用又欲其靈捷，卽含硫養物，可解臭爛，並解發酵性，須常用木炭細末內服，亦可解臭爛，如胃不和，可加鉍藥並治噯酸鹽類藥如鈉養二炭養，鉀養二炭養，可令血內潰爛之物，得其養氣，變爲善性，而毒自解，炭養物功效更大，惟恐胃有不勝耳，至於皮膚瘡癰，律斯德解毒法最靈。

第五十五章

腿浮

產婦膀胱間迴血管發炎致大腿浮腫

五百十證名不一，以根原不同也。腿發浮腫，膀胱間迴血管發炎，又名乳漲，乳聚他處，白腿乳腿等，此因下肢浮腫，渾然無色，硬而有凹凸力，重按無凹潭，尋常左腿更重於右腿，常痛，手

不可觸近。皮膚熱而脈數。初起每於臨產六日內至產後第二星期更多。小產後亦有之。有以爲臨產時側臥一邊病由是起。

五百十一論病 醫以生產時清汁液核管阻隔所致。有以腿

內質料發炎。滋出黏韌之凌甫。或謂腦線累及。因而發腫。腦線受壓而痛。今醫家以此證由膀間迴血管發炎。受有阻隔。

因名爲膀間迴血管發炎。黎醫生謂此迴血管發炎。初由

子宮迴血管發炎。通至膀骨迴血管。並膀間迴血管。陰道迴

血管。接連大腿薩沸納。明顯之謂迴血管。薩沸納迴血管有兩條。

一長一短。長在深層內。短在外面。德國費又廓驗病醫生謂此

證初層、迴血管內有血塊阻塞、管一塞卽發炎、血不通行、而清汁由血管滋出成膿、其後一切腫痛皆因是起。英國醫生麥肯藉以產婦有病之血、卽非好血、薄而不黏、迴血管如有發炎、一爲阻塞、血易滋出、致黏韌之法、愛孖林、或膿塊阻滯、腿爲擁腫、其擁聚卽清汁也、於是腠間迴血管受累、子宮腠骨處陰道、並總迴管皆被累、腿之液核管、腦線每發炎腫痛。

根原 余謂此必產務久延、嬰頭久壓、骨盆處肉筋所致、此外更由潮濕風寒、或因收生器具、勉強取胞損壞、或產後起牀太早、亦足爲害。

五百十二證據

初起寒慄怕冷，骨盆上口，一圍作痛，有時痛

劇，有時呆痛，其痛深淺不一，位置亦不一，有時小腿先痛，覺

在清汁液管一條上，沿大腿裏面一直上至膝處，膝覺痠緊

不可觸近，其人軀弱，性暴躁，初以爲風濕，然痛後之腫脹不

久，不過二十四小時至四十八小時，病必顯出，由膝間沿下

有時從小腿起有淡而明亮之色，無發炎紅色，甚似雞腫，薄

衣，灌足牛乳，有時肢脹甚大，臀與陰戶亦累及，浮腫，皮膚細

緊，重按無凹潭

惟此層之前重發之後恰有四潭

大腿腫者，大腿迴血管摸之

滾滾似繩形，行動則痛更甚，總身體證據，脈數有一百二十

至，一百二十至，口乾舌厚，頭疼，不安靜，性暴戾，乳汁不至，每

出大汗。

久延至末層

腫延二星期或四星期將退，或更緩，當腫時，

肢體僵硬無知覺，久不能動，亦有不易退，直至變膿。一婦人

膝內出膿筋許，脆骨潰爛，接骨盆駝之脆骨磨去，大腿骨之

內外阜有骨癰之證，產不及四月傷命，有猝然殞者，血管內

有小血塊阻塞，此血塊不獨從子宮帶至肺之大迴管，且他

項迴管亦有黏韌物，如醫治合法，人本強健，此病不至傷命。

五百十三治法

婦人血脈不充足者，不可放血，血脈充足，身

體強健，大迴血管二路，並腓間可用螞蝗十二條吮之，然後

加以熱水敷法，初起須用鹽類瀉藥一二服，腿擱高，用法蘭

絨布浸於鉛養醋酸並鴉片化融之熱水以敷於患處止痛

須令安靜用鴉片呓嗒格以令出汗呓嗒格雜散

即度法散

五釐

每日須服四次佳欲內腎靈動用甜硝以脫酒或嗅側栢油

氣腿上罩以鐵絲籠免衣被摩擦切不宜用刀刺泄其水應

用小弔炎膏藥吸出其水較妥用以下藥水緩緩自下向上

摩擦頗合藥水用鴉片酒一兩斑蝥酒二錢阿業卡酒樟

腦酒各半兩加橄欖油六兩調和置瓶內搖令勻每日三次

用以揩擦腫退數分後以法蘭絨帶盤繞助之不任再有水

至雞哪霜爲甚合之補藥飲食擇有補益者水銀藥膏擦擦

亦可消其腫

第五十六章

暫發熱

五百十四 此暫時發熱之證，婦人住陰濕房屋，或其人單薄，易驚嚇，一受冷，或略出力，或有重心思，每易害此證。

證據 產第三日至六日，猝怕冷戰慄，背頸頭疼，肢痛，面貌瘦減，皮膚乾燥，毛草，脈數不勻，眼眶低落，多憂慮，皮膚熱度雖加而自覺寒冷，乳聚處作痛，有時子宮處亦然，寒慄減後，皮膚愈熱，額痛加重，面色發紅，略有頭眩，脈更弦硬，舌有苔，各種精液，如乳汁惡露小便，有時竟止，其人覺失望，怔忡，大熱輕減，出一陣大汗，頗佳，呼吸無前次之急，脈漸軟而緩，頭痛即退，各種精液復至，心急亦止，人安臥，醒如常矣，此病