

新舊摘要

# 新藥摘要

江苏工业学院图书馆藏

會社

塩

野義商店

大阪市東區道修町三丁目

# 塩野新薬摘要目次

盗汗鎮静剂	阿 第 弗 林	ADIPHORIN.....	1
結核性解热剂	愛 迪 那 爾	AETHYNAL.....	3
淋毒性諸疾患 靜眼注射薬	阿 魯 賴 司 卿	ALLESTIN .....	4
月經痛特效薬	安 濟 室 悶	ANDYSMEN .....	7
制 酸 剂	安 答 奇 津	ANTACIDIN.....	9
夜尿症治療剂	安 提 愛 奴 來 新	ANTIENURESIN .....	12
白帶病新薬	安 期 福 祿 渦 林	ANTIFLUORIN .....	14
解热鎮痛剂	安 迪 匹 賴 親	ANTIPYRETIN .....	17
腸 收 斂 剂	阿 妥 媚 諾 哉	ATOMINOSE .....	20
連鎖狀葡萄球菌 性疾患治療剂	巴 細 露 發 可 兒	BACILOPHAGOL .....	22
鎮 痛 薬	百 咯 因	BECAIN .....	26
整 腸 剂	病 根 寧	BIOGENIN .....	27
鎮 痙 薬	布 羅 咯 兒	BROCAL .....	28
利尿強心薬	安那加滅菌注射液	CAFFEIN. NAT. BENZOL. SOL. ....	31
止血注射薬	咯 魯 奇 佐 爾	CALCISOL .....	32
樟腦食塩水	可 羅 那 金	CALONASIN .....	34
新 鈣 製 剂	鈣 利 乍 寧	CALYSANIN .....	36
盜汗症治療剂 夜尿	抗 弗 盜 尿	CAMPHOTONIN .....	39
霍亂新薬	希 宜 佐 爾	CHINISOL .....	41
殺菌消毒薬	濃厚銀愛寶克勞益多	CONCENTRATED ELECLOID SILVER .....	43
凍傷新剂	特 兒 貌	DERMO.....	45
蠅蟲驅除薬	砥 改 拉 克 欣	DIGELAXIN.....	47
強心利尿薬	地 芟 咯 魯 弗 因	DIGICALFEIN .....	50

強心藥	地 芟 他 民	DIGITAMIN .....	51
白喉豫防	實扶的利亞福爾茂瓦克辛	DIPHTHERIE FORMOVACCIN .....	53
砒素製劑	的 索 邁 阿 兒	DISOMEAR .....	55
蛔蟲驅除藥	妥 拉 司 敏	DRASMIN.....	57
體內消毒劑	銀 愛 寶 克 勞 益 多	ELECLOID-SILVER .....	59
Amöba赤痢 肺 Distoma 特效藥	鹽 酸 愛 梅 親	EMETINE HYDROG- HLORIDE "SHIONO" .....	64
Amöba赤痢 肺 Distoma 特效藥	沃 度 蒼 鉛「愛梅親」	EMETIN. BIS. JODATUM. ....	66
葡萄狀球菌病 內服藥	愛 太 衣 那 克 西 路	ETAINOXYL .....	67
子宮出血新藥	歐 益 斯 他 普 親	EUSTAPTIN .....	68
皮膚新藥	污 瘡 露	EURO .....	70
新巴布劑	碍 疴 好 司	EXIHOS .....	72
祛痰鎮咳藥	發 多 馨	FATOSIN .....	76
茶 養 劑	革 老 斯 特 靈	GALLOSTERIN .....	79
陣痛催進藥	革 布 兒 親	GEBURTIN .....	82
妊娠惡阻特效藥	改 奶 阻 兒	GENESOL .....	84
整腸止瀉藥	改 兒 便 敏	GERBAMIN .....	86
強 精 藥	今 則 寧	GINSENIN .....	88
高血壓新劑	哈 塞 斯 羅 兒	HASETHROL .....	89
局所麻醉藥	希 胞 弗 兒 睦	HYPOFORM.....	94
變 質 藥	瑤 可 兒	JOCAL .....	95
皮膚癢痒新藥	佑 苦 勞 民	JUKUROMIN .....	97
脾 臟 製 藥	剋 經	KEHSIN .....	100
蛋白體製劑	咯 宰 益 腦 兒	KASEINOL .....	102
痔疾特效藥	咯 維 導 爾	KAVIDOL.....	103
緩 下 劑	拉 克 沙 妥 兒	LAXATOL .....	105
妊娠嘔吐新藥	路 特 益 諾 兒	LUTEINOL .....	105

嗎啡中毒治療劑	嗎	痼	樂	兒	MAGROL .....	107			
非特異性 免疫疫苗	茂		爾	丁	MULTIN .....	110			
消炎鎮痛藥	蜜	歐	妥	寧	MYOTONIN .....	113			
鎮痛鎮靜劑	納	瑞	禱	爾	NASEDOL .....	115			
局所麻醉藥	耐	歐	咯	因	NEOCAIN.....	117			
肺炎注射藥	新	希	宜	佐	爾	NEO-CHINSOL .....	119		
母乳催進藥	奶	歐	蜜	魯	欣	NEOMILCHIN .....	122		
淋疾內服藥	歐	布	他	爾	OBUTAL .....	124			
奎扶斯瓦克辛	奧斯瓦克辛	(奎扶斯)			OSVACCIN-TYPHUS .....	126			
赤痢瓦克辛	奧斯瓦克辛	(赤痢)			OSVACCIN-DYSENTERIE...	127			
疫痢瓦克辛	奧斯瓦克辛	(疫痢)			OSVACCIN-EKIRI .....	129			
虎列拉瓦克辛	奧斯瓦克辛	(虎列拉)			OSVACCIN-CHOLERA .....	130			
造血榮養劑	胖		麗	巴	PANLIVER .....	131			
Acridin 系 色素製劑	滂	濁	鈣	魯	PANSECAL .....	136			
淋疾特效藥	滂	濁	溥	清	PANSEPTIN .....	138			
腳氣新藥	巴	拉	努	妥	林	PARANUTRIN.....	140		
肺結核(膜)炎 注射藥	百	克	妥	兒	PECTOL .....	144			
女性發情劑	百		樂	寧	PELANIN.....	147			
發毛劑	庇		顛	墨	PILUMIN .....	150			
無鉛撒布粉	保		愛	兒	POIL.....	153			
汗疱特效藥	疱		膚	靈	POMPHOLIN .....	154			
子宮止血藥	塞	咯	魯	親	SECARTIN .....	156			
動脈硬變症新藥	吉	里	那	兒	SILINAL .....	158			
偉歐斯 神經痛新藥	鹽	酸	喜	挪	美	仁	SINOMENINE. HYDRO- CHLORIDE. ....	159	
初生兒點眼用	硝	酸	銀	液	SOLUTIO. ARGENTI. NITRIGI. ....	162			
強壯藥	滅	菌	鹽	化	鈣	溶	液	SOLUT. CALCI. CHLORAT. STERILISAT. ...	164

疥癬特效藥	掃洗汚兒	SOSYOL	.....166
催眠鎮靜藥	索睦那兒	SOMNAL	.....168
防腐消毒藥	適百疾沃度	SPECIJOD	.....170
驅微水銀劑	斯必螺淨	SPIRODIN	.....174
蒼鉛驅微劑	樞伏螺宰	SYPHLOSE	.....178
凍傷新劑	奇佑爾	THIYUL	.....180
止血新藥	脫倫補靈	THROMBURIN	.....182
卵巢刺戟藥	維氏達林	VISDARIN	.....185
結核特效新藥	亞託康寧	YATOCONIN	.....186
便時須斯 神經痛	筋惱敏	ZINOMIN	.....189
六〇六用	滅菌蒸溜水		.....190
"	〇·四%無菌食鹽水		.....191
"	濃厚無菌食鹽水		.....192
"	〇·八五%生理的食鹽水		.....192
"	林格兒氏液		.....193
北里製品	實扶的利亞血清		.....194
"	腸塞扶斯血清		.....195
"	赤痢血清		.....196
	感作虎列拉瓦克辛		.....198
	感作腸塞扶斯瓦克辛		.....199
	志賀氏感作結核瓦克辛		.....200
	感作淋毒瓦克辛		.....202
	淺川氏丹毒治療液		.....203
	赤痢豫防液		.....204
	痘苗		.....205
	靜脈內注射之二三注意		.....206
	定價表		..... 1

盜汗鎮靜新藥

## 阿 第 弗 林

ADIPHORIN

### 性 狀 及 組 成

本品乃自樟腦之一誘導體樟腦硫酸之鈣化合物製成之白色結晶性粉末也。其化學的集成爲  $(C_{12}H_{15}O_4S)_2Ca$  於水容易溶解、味初微苦而後甘、可任意作爲散劑、或水劑內服、或供皮下注射之用。

### 適 應 症 及 用 法

1. 本品對於一切盜汗均有效、例如因結核、感冒、熱性傳染病、神經衰弱等而發之盜汗、可使鎮靜之。
2. 本品作爲散藥或水藥內服之均可、或用於注射（10%）水溶液一回2—3 cc 亦可。
3. 於就眼前、可先使頓服本品 0.5 若無速效時、務必連用數日爲是、於頑強的盜汗時、可繼續用本品 1.0—1.5 瓦爲是。
4. 本品雖持久連用之、不惟不妨害食事、且可暢舒血行、促進解熱作用、可與治療上一好影響。
5. 本品與 Atropin 大異、毫無副作用及他毒性、故得安心應用之。

### 藥物學的試驗成績

1. 本品即超過用量數倍服用之、並不呈食慾減退、蛋白尿等之副作用。又注射 5 瓦以上於中等大之家兔及貓之皮下、亦不呈中毒作用。
2. 本品對於摘出蛤蟆之正規心臟雖不定、而對於抱水 Chloral 中毒心臟、常促進其機能。又對於蛙之血管呈一定之收縮作用。
3. 按 Dreser 氏及 Impens 氏法試驗本品於家兔、得呈一定呼吸促進作用之成績。(但係於呼吸之回數及量)
4. 本品於施行 Qulaude Bernard 氏之溫穿刺之家兔、呈一定之解熱作用。
5. 依 Hofmeister 氏試驗本品於貓兒、得不直接麻痺汗腺分泌機能之佳成績、此成績與本品之對於健康人之發汗而無鎮靜之效相同。
6. 本劑之盜汗鎮靜作用、主在對於血管系之作用、蓋盜汗之主原因、因種々關係、可認為皮膚血管緊張力減退故也。

### 包 裝

粉 末	25 瓦	1 瓶裝
注 射 用	10 %	2 cc 6 管 1 匣裝
片 劑	(0.25)	10 片 50 片 各 1 瓶裝



結核性發熱之新解熱劑

## 愛 迪 那 爾

AETHYNAL

### 組成及作用

「愛迪那爾」之化學的組成、乃 Furylacryl-P-Oxyphenylharnstoff 殆無味無臭、微帶類黃色的白色輕鬆之粉末也。

Phenyl 尿素之誘導體、乃從來作為解熱劑多所研究者、就中 Cinamoyl-P-Oxyphenyl 尿素、作為結核性解熱劑、特被重用、其適用於結核熱、腸窒扶斯熱等之頑固的發熱也、夙為周知之事實。

「愛迪那爾」者、乃以 Furylacryl 酸代替上記之 Cinamoyl (桂皮酸) 而製成之一新化合物也、夫 Furylacryl 酸對於病原菌之殺菌消毒力、乃一般所公認者、於此再化合之以呈無毒性解熱作用之 Para-Oxyphenyl 尿素、故本劑善抗病原毒素、根本的作用於發熱原菌者也、徵諸嚴密的動物試驗之結果及臨床的實驗成績、均認毒性少而奏優良的解熱效果。

### 應 用

結核性發熱及窒扶斯樣疾患、及其他頑固的發熱、一回 1 瓦、日 3—4 回服用。

特於頑固者、一日量可增至 5—6 瓦、至呈作用時、再減量、一日量用 2—3 瓦、連用之可也。

包 裝

粉	末	25 瓦	100 瓦	各 1 瓶裝
片	劑	20 片	100 片	各 1 瓶裝

淋毒性諸疾患注射劑

阿 魯 賴 司 卿

ALLESTIN



本劑係以柳楊酸鈣珈琲作為主藥、再配合之以沃度及臭素而製成之靜脈注射藥也、較之向來單用鹽化鈣沃度鈣或柳楊酸鈣等之功效、良好不啻倍蓰、洵理想的淋疾藥也。殆無鈣於注射時特有之熱感、又本劑係珈琲化合物體故、呈利尿強心之作用、兼之不含屍菌、故毫無副作用之可言。

## 醫治的作用

1. 利尿作用、非常顯著、故對於腎臟、膀胱、攝護腺、尿道等諸疾患、奏效卓著。
2. 消炎並吸收作用、非常強大。
3. 鎮痛作用頗為顯著、對於關節炎、肋膜炎、腹膜炎、子宮周圍炎、盲腸炎、急性神經痛及筋肉關節痲痺質斯等之劇烈痛疼、可得完全除去之。
4. 鎮靜、鎮痲、鎮痛、解毒等作用強大、故對於腦脊髓神經衰弱、喘息、蕁麻疹、尿毒症、酒精·咖啡·嗎啡中毒等、頗奏卓效。
5. 解熱作用、迅速確實、對於感冒症、結核性發熱等、呈強大之解熱作用、而不發汗、並不疲勞。
6. 依本劑之注射、可使身體元氣旺盛、增進精力。

## 適應症

淋毒性各症即副睪丸炎、攝護腺炎、急性慢性尿道炎、精系炎、膀胱炎、膻炎、卵巢炎、喇叭管炎、關節痲痺質斯、筋肉痲痺質斯等、確奏神效。其他如肺結核、乾性肋膜炎、濕性肋膜炎、神經痛等、亦賞用之。

## 用法用量及注意

本劑專施於血管注射法、故以前膊肘窩或上膊之靜脈中之為要、切忌皮下注射。一回 25 c.c. 每日或隔日注射之。

本劑之注射、須取仰臥位置、徐々注射之爲要。

本劑注射中、即併與之以他內服藥亦無妨、但注射後約二晝夜間、不可行水銀劑及 Salvarsan 等之血管內注射。

本劑之使用。雖殆無禁忌症、然於衰弱患者並年老者及血管硬變症患者、勿用爲是。

本劑即注射於高熱患者、亦無何等危險。

深冬嚴寒之際、宜將其熔封瓶 (Ampoule) 以微溫適當溫暖後用之可也。若熔封瓶發現破紋、該破紋上有灰白結晶體之析出、或有茶褐色變色物之存在、或內有溷濁物之存在時、以之注射恐起惡寒・戰慄・發熱等、故行注射時、熔封瓶之內外、須要留意檢查之。

包	裝
---	---

25 c.c      6 管 1 匣裝

月經痛特效新藥

## 安 濟 室 悶

ANDYSMEN

月經痛一症、乃婦女界之通患、醫療界最易目擊而多爲束手者也、最近京都帝國大學產婦人科教室醫學博士岡林秀一教授、關於月經時之障礙、苦心研究、以自己多年之經驗、曾有論文之發表、據該博士論文云、凡爲婦人者、每於月經時、訴發各種障礙者、乃爲生理的、其甚與不甚、固因人而有差異、就中多感疼痛者也、屬於月經困難之症疼痛、其特徵如下：一

1. 疼痛隨月經而現、於間歇時、則全消失。
2. 疼痛之性質不一、如牽引性疼痛、刀割感疼痛等、然通常多爲痙攣性、一弛一張、由下腹放散於腰部及下肢。
3. 有時雖有呈鈍痛者、而通常則多爲激痛、遂即臥病、或非用鎮痛藥不可者亦有之。
4. 又依遠達作用、以致頭痛、眩暈、欠伸、惡心、嘔吐、兼伴下痢、尿意頻數、速脈者有之。

於是依疼痛成立機轉、案思月經困難之療法：一

1. 因月經前期充血、組織及被膜所生之緊張、不可不防止之、故爲

達此目的、當要投與子宮收縮藥 Hydrastis 最爲合理的藥物也、該藥於血管及子宮之收縮外又有消炎作用之特長。

2. 神經若呈異狀興奮、特於迷走神經興奮 (Vagotonie) 之狀態者、「阿脫羅賓」(Atropin) 之投與、對於該種類之月經困難有效。
3. 對於月經困難患者之神經興奮性、必要使之減退也、是不待言、而鈣劑之有此作用也、乃人所周知之事實。
4. 月經困難症患者、大抵多係神經過敏、故作鎮靜劑有配合臭素 (Brom) 製劑之必要。

以上所述、乃岡林教授論文主旨之大要是也。

本社基諸該博士之研究成績、用特獨的操作、精製爲片劑、命其名曰「安濟室悶」以便一般臨床家之使用、發售以來、既經岡林博士及他多數臨床大家之臨床實驗、咸稱讚而賞用之也。

組	成
---	---

本品含有左記之藥劑：一

硫酸阿脫羅賓

鹽酸 Cotarnin

索陸那兒

乳酸石灰

適	應	症
---	---	---

舉凡月經時之一切障礙、特於月經痛有效、即於原發性月經困難症奏特效、但於炎症性患者、特於炎症之新鮮者次之、故於極少解剖的變化之未婚婦人或女學生等、或因各種事情、不許局所的處置之原發性

月經困難症患者、及非炎症性月經困難症、確奏特效。

### 用 法 用 量

1 日 3 回、每回 6 片內服、但必自月經來潮之三四日或一星期前、開始內服、至月經來潮後疼痛之消失時、中止之可也。

### 包 裝

50 片 100 片 500 片 1000 片 各 1 瓶裝

多酸性胃疾患治療劑

安 答 奇 津

ANTACIDIN

阿爾加里 (Alkali) 性制酸藥之缺點與安答奇津之特長

1. 重碳酸鈉 依本品之內服以中和胃之酸性時、胃腺則以反應性之分泌以應之、更呈強酸性、招來不良之結果者有之。

且本品發生碳酸瓦斯故、弛緩胃壁而充盈擴張之、遂有助長胃膨

滿及食物痞滯之弊。

2. 煨製鎂 本品有分泌抑制之作用、又容積失之過大、不惟服藥困難、因人而催強度下痢、且與他藥配合時、欲按其比重之輕重、行完全之調劑也頗難。



3. 安答奇津 本品無上述二品之缺點、酸之中和作用強大且確實、而不強呈胃液分泌之作用、亦決不抑制、適宜的中和之也、並不因「安答奇津」而胃蒙何等障害、且係無味無臭白色之粉末、投藥上毫無顧慮之必要。

4. 尤可爲特筆者、即「安答奇津」並不抑制「地亞斯答哉」Diastase之消化作用、是爲特徵、然而一般之阿爾加里製劑、殆均減殺、或抑制「地亞斯答哉」之力者也。

### 適 應 症

「安答奇津」對於因多酸症而發之一切胃疾患、均有卓效、即胃擴張、胃下垂、胃弱、胃加答兒及吞酸停滯等症、及他一切胃痛、即暴飲、暴食、因攝取不消化物或敗酸物等而發生之急性胃加答兒、或因過用酒・煙草・茶等而發之胃痛等症、均奏著效。

### 用 法 及 用 量

大人普通 1 日量 1.5 瓦至 3.0 瓦、但增量至 6.0 瓦亦無妨、小兒則依其年齡減量用之。



## 處方例

安答奇津	2.0	Diastase	1.0
------	-----	----------	-----

上爲三包、1日3回食後分服。

## 佐藤博士之處方：一

安答奇津	3.0	煨製鎂	1.0
------	-----	-----	-----

上爲三包、每食後一小時、服一包。

安答奇津	2.0	煨製鎂	1.0
------	-----	-----	-----

荳岩越幾斯 0.05

上爲三包、1日3回、食後分服。

### 配合禁忌

阿爾加里性碳酸鹽類、例如重碳酸鈉等、不可配合。

### 性狀

本品爲白色無味無臭之結晶性粉末、於水殆不溶解、但於鹽酸及醋酸等、容易溶解之。

### 「安答奇津」之醫治效用

「安答奇津」者於胃內容爲酸性時並不抑制胃之分泌、而對於過剩之酸呈適宜之作用不刺戟胃壁而中和之、即分泌過度、Reichmann氏病、其他對於併有過度酸之胃、及十二指腸之潰瘍等、確能達其治療目的故本品即誤用於非酸性時、或內服過量時、亦於胃中不起何等副作用而通過之、是爲本劑之特長。

### 包裝

〔粉末〕 250瓦 1匣裝      500瓦 1匣裝