

本草綱目木部目錄第三十七卷

木之四 寓木類一十二種

栲栳 本經 琥珀 別錄 璽 嘉祐

豬苓 本經 雷丸 本經 桑上寄生 本經

松蘿 本經 楓柳 唐本 桃寄生 綱目

柳寄生 綱目 占斯 別錄 石刺木 拾遺

右附方舊十五新四十

木之五 苞木類四種

竹 本經 天竹黃 開寶 仙人杖 嘉祐

鬼齒 拾遺

右附方舊十七新二十

木之六 襍木類七種 附錄一十九種

淮木 本經

城東腐木 別錄 東家雞栖木 拾遺

古廁木 拾遺

古櫬板 拾遺 震燒木 拾遺

河邊木 拾遺

右附方新一

附錄 別錄八種海藥二種拾遺九種

新雉木 學木核

合新木 枸核

俳蒲木 木核

遂陽木 荻皮

柵木皮

笑樹

那耆悉

乾陀木

白馬骨

帝休

馬瘍木

慈母

大木皮

角落木

黃屑

[illegible]

本草綱目木部第三十七卷

木之四 寓木類一十二種

扶苓 本品經上品

釋名 扶靈 目綱 扶兔 經本 松腴 不死麪 珠記事 抱根者

名扶神 別錄宗奭曰多年樵斫之松根之氣味抑鬱未絕精英未淪其精氣盛者發泄于外

結為扶苓故不抱根既離其本體有零之義也津氣不盛止能附結本根既離本體故曰扶神時珍曰

扶苓史記龜策傳作扶靈蓋松之神靈之氣伏結而成故謂之扶靈扶神也仙經言扶靈大如拳者

佩之令百鬼消滅則神靈之氣亦可徵矣俗作苓者傳寫之訛爾下有扶靈上有兔絲故又名扶兔

或云其形如兔故名亦通

集解

別錄曰茯苓神生太山山谷大松下二月

升器外皮黑而細皺內堅白形如鳥獸龜鼈者良
虛赤者不佳性無朽蛀埋地中三十年猶色理無
異也恭曰今泰山亦有茯苓實而理小不復採用
第一出華山形極粗大雍州南山亦有不華山
保昇曰所在大松處皆有惟華山最多生枯松樹
下形塊無定以似龜鳥形者爲佳禹錫曰范子計
然言茯苓出嵩山及三輔淮南子言千年之松下
有茯苓上有兔絲典術言松脂入地千歲爲茯苓
望松樹赤者有之廣志言茯苓神乃松汁所作勝於
茯苓或云卽茯苓貫着松根者生朱提濮陽縣頌
曰今太華嵩山皆有之出大松下附根而生無苗
葉花實作塊如拳在土底大者至數斤有赤白二
種或云松脂變成或云假松氣而生今東人見山
中古松久爲人斬伐其枯折槎枿枝葉不復上生
者謂之茯苓撥卽于四面丈餘地內以鐵頭錐刺
地如有茯苓則錐固不可拔乃掘取之其撥大者

茯苓亦大皆自作塊不附着根其包根而輕虛者
爲茯苓神則假氣生者其說勝矣龜策傳云茯苓在
兔絲之下狀如飛鳥之形新雨已霽天靜無風以
火夜燒兔絲去之卽篝燭此地罩之火滅卽記其
處明乃掘取入地四尺或七尺得矣此類今不聞
有之宗奭曰上有兔絲之說甚爲輕信時珍曰下
有茯苓則上有靈氣如絲之狀山人亦時見之非
兔絲子之兔絲也注淮南子者以兔絲子及女蘿
爲說誤矣茯苓有大如斗者有堅如石者絕勝其
輕虛者不佳蓋年淺未堅故爾劉宋王微茯苓贊
云皓苓下居彤絲上蒼中狀雞鳧其容龜蔡神侔
少司保延幼艾終志不移柔紅可佩觀此彤絲卽
兔絲之證矣寇
氏未解此義

脩治

斂去之凡用皮去心搗細于水盆中攪濁浮者

并黑睛點小兼盲目弘景曰作丸
散者先煮二三沸乃切暴乾用

氣味甘平無毒

元素曰性溫味甘而淡氣味俱薄浮而升陽也之才曰馬問爲之使

得甘草防風芍藥紫石英麥蘗冬共療五臟惡白

蘇畏牡蒙地榆雄黃秦芎龜甲忌米醋及酸物

景曰藥無馬問或是馬莖也恭曰李氏本草馬刀爲茯苓使問字草書似刀字傳訛爾志曰二注恐

皆非也當是主治胸脇逆氣憂恚驚邪恐悸心下

馬藺字

結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便久服安魂

養神不飢延年

本經止消渴好睡大腹淋瀝膈中痰

水水腫淋結開胸腑調臟氣伐腎邪長陰益氣力

保神氣

別錄開胃止嘔逆善安心神主肺痿痰壅心

腹脹滿小兒驚癇女人熱淋

甄權補五勞七傷開心

益志止健忘煖腰膝安胎大明止渴利小便除溼益

燥和中益氣利腰臍閒血元素逐水緩脾生津導氣

平火止泄除虛熱開腠理李杲瀉膀胱益脾胃治腎

積奔豚好古

赤茯苓甄權主治破結氣瀉心小腸膀胱溼熱利竅

行水時珍

茯苓皮主治水腫膚脹開水道開腠理時珍

發明弘景曰茯苓白色者補赤色者利俗用甚多

而鍊魄利竅而益肌厚腸而開心調營而理衛上品仙藥也善能斷穀不飢宗奭曰茯苓行水之功

多益心脾不可缺也元素曰茯苓赤瀉白補上古
無此說氣味俱薄性浮而升其用有五利小便也
開腠理也生津液也除虛熱也止瀉也如小便利
或數者多服則損人目汗多人服之亦損元氣天
人爲其淡而滲也又云淡爲天之陽陽當上行何
以利水而瀉下氣薄者陽中之陰所以茯苓利水
瀉下不離陽之體故入手太陽杲曰白者入壬癸
赤者入丙丁味甘而淡降也陽中陰也其用有六
利竅而除溼益氣而和中治驚悸生津液小便多
者能止小便結者能通又云溼淫所勝小便不利
淡以利竅甘以助陽溫平能益脾逐水乃除溼之
聖藥也好古曰白者入手太陽經氣分赤
者入足太陰手少陰太陽氣分伐腎邪小便多能
止之小便瀉能利之與車前子相似雖利小便而
不走氣酒浸與光明朱砂同用能秘真元味甘而
平如何是利小便耶震亨曰茯苓得松之餘氣而
成屬金仲景利小便多用之此暴新病之要藥也
若陰虛者恐未爲宜此物有行水之功久服損人

八味丸用之者亦不過接引他藥歸就腎經去胞
中久陳積垢爲搬運之功爾時珍曰茯苓本草又
言利小便伐腎邪至李東垣王海藏乃言小便多
者能止瀦者能通同朱砂能秘真元而朱丹溪又
言陰虛者不宜用義似相反何哉茯苓氣味淡而
滲其性上行生津液開腠理滋水之源而下降利
小便故張潔古謂其屬陽浮而升言其性也東垣
謂其爲陽中之陰降而下言其功也素問云飲食
入胃遊溢精氣上輸于肺通調水道下輸膀胱觀
此則知淡滲之藥俱皆上行而後下降非直下行
也小便多其源亦異素問云肺氣盛則便數而欠
虛則欠欬小便遺數心虛則少氣遺溺下焦虛則
遺溺胞移熱于膀胱則遺溺膀胱不利爲癰不約
爲遺厥陰病則遺溺閉癰所謂肺氣盛者實熱也
其人必氣壯脈強宜用茯苓甘淡以滲其熱故曰
小便多者能止也若夫肺虛心虛胞熱厥陰病者
皆虛熱也其人必上熱下寒脈虛而弱法當用升
陽之藥以升水降火膀胱不約下焦虛者乃火投

于水水泉不藏脫陽之証其人必肢冷脈遲法當用溫熱之藥峻補其下交濟坎離二証皆非茯苓輩淡滲之藥所可治故曰陰虛者不宜用也仙家雖有服食之法亦當因人而用焉

茯神**氣味**甘平無毒

主治脾不祥療風眩風虛五勞口乾止驚悸多恚

怒善忘開心益智安魂魄養精神別錄補勞乏主心

下急痛堅滿人虛而小腸不利者加而用之甄權

神木即伏神心內木也又名黃松節**主治**偏風口面喎斜毒風筋

攣不語心神驚掣虛而健忘甄權治腳氣痹痛諸筋

牽縮時珍

發明

弘景曰仙方止云茯苓而無茯神為療既同用應無嫌時珍曰神農本草止言茯苓名醫

別錄始添茯神而主治皆同後人治心病必用茯神故潔古張氏于風眩心虛非茯神不能除然茯苓亦未嘗不治心病也陶弘景始言茯苓赤瀉白補李杲復分赤入丙丁白入壬癸此其發前人之祕者時珍則謂茯苓茯神只當云赤入血分白入氣分各從其類如牡丹芍藥之義不當以丙丁壬癸分也若以丙丁壬癸分則白茯神不能治心病赤茯苓不能入膀胱矣張元素不分赤白之說于理欠通聖濟錄松節散用茯神心中木一兩乳香一錢瓦器炒研為末每服二錢木瓜酒下治風寒冷溼搏于筋骨足筋攣痛並主之難但是諸筋攣縮疼痛並主之

附方

舊五新

服茯苓法

頌曰集仙方多單餌茯苓其法取白茯苓五斤去黑

皮擣篩以熟絹囊盛于二斗米下蒸之米熟即止暴乾又蒸如此三遍乃取牛乳二斗和合着銅器

中微火煮如膏收之每食以竹刀割隨性飽食辟
穀不飢也如欲食穀先煮葵汁飲之○又茯苓酥
法白茯苓三十斤山之陽者甘美山之陰者味苦
去皮薄切暴乾蒸之以湯淋去苦味淋之不止其
汁當甜乃暴乾篩末用酒三石蜜三升相和置大
甕中攪之百匝密封勿洩氣冬五十日夏二十五
日酥自浮出酒上掠取其味極甘美作掌大塊空
室中陰乾色赤如棗飢時食一枚酒送之終日不
食名神仙度世之法○又服食法以茯苓合白菊
花或合桂心或合朮爲散丸自任皆可常服補益
殊勝○儒門事親方用茯苓四兩頭白麴二兩水
調作餅以黃蠟三兩煎熟飽食一頓便絕食辟穀
至三日覺難受以後氣力漸生也○經驗後方服
法用華山挺子茯苓削如棗大方塊安新甕內好
酒浸之紙封一重百日乃開其色當如飴糖可日
食一塊至百日肌體潤澤一年可夜視物久久腸
化爲筋延年耐老面若童顏○嵩高記用茯苓松
脂各二斤酒浸之和以白蜜日三服之久久通

靈○又法白茯苓去皮酒浸十五日漉出為散每服三錢水調下日三服○孫真人枕中記云茯苓久服百日病除二百日晝夜不眠二年役使鬼神四年後玉女來侍○葛洪抱朴子云王子季服茯苓十八年玉女從之能隱能彰不食穀炙癢滅面體玉澤又黃初起服茯苓五萬日能坐在立亡日中無交感丸方見草部吳仙丹方見果部吳胸脇影

氣逆

脹滿茯苓一兩二人參半兩每服三錢水煎服日三聖濟總錄養心安神朱

丸治心神不定恍惚健忘不樂火不下降水不上升時復振跳常服消陰養火全心氣茯苓神二兩去

皮沉香半兩為末煉蜜丸小豆大每服三十丸食後人參湯下百一選方血虛心汗

別處無汗獨心孔有汗思慮多則汗亦多宜養心心血以艾湯調茯苓末日服一錢證治要訣心

虛夢洩

或白濁白茯苓末二錢米湯調下虛滑遺

精 白茯苓二兩縮砂仁一兩為末入鹽二錢精
漏 羊肉批片摻藥炙食以酒送下 普濟方

精白濁 方見菜部 **濁遺帶下** 威喜丸治丈夫元陽
薯蕷下 虛憊精氣不固小便

下濁餘瀝常流夢寐多驚頻頻遺洩婦人白淫白
帶並治之白茯苓去皮四兩作匱以豬苓四錢半

入內煮二十餘沸取出日乾擇去豬苓為末化黃
蠟搜和丸彈子大每嚼一丸空心津下以小便清

為度忌米醋。李時珍曰抱朴子言茯苓千萬歲
其上生小木狀似蓮花名曰木威喜芝夜視有光

燒之不焦帶之辟兵服之長生和 **小便頻多** 白茯
劑局方威喜丸之名蓋取諸此

皮乾山藥去皮以白礬水瀹過焙等分 **小便不禁**
為末每米飲服二錢 儒門事親方

茯苓丸治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不禁用
白茯苓赤茯苓等分為末以新汲水援洗去筋控

乾以酒煮地黃汁搗膏搜和丸彈子 **小便淋濁** 由
大每嚼一丸空心鹽酒下 三因方

腎氣虛神舍不守或夢遺白濁赤白茯苓等分爲末新汲水飛去沫控乾以地黃汁同擣酒熬作膏	和丸彈子大空心鹽湯下虛消渴炎爍腎水枯涸	嚼下一丸三因方	不能交濟而成渴証白茯苓一斤黃連十一斤爲末熬天花粉作糊丸梧子大每溫湯下五十丸	生堂經下部諸疾	驗方	焙入瓷甑內以好蜜和勻入銅釜內重湯桑柴炭煮一日取出收之每空心白湯下二三匙解煩鬱	燥渴一切下部疾皆	可除積善堂方	紫蘇木瓜湯下二	錢百一選方	爲末每服二錢新汲	水下禹講師方	卒然耳聾	水	下普面黥雀斑白茯苓末蜜和夜集驗方二	濟方
妊娠水腫	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下