

全国中草药新医疗法展览会 技术资料选编

(爱国卫生)

江苏省镇江市革命委员会生产指挥组科技组翻印

一九七一年十月

毛主席语录

领导我们事业的核心力量是中国共产党。
指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

备战、备荒、为人民。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

团结新老中西各部分医药卫生工作人员，组成巩固的统一战线，为开展伟大的人民卫生工作而奋斗。

前 言

在无产阶级文化大革命伟大胜利的推动下，在党的“九大”精神鼓舞下，我国医药卫生战线形势一派大好。广大医药卫生人员高举毛泽东思想伟大红旗，狠批叛徒、内奸、工贼划少奇的反革命修正主义卫生路线，坚决落实毛主席“备战、备荒、为人民”的伟大战略方针和“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的光辉指示，涌现出许多认真学习毛泽东思想的先进集体和先进事迹，各项工作取得了很大的成绩。

毛泽东思想的光辉照亮了我国医疗卫生事业发展的道路。当前，我国广大城乡，以除害灭病为中心的爱国卫生运动，波澜壮阔，滚滚向前；深受贫下中农欢迎的合作医疗制度不断巩固和发展；数以百万计的“赤脚医生”队伍在毛泽东思想哺育下茁壮成长。遵照毛主席关于“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”的伟大教导，在各级革委会的领导下，在解放军的带动下，广泛开展了用中草药、新医疗法防治常见病、多发病的群众运动。在群众运动中，广大医药卫生人员运用毛主席的哲学思想指导医疗实践，发掘、继承祖国医学遗产，走中西医结合的道路，创造了世界医学史上旷古未有的奇迹。这是无产阶级文化大革命的丰硕成果，是毛泽东思想的伟大胜利！

在这一伟大胜利的凯歌声中，“全国中草药新医疗法展览会”于一九七〇年十二月在北京举行。

为了满足广大群众的需要，我们将全国各地报送展览会的有关技术资料选编成册（按内容分成若干分册，在展览期间陆续发行，最后汇成总集），以便于广大工农兵群众、“赤

脚医生”和革命医务人员交流经验，进一步在三大革命运动中总结提高，为创造中国的新医学、新药学而奋斗！

由于我们认真学习毛泽东思想不够，选编工作中定有不少错误和缺点，希望同志们批评指正。

全国中草药新医疗法展览会

一九七〇年十二月

编辑说明

一、本《选編》广泛地选載了全国送展材料中的技术資料。为了便于交流，我们注明了材料来源（有的省、市沒有报具体单位，只能注以省、市名）。

二、为了便于推广，防止同名異物、同物異名而用錯藥，我们根据送展标本进行了植物鉴定，并在相应的材料末尾注以学名（未送标本者，暫缺，一般常用中藥不加注）。

三、东北三省所报材料中的中草藥剂量用的是十两制，我们是照原样收載的，請使用时注意。

目 录

预防流行性感胃及感胃.....	(1)
预防麻疹.....	(3)
预防百日咳.....	(4)
预防流行性腮腺炎.....	(5)
预防流行性脑脊髓膜炎.....	(5)
预防痢疾.....	(7)
预防疟疾.....	(8)
预防中暑.....	(8)
灭孑孓、灭蚊.....	(9)
灭蛆、灭蝇.....	(12)
灭臭虫.....	(15)
灭鼠.....	(16)
灭蟑螂.....	(18)
工业废水的综合利用.....	(18)
用造纸废黑液生产化肥.....	(19)
工业废酸的利用.....	(19)
工业废碱回收.....	(21)
二硫化碳防毒措施.....	(23)
湿法防尘作业线.....	(24)
防尘防毒的措施.....	(26)
自制水磨石粉机防尘.....	(27)
地下施工柴油机废气卫生标准.....	(27)
氮氧化物、一氧化碳简易测定箱.....	(29)
鞍劳 B—II 型防毒口罩.....	(30)
治疗矽肺.....	(30)
治疗急性有机锡中毒.....	(32)
驱汞.....	(32)

预防流行性感冒及感冒

用途：预防流感。

方药：麦冬根、银花藤各等份，薄荷少许。

用法：水煎服，每3天一次，每次一碗。

效果：某地区在某年4月上旬流感发生达高峰时，服用上方，3~5天后流感发病率由25.1%下降到2%。

材料来源：湖北省鄂西北公路黄岗民兵师。

用途：预防流感。

方药及用法：梔子根、大青根、青火藤各一两，黄菊（全草）三钱，矮婆菊（全草）四钱，山柴胡根、忍冬根、土厚朴根各五钱（以上为一人一日量）。水煎服。

材料来源：湖南省耒阳县坪田公社。

用途：预防感冒。

方药及用法：七星剑草（干品）三钱，熬汤，当茶饮。

效果：全队1000多人服用，效果良好。

材料来源：江苏省吴县建设公社勤丰大队。

注：七星剑草为唇形科植物疏花荠苎 *Mosla remotiflora* Sun的全草。

用途：预防感冒、流感。

方药及用法：1. 臭灵丹五斤，生姜二斤，红糖适量。上药为100人服一次量。水煎每天服二次。

2. 贯众：6个月~2岁，每日一钱；3~6岁，每日

一钱半；7~10岁，每日二钱；成人每日三钱。水煎，分二次服。

3. 野荆芥、野苏子、枇杷叶、木贼各一斤，细粥马桩二斤。煎水为100人服一次量。日服二次。

4. 香茅草五钱，金银花四钱，杏叶防风、生姜、木姜子、柴胡、竹叶各三钱。每日一剂，水煎分三次服。

材料来源：云南省。

注：1. 臭灵丹为菊科植物 *Laggera pterodonta* (DC.) Benth. 以全草入药。

2. 香茅草为禾本科植物 *Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf 以全草入药。

3. 柴胡为伞形科植物 *Bupleurum longicaule* Wall. var. *franchetii* Bseu 以根入药。

4. 杏叶防风为伞形科植物 *Pimpinella candolleana* Wight et Arn. 以根入药。

用途：防治流行性感胃。

方药及用法：1. 野棉花根五两，金竹叶三两。以上为100人一日服用剂量，每日一剂，二次煎服。

2. 见肿消、山芝麻各五两，吹风散、刺黄连、马蹄草、车前草各二两，鼻通草、马连鞍（龙芽草）各三两。以上为100人一日服用量，每天一剂，两次煎服。

3. 刺黄连、木通、生姜各五两，桉叶四两。以上为100人一日服用量，每天一剂，水煎两次分服，每周服3天。

4. 地马庄（蔓性千斤拔）三斤，野菊花、细竹叶、黄皮果树叶、野棉花、苇根各二斤，木贼、枇杷叶各一斤。供1000人服，每天一剂，两次煎服。

效果：分别服上方达30万人次，预防和治疗流感均收到较好效果。

材料来源：云南省文山州。

注：1.野棉花根为毛茛科植物秋牡丹 *Anemone japonica* Sieb. et Zucc. 的根。

2.金竹叶为禾本科植物金竹 *Phyllostachys subphurea* (Carr.) Riviere 的叶子。

3.见肿消为菊科植物白牛胆 *Inula cappa* DC. 用全株。

4.山芝麻为梧桐科植物粘毛山芝麻 *Helicteres viscidula* Bl. 以根入药。

5.吹风散为木兰科植物高原北五味 *Schisandra neglecta* A. C. Smith.

6.刺黄连为小檗科植物黄十大功劳 *Mahonia flava* Schndr. 以根或茎入药。

7.马蹄草为伞形科植物积雪草 *Centella asiatica* (L.) Urb. 以全草入药。

8.桉叶为桃金娘科植物蓝桉 *Eucalyptus globulus* Labill. 的叶子。

预 防 麻 疹

用途：预防麻疹。

方药：竹叶、银花、荠菜花各二两（均鲜品，为一日量）。

用法：两次煎服，连服3天。

效果：麻疹流行期，全队26个易感儿童服用后，均未发病。

材料来源：江苏省吴县建设公社勤丰大队。

用途：预防麻疹。

方药：荠菜（全草）二斤。

用法：洗净，加水1000毫升，煎成500毫升。每周服一次，每次服100毫升。

效果：对150名易感儿进行服药预防，结果只7例发病，发病率占易感儿的4.6%。另130名易感儿未服预防药，有56例患麻疹，发病率占易感儿的42%。

材料来源：江苏省大丰县人民卫生服务站。

用途：预防麻疹。

方药：紫草根五斤，甘草十斤，葛根八斤，桑叶四斤。

用法：上药加水煎成150斤，每人每天服一次，每次半杯，连服1周。

效果：有三个生产队，其中一个生产队未服上述预防药，42人发病，其余两个生产队服预防药，无1人发病。

材料来源：湖北省嘉鱼县民卫局。

预防百日咳

用途：预防百日咳。

方药：棕树叶适量。

用法：水煎代茶饮。

效果：邻队儿童患百日咳，在本大队45个易感儿童中投药，控制了本病流行。

材料来源：江苏省吴县建设公社勤丰大队。

预防流行性腮腺炎

用途：预防流行性腮腺炎。

方药：板蓝根、山茨菇各一两，连翘八钱，甘草六钱，青黛一钱（冲服）。

用法：上药用水浸泡半小时，放入大砂锅内，放清水800~1000毫升，煎成500毫升，分成10份，装入小瓶。4岁以上儿童每天服一次，每次15毫升，1~3岁每次服10毫升，每天一次，温服。

效果：观察300余例，预防效果达85%以上。

材料来源：天津工人医院。

预防流行性脑脊髓膜炎

用途：预防流脑。

方药及用法：1.三颗针（根或茎）、马尾黄连（根茎及根）、金银花各五钱。每日一剂，两次煎服。

2.鲜桉叶二斤，加水四斤煎得药液二斤，成人每次服50毫升，每日二次，连服3日，停1日，9日为一疗程。

3.桉叶、刺黄连各二斤，甘草五两。水煎熬成大锅药，供100人一次服，每人一次服200毫升为预防量。治疗量日服三次，每次100毫升。

材料来源：云南省。

注：1.三颗针为小檗科植物 *Berberis pruinosa* Fr.

2.马尾黄连为毛茛科植物 *Thalictrum majus* L.

用途：预防流脑。

方药：松针（鲜）五斤，甘草二两。

用法：上药加水100斤，煎至80斤，成人每次服半斤，一日二次，连服3天。儿童酌减（儿童加用鹅不食草研粉，每日早晚取少许嗅鼻，连用7天）。

效果：1970年用上药预防二次，隔半月一次，全大队无一人发病，过去3年发病率较高。

材料来源：江苏省吴县建设公社。

用途：预防流脑。

方药及用法：1.贯众五钱，紫苏、芦根、黄菊花各三钱（以上为一人一日量）。煎水当茶饮。

2.贯众二两，雄黄三钱，生明矾八钱。放入饮水缸内作饮水消毒用，7天换一次。

3.大青根三个，贯众、金银花、黄菊花、芦根各半斤，白茅根一斤（以上为50人用量）。上药加水30斤，熬成25斤，每人每天半斤，分三次服，连服3~5天。

材料来源：湖南省耒阳县坪田公社。

注：大青为马鞭草科植物 *Clerodendron cyrtophyllum* Turcz. 以根入药。

用途：预防流脑。

方药：鲜竹叶、石膏各三斤。

用法：石膏研末与鲜竹叶同时放入锅内，加水一百斤，大火煮成六十斤，滤出药液备用。每人每天服十二两左右。

效果：某公社某年3月上旬10天内发病12例，当即用上药预防，3月下旬仅发病1例。该公社有一个大队由于用预

防药早，周围大队发病率高，该大队无一例发病。

材料来源：湖北省襄阳县。

预 防 痢 疾

用途：预防痢疾。

方药及用法：黄荆杆一两，王不留行(全草)、野茄子、山矛腊(全草)各五钱，定山虎杆三钱，海蚌含珠(铁苋菜)四钱(以上为一人一次量)。水煎服，每月一至二次。

材料来源：湖南省耒阳县坪田公社。

用途：预防痢疾。

方药及用法：1. 刺黄连(根或茎)半斤，翻白叶根一斤，车前草二斤。水煎供100人一次服。

2. 草血竭二斤，黄锁梅一斤，水煎供100人一次服。

材料来源：云南省。

注：1. 刺黄连为小檗科植物 *Berberis pruinosa* Fr.

2. 翻白叶为蔷薇科植物银毛委陵菜 *Potentilla fulgens* Wall.

3. 草血竭为蓼科植物 *Polygonum paleaceum* Wall.

用途：防治痢疾。

方药：天青地白、大功劳、三月泡根各等量。

用法：水煎服，每次100毫升，每天服三次。预防量每天服100毫升。

材料来源：云阳县曲靖县。

注：三月泡为蔷薇科植物黄锁梅(黄泡) *Rubus ob-*

cordatus Fr.以根入药。

预 防 疟 疾

用途：预防疟疾。

方药：三台红花根二至三钱。

用法：水煎服，日服三次。

材料来源：云南省。

注：三台红花为马鞭草科植物 三对节 *Clerodendron serratum*(L.)Spr. var. *amplexifolium* Moldenke

用途：预防疟疾。

方药及用法：1. 甲鱼骨加谷糠、烟熏灭蚊。

2. 黄荆(全株)、九连(全草)各五钱，常山叶五分，桃树叶、鱼腥草各三钱(以上为一人一次量)。煎水服，每月服二至三次。

材料来源：湖南省耒阳县坪田公社。

(防治上述疾病的其他处方见传染病分册。)

预 防 中 暑

用途：预防中暑。

方药及用法：1. 大青叶、般草各三钱，马鞭草五钱，土薄荷四钱，车前草二钱(以上为一人一日量)。煎水当茶饮。

2. 水杨梅、内风消各五钱，水灯草、水杨柳、石菖蒲(叶)各三钱，葛根(花)二钱(以上为一人一日量)。水煎

服，每月服二至三次。

材料来源：湖南省耒阳县坪田公社。

灭孑孓、灭蚊

用途：灭孑孓。

方药及用法：1. 将5%天南星浸出液，倾入污水中。

2. 桃叶，每立方米水中投入十二两。

3. 核桃叶，捣烂投入污水中。

4. 番茄叶，捣烂投入污水中。

5. 蓖麻叶一斤，加水十斤，煮半小时，取液按5%的比例放入污水中。

6. 苦参一斤，加水十斤，煮半小时，取液按1%的比例倾放污水中。

材料来源：云南省。

用途：杀灭孑孓。

方法：用海水冲杀孑孓，清除污泥浊水蚊蝇孳生地。

效果：详见下表。

药名	浓度	效果	备注
海水		一小时内有80%死亡，再过半个小时全部死亡	方法简便
自来水		三小时以上仍然存活	
敌敌畏	1:500	数分钟死亡	
六六六液	1:200	40分钟致死	但稀释度加大效果差

材料来源：福建省厦门市鼓浪屿区。

用途：灭蚊。

方药：1.青蒿半斤；2.艾叶一斤；3.桉叶、苦蒿、粗糠各适量，六六六粉少许。

用法：任选一方，点燃烟熏。

材料来源：云南省。

用途：灭蚊。

方药：蓼子草。

用法：将上药八至十斤，切细压烂，放于1平方米的水内。

效果：24小时内可将孑孓杀死。

材料来源：山东省胶南县。

用途：灭蚊。

方药：辣椒秸、杂草。

用法：关好门窗，用上药烧烟熏。

效果：半小时至1小时可以全部杀灭。

材料来源：江苏省淮阴专区。

用途：灭蚊、蝇。

方药及用法：氯酸钾28%，葱30%，氯化铵18%，敌百虫24%。用导火线点火立即发烟。

效果：室内每平方米用0.2克药，可在30分钟内杀死蚊蝇。

材料来源：黑龙江省延寿县卫生防疫站。

用途：熏蚊。

方药：可湿性1605与六六六合剂60%，氯酸钾20%，稻壳粉、硫酸铵各10%。

制法：以上配剂包装成圆筒形的纸壳，密封，另装置一

条引信，以便点燃。

效果：以硫酸铵盒装引信代氯化铵纸包法，克服受潮不易燃烧的缺点，发烟迅速、完全，使用方便、清洁；以稻壳代替面粉，配药10吨即可为国家节约粮食1吨。

材料来源：福建省福州市卫生防疫站。

野生植物对蚊、孑孓的毒效：

试验方法：灭孑孓：取植物的药用部分，阴干或低温干燥（50~60℃）碾成粗粉，称取一定重量（参阅下表），加

十二种植物浸出液对致乏库蚊子孑孓的毒效

植 物 名	药用部分	浓度%	死亡%	备 注
肖梵天花 <i>Urena lobata</i> L.	叶	0.5	86	温浸
五爪金龙 <i>Ipomea carica</i> (L.) Sweet	叶	0.5	87	温浸
番木瓜 <i>Carica papaya</i> L.	叶	0.25	100	冷浸
山文竹 <i>Asparagus brachyphyllus</i> Turron	根	0.25	98	冷浸
蓖麻 <i>Ricinus communis</i> L.	叶	0.25	85	冷浸
牡荆 <i>Vitex cannabifolia</i> Sieb. et Zucc.	叶	0.5	100	温浸
牛尾菜 <i>Smilax nipponica</i> Miq.	叶	0.5	100	温浸
假菠菜 <i>Rumex maritimus</i> L.	叶	0.5	97	温浸
扶桑 <i>Hibiscus rosasinensis</i> L.	叶	0.5	91	温浸
石龙芮 <i>Ranunculus sceleratus</i> L.	叶	0.5	91	温浸
构树 <i>Broussonetia papyrifera</i> Vent.	叶	0.5	89	温浸
无患子 <i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.	果皮	0.5	88	温浸