

本草從新卷十目錄

果部 五果類六種

杏仁 巴旦杏仁

烏梅 桃仁 栗

大棗

山果類十五種

梨

柿

木瓜

山楂

橘皮

青皮

香櫞

香櫞

花紅

枇杷葉

楊梅

石榴皮

銀杏

胡桃

榛

夷果類九種

荔枝核

龍眼肉

橄欖

榧子

海松子

檳榔

耆 杏子酸熱有小毒損人孕婦忌

巴旦杏仁

潤肺下氣

甘平止欬下氣消心腹逆悶

有溼痰者勿服

以其性潤也○凡仁皆潤

形扁皮白尖彎如鸚哥嘴者真

形圓皮黃尖直者名甜杏仁出山東河南不入藥

烏梅

澗腸斂肺

酸澀而溫脾肺血分之果澗腸斂肺

肺欲收急食酸以收之

止血涌痰

消腫解毒生津止渴

時珍曰梅花於冬而實於夏得木之全氣故最酸膽爲甲木肝爲乙木人舌下

有四瓣兩通膽液醒酒殺蟲治久嗽瀉痢

血痢尤良○梁莊肅公血痢陳應之

故食酸則津生

用烏梅胡黃連龜下土等分爲末茶調服而愈曾魯公血痢

百餘日國醫不能療應之用鹽梅肉一枚碎爛合臘茶入醋

服一啜

瘡瘍霍亂吐逆反胃下血崩安蛇厥

蛇蟲上攻而眩仆蟲得酸而安

則去黑痣蝕惡肉

疽愈後有肉突起燒存性研未敷之一日減半兩日而平

病有當發

表者大忌酸收誤食必爲害

青梅薰黑爲烏梅

稍灰汁淋蒸則肥澤

不蠹

○大便不通氣奔欲死者烏梅十顆

湯浸

去核丸棗大納入下部少時卽通

產安吉者肉厚多

脂最佳

合溪者次之長沙梅福建梅肉薄無脂不堪用

白梅 酸澀鹹平功用略同烏梅治癰厥僵仆牙關緊閉

取肉

揩擦牙齦涎出卽開蓋酸先入筋齒

取氣取齒

輒卽易開若用鐵器攢開恐傷其齒

青半黃梅子每箇用鹽一兩淹一日夜曬乾又浸又曬至水

盡乃止用青錢三箇夾二梅麻線縛定通裝磁罐內封理地

下百日取出每用一枚含之嚥汁入喉卽消

收一年者治一人收二年者治二人神效

敷乳癰腫毒刺

人肉中搗爛罨之卽出瘡中

刀箭傷膚搗敷血卽止

多食損齒

傷筋

經曰酸走筋筋病無多食酸若過食而齒齦者嚼胡桃肉以解之

鹽漬爲白梅

取大青梅

以鹽汁漬之日曬夜漬十日成矣久乃上霜故又名鹽梅○衣生櫟點者梅葉煎湯洗之卽去清水揉梅葉洗蕉葛衣經夏不脆有驗

根葉治休息痢及霍亂煮濃汁飲之

桃仁瀉破血潤燥

苦平微甘苦以泄血滯甘以緩肝氣而生新血

成無己曰肝者血之源血

聚則肝氣燥肝苦急急食甘以緩之通大腸血秘治熱入血室

衝脈

血燥血瘀指

傷積血血瘀經閉欬逆上氣

血和則氣降

皮膚燥癢

肌有血凝

發熱如

若小腹滿痛小便自利者爲蓄血

若非血瘀而誤用之大傷陰氣

泡

去皮尖炒研碎雙仁者有毒不可用香附爲使

婦人陰癰桃仁杵爛綿裹

塞之產後陰腫桃

仁搗研傅之俱妙

桃花

通大瀉

苦平下宿水除痰飲消積聚利二便療風狂

蘇顥杜陽編載范純佑女喪夫發狂閉之室中夜嘶窗櫺登
桃樹食花幾盡自是遂愈以能瀉瘀飲帶血也○深門事親
載一婦同瀉數年百治不效或言此傷飲有積也桃花落時
以棘鍼刺取數十萼勿犯人手以麪和作餅煨熟食之米飲
送下不一二時瀉下如傾六日行至數百行昏困唯飲涼水而平
以攻決爲用但可施於

爲害不小三月三日採花揀淨以絹袋盛懸管下陰乾千
葉者勿用

桃葉宣發汗

苦平殺蟲發汗

凡傷寒風痹發汗不出以火燒地用水灑之乾桃葉於

上厚二三寸席臥溫覆取大汗被中敷粉極燥便瘥凡麥麩蠶沙皆可如此法用

采嫩者名桃心

入藥尤勝

桃子辛酸甘熱微毒多食令人有熱生瘧癘

有損

無益五果列桃爲下以此與鼴同食患心痛服尤人尤忌之

桃氣

是桃子在樹經冬苦

不落者正月採之苦

微溫有小毒辟邪祛祟

白禿頭瘡乾桃一兩黑丑一合爲末臘豬脂調搽

栗

補腎

鹹溫厚腸胃補腎氣

能解羊瘖

小兒不可多食生則難化熟則

滯氣

小兒疳瘍生嚼栗子敷之

大棗

補脾胃潤心肺調營衛

和百藥

甘溫補中益氣滋脾土潤心肺調營衛緩陰血生津液悅顏

色通九竅助十二經和百藥傷寒及補劑中功用之以發脾

胃升騰之氣

須與薑並行

紅棗功用相倣差不及爾

雖補中而味過於甘中滿者息之

甘令人滿大建中湯心下痞者減
錫棗與甘草同例○經言棗爲脾

果脾病宜食之又曰脾病人毋多食甘毋乃相戾耶不知宜食者指不足之脾也如脾虛泄瀉之類毋多食者指有

之脾也如實滿腫脹之類凡用藥者能隨其虛實而變通之
雖尋常品味必獲神功苟執而泥之雖有良劑莫展其長故
學者以格致爲亟也凡風疾痰熱及齒痛俱非所宜小兒疳病亦禁生
者尤爲不利

北產肥潤堅實者佳

金華南棗及徽寧所產皮薄而皺花紋甚細而

堪入藥宏景曰南棗大惡不堪啖蘇頌曰江南出者堅燥少

脂不可入藥可殺烏附毒忌葱魚同食

諸瘡久壞不愈者東膏三升煎水頻洗取愈○食椒閉氣

食棗卽解○以上五果類

梨

涼心潤肺利大小腸

甘寒微酸涼心潤肺利大小腸

丹溪曰梨者利也生之可行六腑之熟熟之可滋流利下行之謂也

止嗽消痰

清喉降火

生之可行六腑之熟熟之可滋五臟之陰實火宜生虛火宜熟除煩解渴潤燥消

人知其清火消痰

風不知其散風之妙醒酒解毒

經疏曰膏粱之家厚味醇酒縱肆無節必多痰火癰痘卒

中之患唯數食梨能治傷寒發熱熱嗽痰喘中風失音
轉重爲輕變危爲安治瘧病亦良

搗汁頻服

聖惠方梨汁煮粥治小兒心臟風熱昏躁切片貼湯火傷脾虛泄瀉乳婦及金

瘡忌用搗汁用熬膏亦良加薑汁蜂蜜佳清痰止嗽與茱

菔相間收藏則不爛

柿潤肺寧嗽滌腸

生用甘以潤肺止欬嗽清胃理焦煩乾柿甘寒而滌滯腸止

洩潤肺寧嗽而消宿血治肺痿熱欬

產寶云產後欬逆煩亂乾柿水煮飲咯血

反胃

有人三世病反胃至孫以柿同飯常食不飲水愈

腸風下血痔漏

肺也人腸相表裡臟清則

肺熱亦除方

勺泊宅編柿乾燒灰飲服

一錢治下血

柿霜乃其津液生津化痰清上

焦心肺之熱爲尤佳治咽喉口舌瘡痛柿生頗寒肺經無

火及風寒作嗽冷痢滑洩者忌之

若與蟹同食令人腹痛

作瀉 柿蒂止呃逆

古方單用取其苦溫降氣濟生加丁香生薑取其開鬱散瘀亦從治之法

木瓜 和脾舒筋滌斂肺

酸澀而溫和脾理胃斂肺伐肝化食

酸能斂斂則止渴酸能化與山楂同

氣脫能收氣滯能和調營衛利筋骨

筋緩者遇之卽利筋急者得之卽舒

熱消水脹治霍亂轉筋

邪傷脾胃清濁不分揮霍擾亂上吐下瀉甚則肝木乘脾而筋爲之轉也

時珍曰肝雖主筋而轉筋則因風寒溼熱襲傷脾胃所致轉筋必起於足腓腓及宗筋皆屬陽明大瓜治轉筋取其理脾

以伐肝也上病則金衰而木盛故用酸溫以收脾肺之瀉痢耗散而藉其走筋以平肝邪乃土中瀉木以助金也

腳氣

脾主四肢或寒溼傷干足絡或胃受溼熱之物上輸於

脚氣脾下流至足則成腳氣惡寒發熱狀類傷寒第脛腫掣

痛爲異爾宜利溼清熱忌用補劑及淋洗昔有患足痺者趁舟見舟中一袋以足倚之比及登岸足已善步矣詢袋中何

舟見舟中一袋以足倚之比及登岸足已善步矣詢袋中何

物乃木瓜也 腰足無力 多食損齒及骨病癰閉

酸收太甚鄭奠一曰木瓜乃酸

滷之品世用治水腫腹脹誤矣有大寮舟過金陵愛其芬馥購數百顆置之舟中舉舟人皆病溺不得出醫以通利罔效迎予視之聞四面皆木瓜香笑謂諸人曰撤去此物溺卽出矣不必用藥也于是盡投江中頃之溺卽如舊

者良忌

鐵反花痔瘡木瓜爲末以鱠魚身上涎調貼之以紙護佳○辟除壁蟲木瓜切片鋪於席上

延調貼之

山楂

古字作楂

○瀉破氣消食化痰散瘀

酸甘微溫健脾行氣消食磨積

善去腥羶油膩之積與麥芽消穀積者不同凡煮老雞硬

肉投數枚則易爛其消內積可知

散瘀化痰發小兒痘疹行乳食停止兒

枕作痛

惡露積於太陰少腹作痛名兒枕痛砂糖調服

療小腸疝氣

茴香佐之

多食令

人嘈煩易飢反伐脾胃生發之氣

凡服人參不相宜者服山楂卽解一補氣一破氣也

胃中無積及脾虛惡食者忌服 有大小二種小者入藥一

名棗核子去皮核
核亦有用化食

宣理氣調中瀉燥溼消痰

積治疝催生

橘皮

橘皮宣理氣調中瀉燥溼消痰

催生

辛能散溫能和苦能燥能瀉爲脾肺氣分之藥

脾爲氣母肺爲氣籥凡用藥皆宜

補藥瀉藥有宜依

陳皮以利氣者

調中快膈導滯消痰

大法治痰以健脾順氣爲主潔古曰陳皮

枳殼利其氣

而痰自下

古曰陳皮

定嘔止嗽利水破癥宣通五臟統治百病皆取

其理氣燥溼之功入和中藥則留白入疏通藥則去白

去白入疏

通藥則去白去白

名橘紅兼能除寒發表

皮能發散皮膚

氣雖中和亦損真元無滯

勿用廣產爲勝皮厚不脆有豬棕紋

福建產者名建皮力薄

浙江衢州出者名

衢皮更惡劣矣陳久者良故又名陳皮

陳則烈氣消無燥散之患半夏亦然故同用名二陳湯

化州陳皮消痰甚靈

治痰欬童便浸曬治痰積薑汁炒入下焦鹽水炒

化州陳皮消痰甚靈

本草綱目 卷十
然消伐太峻不宜輕用況此物真者絕少無非柚皮而已

青皮

瀉肝破氣散積

辛苦而溫色青氣烈入肝膽氣分疏肝瀉肺

凡瀉氣藥引諸皆瀉肺

藥至厥陰之分

柴胡疏上焦肝氣
青皮平下焦肝氣

下飲食入太陰之倉破滯

削堅消痰散痞治肝氣鬱積脇痛多怒久瘧結癖

入肝散邪人脾除痰

故清脾飲胸膈氣逆疝痛乳腫

丹溪曰乳房屬陽明乳頭屬厥陰乳母或因忿怒鬱悶厚

以之爲君胸膈氣不行故竅不得出陽明之血騰沸故熱甚而化膿或因其子有滯痰膈熱含乳而睡虛氣致生結核

者初起便須忍痛揉轉令汁透自可消散治法俱宜以青皮疏肝滯爲主再加石膏清胃熱括樸消腫甘草節解毒餘如沒藥橘葉金銀花蒲公英阜角刺當歸皆可隨宜用之少佐以酒久則凹陷名乳巖不可治矣

最能發汗

皮能達皮

氣虛及有汗者忌用

性頗猛銳如人年少壯未
辛善發敵免躁暴及長大而爲摘皮

如人至老年烈性漸減經久而爲陳皮則多歷寒暑躁氣全消也

橘之青而未黃者古方無用

者宋以後始與陳皮分用

去瓤切片醋拌炒

陳皮升浮人脾肺治高青皮沉降入肝膽治低炒之以醋皆能入厥

所謂肝欲散急食辛以散之以酸泄之以苦降之也

葉治乳癰脇癰肺癰陰行肝氣

消腫散毒絞汁飲之

肉生痰聚氣

時珍曰橘皮下氣消痰其肉生痰聚飲表裏之異如此

核

治疝痛腰腎冷痛去皮炒

香櫟進食

俗作圓

一名佛手柑古名枸櫞音矩員○理氣止嘔健脾

辛苦酸溫入肺脾二經理上焦之氣而止嘔進中州之食而

健脾除心頭痰水治痰氣欬嗽

煮酒飲

心下氣痛性雖中和

單用多用亦損正氣須與參朮並行乃有相成之益爾陳

久者良根葉功用略同

香欒 下氣消食快膈化痰

苦甘酸辛而平下氣消食快膈化痰解酒毒治飲酒人口氣
去腸胃中惡氣散憤懣之氣療妊娠不思食口淡愈痰氣欒
漱用香欒去核切砂餅內浸酒封固一夜煮爛蜜拌勻時時含嚥能去濁惡之氣無滯而

虛者禁之孕婦氣虛者勿與 此柚之屬也其黃而小者爲

密箇其大者謂之朱欒最大者謂之香欒今人誤稱爲香圓

不知香圓卽佛手柑也香欒夏初生白花六月成實至冬黃
熟今人於六七月間採其小實曬乾至十月僞枳實枳殼

花紅

卽林檎○瀨生津

酸澀甘溫生津治消渴洩精水痢小兒門癬

頭髮豎黃瘰癧瘦弱者乾末和

醋

多食發熱閉百脈

枇杷葉

瀉肺下氣

苦平清肺和胃而降氣氣下則火降痰消

氣有餘便是

火

火則生痰治熱

欬嘔逆口渴

時珍曰火降痰消則嘔者不嘔逆者不逆欬者不欬渴者不渴矣一婦肺熱久嗽身如火燎肌

瘦將成勞以枇杷葉款冬紫菀杏仁桑皮木通等分大黃

減半蜜丸櫻桃大食後夜臥各含化一丸未終劑而愈

虛寒嘔吐風寒欬嗽忌之

葉溼重一兩乾重三錢爲氣足

拭淨毛

毛射肺令人欬

治胃病薑汁塗炙黃治肺病蜜水塗炙黃

枇杷甘酸平止渴下氣利肺氣止吐逆除上焦熱潤五臟多

食發痰熱傷脾同炙肉及熱麵食令人患熱黃疾

楊梅和利五臟生津

酸甘溫去痰止嘔消食下氣生津和利五臟能滌腸胃除煩
憒惡氣燒灰服斷下痢甚驗 多食令人發熱衄血損齒及

筋忌生葱同食發瘡致瘀 杭州蘇州最美青時酸紅後變

紫味如蜜鹽藏蜜漬糖收火酒浸俱佳

樹生癩以甘草
釘釘之即除

根

皮解砒毒

煎湯漱牙痛洗惡瘡
燒灰油調塗湯火傷

石榴皮

瀉腸收脫肛外用染鬚

酸瀉而溫能瀉腸止泄痢下血

煅末崩帶脫肛以石榴皮陳

少許濃煎薰洗再加五倍子炒碎末敷而托上之

又能殺蟲浸水汁黑如墨烏鬚方

綠雲油中用之 能戀膈成痰痢積未盡者服之太早反爲

害也 忌鐵器 酸石榴治瀉痢崩中帶下過食損肺壞齒