

百病自療叢書

血崩自療法

上海大眾書局印行

血崩自療法目錄

血崩小言

(一) 崩之命名由來·····	一
(二) 子宮何故出血·····	一
(三) 血崩症狀·····	二
(四) 救急法·····	二
血崩自療各法·····	三

(一) 血熱而崩之自療法·····	三
(二) 鬱結血崩之自療法·····	三
(三) 瘀積血崩之自療法·····	四
(四) 暑搏血崩之自療法·····	四

- (五) 挫跌血崩之自療法……………五
- (六) 行房血崩之自療法……………六
- (七) 孕婦血崩之自療法……………六
- (八) 產後血崩之自療法……………七
- (九) 老年血崩之自療法……………八
- (十) 室女初次行經而即崩下之自療法……………八
- (十一) 熱迫經來似崩非崩之自療法……………九
- (十二) 心脾虛弱經至如崩之自療法……………九
- (十三) 由漏成崩之自療法……………一〇
- (十四) 由崩成漏之自療法……………一一
- (十五) 血崩昏暈之自療法……………一一
- (十六) 血崩嘔噁之自療法……………一二

(十七)血崩腹中實痛之自療法	二
(十八)血崩腹中虛痛之自療法	三
(十九)崩後經閉之自療法	四
(二十)崩後浮腫之自療法	四
(二十一)崩後脇痛之自療法	五
(二十二)崩後成赤帶之自療法	六
前賢論血崩之證情及治療	

(一)原因四則	六
(二)證狀四則	七
(三)治法八則	八
血崩醫案選粹	

(一)崩後發熱腹中有塊	一〇
-------------	----

(一)形瘦頭眩血崩不止·····	一一
(二)崩後帶下身麻如蟲行·····	一一
(三)經停忽崩崩後若漏·····	一一
(四)天癸當止反多防成血崩·····	一一
血崩單方(三十六則)	三三

血崩自療法

中醫朱振聲編著

血崩小言

(一)崩之命名由來

崩者。山傾也。山岳傾倒。勢不可當。子宮出血。倏然而來。血多而勢湧。如山經水刷而傾崩之狀。故名之曰崩。此症原屬子宮出血。曰崩者。狀其勢也。

(二)子宮何故出血

子宮出血。不外熱與傷二端。熱有虛熱實熱。傷有內傷外傷。皆足以損傷血絡。下注成崩。如情志感動。營養不良。心弱病肝。鬱病子宮發炎。及子宮腫瘍。皆爲血崩之主要原因也。流產之際。其胎盤之一部。殘留於子宮壁。或正產之後。有所殘留。子宮因之出血。產後機能未復。偶受感動。亦能出血。血崩情狀。亦不一。致有來勢洶湧者。有如月經而較多。似崩非崩。非崩而象似崩者。

(三) 血崩症狀

血出如崩。身內失去大量之血液。頓呈貧血狀態。其見症有下列數端。

(一) 皮膚呈蒼白色。而口唇指甲兩處尤爲顯明。

(二) 心虛驚悸。四肢發麻。

(三) 眩暈耳鳴。視力朦朧。間有不省人事者。

(四) 脈象現芤。或竟成消失之狀。

(四) 救急法

血崩來勢過劇。以致暈脫。昏迷不省。用條炭燒紅。沃醋薰鼻。以開其竅。醒後用人參熟地大劑濃煎服之。若醒而又昏者。宜用鹽水注射靜脈。與西醫救癆螺痧法同。其他自療各法。分列於後。

□ 血崩自療各法

(一) 血熱而崩之自療法

原因

血熱沸騰。胞絡受損。因而崩下不止。

症狀

心煩口渴。脈數。溺赤。崩下不止。其色鮮紅。

治療

宜清熱而止血。

處方

細生地三錢

白歸身二錢

川連炭四分

淡黃芩一錢

湖丹皮錢半

黑山梔二錢

連喬壳錢半

炒白芍錢半

棕櫚炭二錢

(二) 鬱結血崩之自療法

原因

肝藏血。其性剛烈。氣結則其急更甚。更急則血不能藏。而下崩矣。

症狀

感受不快。胸脘不舒。口乾而渴。嘔吐吞酸。而血崩。

治療

宜平肝解鬱止血。

處方

大生地三錢

炒歸身二錢

炒白朮三錢

炒白芍二錢

血崩自療法

四

北柴胡八分

粉丹皮二錢

黑芥穗二錢

川連炭三分

炙甘草一錢

(三)瘀積血崩之自療法

原因

瘀積胞宮。一旦得有機會。排泄於外。其勢如崩。

症狀

崩下多紫暗之血塊。腹中寬舒。精神雖倦。而甚覺暢適。或則頭目昏眩。

四肢厥冷。腹痛。

治療

精神舒適者。不必服藥。靜養可矣。若見頭目昏眩等象。則宜調攝。用膠

艾四物湯加減。

處方

炙生地三錢

阿膠珠三錢

炙薪艾一錢

製香附七分

紫丹參一錢

春砂仁四分

抱茯神三錢

酸棗仁三錢

川斷炭二錢

炒白芍錢半

乾荷葉一角

(四)暑搏血崩之自療法

原因 暑邪客於子宮。血海大熱。血難停留而下。

症狀 煩熱口渴。血崩不止。

治療 宜清暑安血。

處方 細生地四錢 炒歸身二錢 川連炭三分 淡黃芩二錢

湖丹皮錢半 連喬壳錢半 炒白芍錢半 百草霜二錢

益元散三錢(包)

(五) 挫跌血崩之自療法

原因 升高墜落。或閃挫受傷。血絡受損。以致惡血流下。有如血崩之狀。

症狀 身有傷處。按之作痛。久則瘀血爲祟。面色萎黃。形容枯槁。

治療 宜祛瘀活血止痛。若以血崩治。必成大錯。

處方 生地(酒炒)六錢 生川軍二錢 當歸尾三錢 粉丹皮一錢

炒赤芍二錢 炒枳壳二錢 龜版(醋炙)三錢 桃仁泥三錢

赤茯苓三錢

(六)行房血崩之自療法

原因 婦人氣體素弱。不能攝血。又因勤於房事。淫慾太盛。衝任受傷而起。

症狀 每度交合。陰中必大出血。

治療 宜補氣補精。又須節房事。夫婦之間。至少當分床三月。

處方

潞黨參三錢

炒白朮二錢

大熟地五錢

川黃柏五分

黑芥穗三錢

車前子三錢

山黃肉四錢

川斷肉三錢

白茯苓三錢

(七)孕婦血崩之自療法

原因 或傾跌傷胎。或不戒房事。衝動胎氣。胞宮不能收攝。

症狀 血崩少腹重墜。胎亦下墮。

治療 宜固氣補血。

處方

吉林參三錢（煎沖）

炒白朮四錢

大熟地五錢

炒當歸二錢

川杜仲三錢

川斷肉三錢

山茱萸二錢

遠志肉七分

五味子十粒

白茯苓二錢

炙甘草四分

（八）產後血崩之自療法

原因

產後未滿週月。血路雖淨。胞宮之損傷未痊。不可輕行房事。而無知少婦。貪圖歡合。以致胞宮大傷。血崩不止。

症狀

血來如崩。頭暈目眩。昏黑不辨。模糊如見鬼神。

治療

宜用傳青主救敗求生湯加減。

處方

吉林參三錢（煎沖）

炒歸身二錢

大熟地八錢

山萸肉五錢

淮山藥四錢

炒白朮三錢

炒棗仁三錢

川斷炭三錢

茜根炭二錢

血崩自療法

(九)老年血崩之自療法

原因

中氣虛弱。不能攝納。向下暴注。

症狀

崩下時作時止。久而不愈。脉形濡大。

治療

宜補中益氣。從根本上調治。

處方

潞黨參四錢

炙黃芪三錢

炒冬朮二錢

生地炭四錢

當歸炭二錢

炒阿膠三錢

炙棗仁三錢

抱茯神三錢

炙椿皮錢半

蘄艾炭三分

公丁香二分

(十)室女初次行經而即崩下之自療法

原因

胞宮積滯。經不即行。積之既多。向下排迫。來勢如崩。

症狀

室女及笄。月經卒然暴下。頭目不適。肢體怠倦。

治療

宜調攝衝任。

處方

見瘀積血崩條。

原因

(十一)熱迫經來似崩非崩之自療法

血虛有熱。經血爲熱所逼。乘勢而下。其量故多。所謂天暑地熱。則經血沸溢。

症狀

經來時其量甚多。然來勢又不十分洶湧暴注。似崩非崩。

治療

宜清熱爲主。參入養血之品。

處方

歸身炭二錢

潼沙苑二錢

阿膠(米粉炒)二錢

嫩白薇錢半

女貞子二錢

旱蓮艸二錢

川黃柏二錢

炒白芍二錢

淡黃芩二錢

建蓮心六分

(十二)心脾虛弱經至如崩之自療法

原因

心生血。脾統血。心脾虛弱。統藏失職。臨經不能約束。

症狀

經來暴下而多。其勢如崩。心悸頭暈。脈細弱。或花大。

治療

宜補益心脾。

處方

野於朮三錢

炙黃芪二錢

潞黨參三錢

阿膠珠三錢

炒棗仁三錢

烏賊骨三錢

硃茯神三錢

血餘炭一錢

蒲黃炭八分

龍眼肉三枚

(十三) 由漏成崩之自療法

原因

衝任虧損。不能藏血。發爲經漏。諺云。涓涓不塞。將成江河。經漏成崩。卽

此理也。

症狀

經漏既久。忽然崩下。腰痠骨楚。心悸頭眩。脉細濇。

治療

久漏而崩。必有未盡之宿瘀。留戀衝任。昔人云。暴崩宜補。宜攝。久崩宜

清。宜通。由漏而崩。爲時已久。宜調攝衝任。祛瘀生新。

處方

白歸身二錢

阿膠珠二錢

生地炭四錢

大白芍二錢

大砂仁七分

紫丹參二錢

廣艾葉八分

硃茯神三錢

百艸霜一錢(包) 炮姜炭三分 炒穀麥芽各三錢

(十四) 崩成漏之自療法

原因 氣血相附。血崩之後。氣亦虧損。以致衝任奇經失束。故不時漏下。
症狀 曾經血崩。崩止而漏下頻頻。

治療 宜固攝奇經。

處方 眞阿膠二錢 厚杜仲三錢

菟絲子三錢 沙苑子三錢 川斷肉三錢

烏賊骨三錢
蘄艾炭三分 製香附八分

震靈丹二錢

(十五) 血崩昏暈之自療法

原因 血去太多。厥脫之兆也。

症狀 血崩兩目黑暗。昏暈在地。不省人事。

治療 宜培補氣血。參入止崩之法。

血崩自療法

處方

大熟地一兩

炒當歸三錢

潞黨參八錢

生黃芪三錢

炒白朮三錢

茜根炭錢半

蒲黃炭一錢

赤石脂(包)四錢

煅牡蠣四錢

(十六)血崩噁嘔之自療法

原因 血去過多。肝木失其涵養。致厥陽衝侮胃土。胃中之濁逆而不降。
症狀 崩下之勢。不甚劇烈。嘔吐噁心。飲食不下。脈細絃苔濁質膩。
治療 宜固陰止血。抑木扶土。

處方

台參鬚二錢(煎沖)

小川連三分

茯苓神各二錢

血餘炭(包)錢半

炒竹茹錢半

陳皮一錢

製半夏二錢

茜草炭二錢

炒黑蒲黃錢半

炙烏賊骨三錢

旱蓮草錢半

藕節五枚

(十七)血崩腹中實痛之自療法