

傷寒
送
決
串
解

傷串

寒解

醫

訣

傷寒醫訣串解卷一

閻長樂陳念祖修園著

受業姪道著纂集

東治林壽萱校訂

太陽篇第一

太陽爲寒水之經主一身之表

何謂太陽經症曰頭痛項強發熱惡寒是也有虛邪實邪之辨

脈緩自汗惡風爲虛邪宜桂枝湯○如八九日過經不解如瘧狀而熱身癢以其不得小汗故也宜桂枝麻黃各半湯因前此未汗不得不發其汗因日數頗久故小發其汗○如服桂枝湯大汗出後形如瘧日再發者以餘邪未盡故也宜桂枝二麻黃一湯大汗之後不得再行大汗之法而餘邪未盡不得不從汗而竭之但藥品宜輕耳

脈浮緊無汗惡寒爲實邪宜麻黃湯○如無汗煩躁者加石膏薑棗
名大青龍湯○如乾嘔而咳去杏仁加五味乾薑半夏細辛芍藥名
爲小青龍湯此一湯卽麻黃湯之加減總不出麻黃湯之範圍此二
法治表中之表也

何謂太陽腑症曰表邪不去必入於裏膀胱爲表中之裏也有蓄水
蓄血之辨

太陽症其人口渴煩躁不得眠脈浮小便不利水入卽吐爲膀胱蓄
水症宜五苓散

太陽症其人如狂小腹鞭滿小便自利脈沉爲膀胱蓄血症宜桃仁
承氣湯此二法治表中之裏也

何謂太陽變症曰汗下失宜從陰從陽之不一也。

不應下而下之續得下利清穀身疼痛宜四逆湯以救清穀之裏又以桂枝湯以救身疼痛之表。

病發熱頭痛脈反沉若不瘥身體疼痛當救其裏宜四逆湯。

大汗大下利而厥冷者四逆湯主之。

太陽病發汗太過遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸桂枝加附子湯主之。

太陽病發汗太過動其營血而衛邪反內伏其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲墜地者真武湯主之。

已上言汗下太過傷正而虛其陽陽虛則從少陰陰化之症多以太

陽少陰爲表裏也。

陽盛於內。誤服桂枝湯。大汗出。後大煩大渴不解。脈洪大者。白虎加人參湯主之。

傷寒若吐。若下後七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風。大渴。舌上乾燥而煩。欲飲水數升者。白虎加人參湯主之。

傷寒不大便六七日爲裏症。頭痛發熱爲表症。外不解由於內不通也。下之裏和而表自解矣。與承氣湯。

病人煩熱汗出則解。又如瘧狀。日晡所發熱屬陽明也。脈實者宜下之。與大承氣湯。脈虛者宜發汗。與桂枝湯。

發汗後惡寒者。虛故也。不惡寒但熱者。實也。當和胃氣。與調胃承氣。

湯

太陽病未解。脈陰陽俱停。停者沉滯不起也。陰陽者尺寸也。先振慄汗出。乃解。但陽脈微者。先汗而解。但陰脈微者。下之而解。若欲下之。宜調胃承氣湯。按此脈微。卽上文脈停也。○已上言汗下失宜。熱熾而傷其陰。陰傷則從陽明陽化之症。多以太陽陽明遞相傳也。

何謂發汗。利水爲治太陽兩大門。曰邪傷太陽病。在寒水之經。驅其水氣以外出。則爲汗。逐其水氣以下出。後爲黃涎。蓄水前爲小便。長太陽爲寒水之經。邪之初傷。必須發汗。麻黃湯發皮膚之汗。桂枝湯發經絡之汗。葛根湯發肌肉之汗。小青龍湯發心下之汗。大青龍湯發其內。擾胃中之陽氣。而爲汗。此發汗之五法也。若汗之而

不能盡者則爲水。水在心下乾嘔而咳。宜小青龍湯發熱而煩渴。欲飲水。水入卽吐。名曰水逆。宜五苓散。汗後心下痞硬。乾噦食臭。脇下有水氣。腹中雷鳴下利者。病勢雖在腹中而病根猶在心下。宜生姜瀉心湯。此水氣在上焦在上者。汗而散之也。若妄下之後。自心上至小腹硬滿而痛不可近。水與氣所結。脈遲名大結。胃宜大陷胸湯。若項亦強如柔痊之狀。宜大陷胸丸。蓋病勢連於下者。主以湯。病勢連於上者。主以丸。是也。若其結止在心下。按之始痛。脈浮滑名小結胸。邪氣尙在脈絡。宜小陷胸湯。若無熱症。名寒實結胸。宜三物白散。若心下痞鞭滿引脇下痛。乾嘔短氣。汗出不惡寒。三焦升降之氣阻格難通。宜十棗湯。此水氣在中焦中滿瀉之於內。

也。若頭痛項強，翕翕發熱，無汗，心下滿微痛，小便不利者，因膀胱之水不行，營衛不調，不能作汗，宜以桂枝去桂加茯苓白朮湯治之。是水氣在下，焦在下者，引而竭之，是也。

內經云：太陽之上，寒氣治之，所謂本也。本之下，中之見也。見之下，氣之標也。又曰：太陽從本從標。又曰：太陽爲開。又熱病論曰：傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛，腰脊強。

傷寒論云：太陽之爲病，脈浮，頭項強痛而惡寒。

又云：太陽病發熱汗出，惡風，脈緩者，名爲中風。

又云：太陽中風，陽浮而陰弱，陽浮者，熱自發，陰弱者，汗出，黃芩惡寒，漸漸惡風，翕翕發熱，鼻鳴乾嘔者，桂枝湯主之。

又云太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之

太陽主一身之表。六經中最外一層。故表病俱屬太陽。但有表中
之表。病在肌腠。則有汗。宜桂枝湯。病在膚表。則無汗。宜麻黃湯。兩
法用之。得當一劑可愈。又有脈微惡寒。面色反有熱色。而身癢。是
邪欲出而未得遽出。必得小汗而解。宜桂枝麻黃各半湯。又有服
桂枝湯。大汗出後。形如瘧。日再發。是肌病兼見表病。宜桂枝二麻
黃一湯。是二方即上兩法之佐也。然二方能治肌腠膚表之病。不
能治經輸之病。太陽之經輸在背內。經云邪入於輸。腰背乃強。論
中以項背強。凡無汗惡風。用葛根湯。項背強。凡反汗出惡風。

用桂枝加葛根湯。二方亦上兩法之佐也。但兩法俱是太陽本寒之症。故方中取用辛熱之品。若太陽標熱之症。自汗症不得逕用桂枝湯。宜用芍藥甘草湯。以各證與桂枝證無異。唯腳攣急獨異。是太陽之標熱。合少陰之本熱之病也。無汗症不得用麻黃湯。宜用麻杏甘膏湯。以各症與麻黃證相似。唯初起口渴發熱而無惡寒。或發汗已身灼熱。不似論雖另別爲溫病風溫之證。然節首冠以太陽病三字。蓋指太陽之標熱而言。明明爲一隅之舉。不讀內經不能解也。其云桂枝二越婢一湯。爲標內陷於裏陰而化熱。又熱多寒少而脈微弱。論曰無陽言無在表之陽也。論曰不可發汗言不可發太陽之表汗也。故用此湯直從裏陰而外越之也。此又

可借用爲上兩法之佐也。然太陽爲表而亦有裏膀胱卽太陽之裏也。如太陽症發熱無汗而心下滿微痛小便不利不宜取汗宜桂枝去桂加茯苓白朮湯令小便利則愈。又有發汗後脈浮小便不利微熱消渴之症又有中風發熱六七日不解而煩爲表症渴欲飲水爲裏症論名曰表裏症水入則吐論名曰水逆證兩證俱宜五苓散多飲煖水以出汗此表中裏症之治法也。至若大青龍湯因脈浮緊身疼痛不汗出而煩躁爲麻黃證之重者而設小青龍湯因表不解水停心下而咳噎變大青龍湯之大寒大散而爲發汗利水之劑卽是麻黃湯之加減總不出麻黃湯之範圍卽若桂枝去芍藥湯因桂枝症誤下脈促胸滿而設桂枝去芍藥加附

子湯又因前症。脈不見促而見微身復惡寒而設桂枝加附子湯。因發汗太過遂漏不止惡風小便難四肢微急難以屈伸而設此。因大汗以亡陽因亡陽以脫液取附子以固少陰之陽固陽卽所以止汗救液也。推之汗後病已解復煩及桂枝症初服桂枝湯反煩不解刺風池風府欲再與桂枝湯則愈其用甚廣總不出於桂枝證頭痛發熱汗出惡風八個字之外。須知太陽治法不外桂枝麻黃二湯服麻黃湯之後復有再服桂枝湯之法服桂枝湯之後並無再服麻黃湯之法更須知太陽爲寒水之經病本寒者較多病標熱者較少若標本兼病亦以熱多寒少爲欲愈治傷寒者當知所重矣此論太陽病以桂枝麻黃二湯爲主一線到底千古註

家無此明晰外此亦卽二湯之更進一步非離乎二湯之外而立法也太陽主一身最外一層邪從外來須要驅之使出服上二湯尙不能出或留本經或侵他經必藉少陽之樞轉以達太陽之氣而外出也故小柴胡湯爲太陽篇之要劑今人不知擅改爲少陽主方失之遠矣故無論桂枝證麻黃證若值三日九日十五日少陽主氣之期必藉其樞轉而出或又見往來寒熱樞不轉現出開閤不利之象胸脇苦滿胸乃大陽出入之部脇爲少陽所主之樞默默不欲食心煩默默必袖機內鬱而心煩喜嘔不欲食必胃氣不和而喜嘔嘔則逆氣少疎故喜也或涉於心而不涉於胃則胸中煩而不嘔或涉於陽明之燥氣則渴或涉於太陰之脾氣則腹

中痛或涉於厥陰之肝氣則脇下痞鞭或涉於少陰之腎氣則心下悸而小便不利或太陽藉少陽之樞轉已有向外之勢則不渴身有微熱或涉於太陰之肺氣則咳者皆以小柴胡爲主而隨在或然之證加減而治之若太陽病過經不解先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩與大柴胡湯下之以平其胃則愈凡太陽篇有柴胡之方或因其病象有從樞欲達之意而以柴胡達之抑因其久鬱未解之邪一得柴胡可以從樞達之無非乘機利導之法亦即麻黃桂枝三湯進一步之佐也推而言之太陽之氣外行於胸膈不能外而病於內實則爲大小陷胸湯證虛則爲諸瀉心湯證且太陽之氣上行而至於頭下行而歸於腹不能上而病於下

從背而下結於胞室則爲桃仁承氣湯證從胸而下瘀於胞室則爲抵當湯證何莫非桂枝麻黃二湯應用不用或用之法所收哉蓋太陽經正治法不過二十餘條而已其他則皆權變法斡旋法也假使治傷寒者審其脈之或緩或緊辨其證之有汗無汗則從而汗之解之加桂枝麻黃等法則邪卻而病除矣其或合陽明或合少陽或合三陽者則從而解之清之加葛根湯治太陽陽明合病下利葛根加半夏湯治合病不下利而但嘔者黃芩湯治太陽少陽合病而自利黃芩加半夏生薑湯治合病而嘔者加白虎湯治三陽合病其云腹滿者爲陽明經熱合於前也其云身重者爲太陽經熱合於後也其云難以轉側者爲少陽經熱合於後也

其云口不仁而面垢者熱合少陽之府也其云譫語者熱合陽明之府也其云遺尿者熱合太陽之府也既審其爲三陽之合又必得自汗出之的證而後用白虎湯之的方斯邪分而病解此爲正治之法顧人氣體有虛實之殊藏府有陰陽之異或素有痰飲痞氣以及咽燥淋瘡汗衄之疾或適當房室金刃產後亡血之餘是雖同爲傷寒之候不得竟用麻桂之法矣於是有旋覆代赭石湯治傷寒汗吐下解後心下痞鞭噫氣不除是胃氣弱而未和痰氣動而上逆之症有茯苓桂枝白朮甘草湯治吐下後邪解而爲飲發之證金匱云膈間支飲其人喘滿心下病堅又云心下有痰飲胸脇支滿目眩又云其人振振身瞤劇者必有伏飲其云發汗則