

傷寒補亡論

仲景傷寒補亡論卷第十一

河南郭雍謹次

發汗吐下後七十三條

仲景曰脈微而濇者此爲醫所病也大發其汗又數
大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏
月盛暑欲著複衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽
微則惡寒陰弱則發熱此醫發其汗使陽氣微又大
下之令陰氣弱五月之時陰氣在裏胃中虛冷以陽
氣內微不能勝冷故欲著複衣十一月之時陽氣在

內胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身又陰脈遲濇故知亡血也龐氏曰陽微宜四逆湯陰弱宜苦酒艾之類常氏云宜小建中湯雍曰陽微陰弱之證其候至微亦未易言仲景初謂亡血之人病當先寒後乃發熱則一病之內陽微陰弱之證先後俱見也故言醫發汗使陽氣微又大下之使陰氣弱則知一病是二證也夏月盛熱欲著複衣冬月盛寒欲裸其身謂暑月猶有寒不必重言其熱寒月猶有熱不必重言其寒也若如是則暑月有寒熱寒月亦有

寒熱非五月病者獨見寒十月病者獨見熱也故常
氏用小建中湯似得其意令陰陽兩建之雖藥證相
得第恐力微此外亦無藥矣龐氏分寒熱爲兩證則
陽微用四逆陰弱用酸苦然疾證初不分用藥又難
分也夫然則當見寒時用四逆又恐後乃發熱時熱
太甚不可制若龐氏藥用之于表熱裏寒表寒裏熱
之證則相宜蓋表熱裏寒表寒裏熱白是兩病非陽
微陰弱同病之證也粗工以表熱裏寒表寒裏熱便
爲陽微陰弱者尤非是此證雖甚希有而前人論說

尙多失仲景之意則後人用藥宜審矣

又曰寸口脈浮大而醫反下之此爲大逆浮則無血大則爲寒寒氣相搏則爲腸鳴醫乃不知而反飲冷水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人則餽常氏云宜甘草豆蔻散

又曰太陽病三日已發汗若吐若下若溫鍼仍不解者此爲壞病桂枝不中與也觀其脈證知犯何逆隨證治之

又曰脈浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者

不可發汗當自汗出而解所以然者尺中脈微此裏
虛須表裏實津液自和卽自汗出愈常氏云疑缺雍
曰宜柴胡桂枝湯

又曰凡病若發汗若吐若下若亡血若亡津液陰陽
自和者必自愈

又曰大下後復發汗小便不利者亡津液故也勿治
之得小便利必自愈

又曰下之後復發汗必振寒脈微細所以然者內外
俱虛故也常氏云可芪參建中湯

又曰本發汗而反下之此爲逆也若先發汗治不爲逆本先下之而反汗之爲逆若先下之治不爲逆雍曰此謂病當先汗而反先下之者故爲逆若已汗而後下之不爲逆也若病當先下而反先汗之故爲逆若已下而後汗之不爲逆也

又曰太陽病先下之而不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因致冒冒家當汗出自愈所以然者汗出表和故也得裏未和然後復下之常氏云可桂枝大柴胡湯雍曰大字誤當是兩藥先用柴胡桂枝湯和其

表復下之者用大柴胡湯

又曰得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足溫醫二三下之不能食而脇下滿痛面目及身黃頸項強小便難者與小柴胡湯後必下重本渴飲水而嘔者柴胡不中與也食穀者噦常氏曰可柴胡桂枝乾薑湯飲水嘔者五苓散噦者小半夏湯

又曰太陽病二三日不能臥但欲起心下必結脈微弱者此本有寒分也反下之若利止必作結胸未止者四五日復下之此作協熱利也常氏云可理中湯

結胸者大陷胸湯協熱利表不解者桂枝人參湯

又曰太陽病下之其脈促

一作緩

不結胸者此爲欲

解也脈浮者必結胸脈緊者必咽痛脈弦者必兩脇拘急脈細數者頭痛未止脈沈緊者必欲嘔脈沈滑者必協熱利脈浮滑者必下血常氏云結胸陷胸湯咽痛豬膚湯兩脇拘急小建中湯頭痛未止小柴胡湯嘔者小半夏湯協熱利者白頭翁湯下血者檨皮湯雍曰檨皮湯用梔子檨皮湯

又曰太陽少陽併病而反下之成結胸心下鞭下利

不止水漿不下其人心煩常氏云可陷胸湯雍曰太
少二陽水木無負因下傷胃三陽俱病輕者不成結
胸宜理中湯或無效者宜枳實理中丸

又曰脈浮而緊而復下之緊反入裏則作痞按之自
濡但氣痞耳常氏曰宜小陷胸湯增損理中丸雍曰
先枳實理中湯不解用半夏瀉心湯

又曰傷寒吐下發汗後虛煩脈甚微八九日心下痞
鞭脇下痛氣上衝咽喉眩冒經脈動惕者久而成痿
常氏云可茯苓桂枝五味甘草湯成痿者振痿湯

甘草

湯未見方疑用茯苓
桂枝白朮甘草湯

又曰陽明病不能食若攻其熱必噦所以然者胃中
虛冷故也以其人本虛攻其熱必噦常氏云可溫中
湯小半夏湯雍曰宜理中湯

又曰陽明病脈遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便
難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脈遲故
也常氏云可茵陳湯五苓散雍曰此當煎茵陳湯一
物調五苓散作茵陳蒿湯也

又曰夫病陽多者熱下之則鞭汗多極發其汗亦鞭

常氏云可小柴胡湯

又曰太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒
不嘔但心下痞者此以醫下之也常氏云可生薑半
夏二瀉心湯

又曰太陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹
自痛若下之必胸下結鞭常氏云可桂枝加芍藥湯
桂枝加大黃湯雍曰本太陽病反下之因腹滿痛轉
屬太陰者桂枝加芍藥湯主之大實痛者用桂枝加
大黃湯今證吐而食不下自利腹滿自痛皆無實證

不可使用桂枝加大黃湯有微寒者當宜桂枝加附子湯存芍藥而不去也

又曰傷寒大吐大下之極虛復極出汗者其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也常氏云可小溫中湯雍曰胃寒甚者理中湯噦者小半夏湯五苓散

又曰吐利發汗後脈平小煩者以新虛不勝穀氣故也常氏曰可調胃承氣湯雍曰勿服藥奪其食則愈以脈平不可再損也

又曰太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞
表裏俱虛陰陽氣並竭無陽則陰獨復加燒鍼因胸
煩面色青黃膚瞶者難治今色微黃手足溫者易愈
常氏云可小柴胡湯桂枝龍骨牡蠣湯雍曰心下痞
者枳實理中丸燒鍼胸煩桂枝加龍骨牡蠣湯外證
未除者桂枝加人參湯

又曰太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒
少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微一作浮
緩者爲欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更

發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必痒屬桂枝麻黃各半湯

又曰服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者屬桂枝去桂加茯苓白朮湯

又曰太陽病先發汗不解而下之脈浮者爲不愈浮爲在外而反下之故令不愈今脈浮故知在外當須解外則愈宜桂枝湯雍曰此證本當先汗所謂若先發汗治不爲逆也

又曰下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈沈遲身無大熱者屬乾薑附子湯

雍曰此證本當先下所謂若先下之治不爲逆也

又曰傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沈緊發汗則動經身爲振振搖者屬茯苓桂枝白朮甘草湯

又曰發汗若下之後病仍不解煩躁者茯苓四逆湯又曰發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹屬梔子豉湯若少氣者梔子甘草豉湯若