

病理撮要

下

如髓肉瘤

此如髓瘤，多是與骨相連，而屢起於髓穴，乃髓珠大而多所成，中雜許多黍珠，間珠之質十分稀少，所以各珠幾乎互相挨貼，該瘤或如是多血，以致有顯然之脈跳，發自上下牙座，此成一種齧瘤，當起於髓穴骨之結密質，張過瘤外，以手摸之，生所謂蛋殼之逼迫聲，其軟硬比別種肉瘤都硬，剖之有一律之潑狀，色紅或棕，或如紅酒，此蓋極不同於眾也，於眾肉瘤之中，此之毒性最少。

黑肉瘤

在此種珠含黑色之粒，此粒與流出之血者有別，從前號爲黑呀吵之瘤，其實大半是黑肉瘤，所生之處，眼爲最多，而皮次之，其癆慣是由本來有色之質而起，軟而有血，剖之呈

黑棕色，或有斑點起紋之狀，其珠大率是黍形，但有時乃卵樣或圓者，身上各經幾乎無一不可有此，且性最毒也。

**沙瘤**

此乃不可定斷之瘤，意度其有肉瘤之性，生自腦膜，而乃漿粒所成，中有鈣質竄入，血脂與珠俱不甚多焉。

論肌瘤

所謂肌瘤者，肌質之瘤也，平時多兼連網舒長，甚少純是肌質者，考其肌線幾乎都是無紋一種，至所生之處無次不由肌質，而以子宮之圍爲最，生在此經，當其發大，便將原質推過一邊，而突入腹統膜穴內，或子宮房內焉。

在子宮內，長成有蒂，便成一種子宮瘰肉，而此種之瘤，在膀胱

底核、食臈、胃經、腸部，亦有見之。此瘤之長，緩而從中，每每不止一箇，且有苞包裹，因其間隔連網之多，此子宮瘤，雖不妥貼，亦曾獲子宮筋質瘤之名。

肌瘤之性，格外趨於變鈔，在子宮內，成爲一團硬而似石之質，所謂胎石者，卽此也。

有時子宮之內，因生肌瘤，以致血流不止焉。

肌瘤時又可壞變如涕，使瘤內成窩如袋。

肌瘤之性，乃韌而形似梨且圓也。其堅實處，須視連網之多寡，與其老嫩，色則有紅若肌色，而遞減至淡紅或灰白者。

驗以顯微鏡，見在連網之中，有黍樣之珠焉。其珠有如棍形之

珠顆者與肌束參雜或收聚於此此瘤無毒性

### 論腦筋瘤

此爲腦筋質之瘤真腦筋瘤甚少有見雖許多之瘤與腦筋相連者曾獲是名矣如筋網瘤肌瘤膠瘤之在腦筋鞘內者是也腦筋瘤多是平常之白衣腦線是以其質性像乎腦脊腦筋腦筋線之外又有多少連網焉

此瘤之長也緩鮮至甚大多作爲孤單無偶之贅疣雖則甚痛但性全無毒無次不由前在之腦筋質而起或乃脊腦筋或乃顱腦筋不等

### 論血脂瘤

此乃血脂所成之癰，有少許連網繫住者，在此名下，有各種之血瘰及脂通血瘰，共分為兩種。

一 平常血脂癰，或微脂癰，於此之新血脂大都像乎平時之微脂，此癰多處於皮膚淺層，而成人人熟識之胎生瘰，乃不過略略凸高，然亦有處於涕膜下質或皮下之質而成大癰者，論色為紅，蓋論淺者或作青蓮，又或作紫，當處於皮下而大概無次不是胎生也，有此血脂癰，每每兼有脂癰，腦連網肉癰，及肉癰焉。

二 空洞或迴脂血癰，在此之血脂寬而彎曲，互相通連，有如在豎立之質一式，而似乎陽莖旁幹也。

此血脂癰，乃起自血脂，大都見於皮，亦見於涕膜，其長也緩而

罕至於大性趨潰爛且流血焉

色多是帶藍有時顯有脈跳慣見於皮及皮下之質但亦有見於眼窩肌肉肝經脾經及腎經之內者

其長也或由平常血瘤內之血脂張展或乃胎生者然有云中  
年後亦可生長於肝經當其時肝珠已起首變小也

### 論刺瘤

考其性質此瘤與平常之刺相似而由前在之刺而起而以在  
涕膜面溼膜面或皮面爲最多也然亦可由皮下連網自然而  
發如發於胃與聲脰者是也

平常之刺瘤多小而尖中乃連網所成而外圍以膚也連網之

血脂猶如平常之刺，上升至尖，復返而下，成爲圈套，或結爲網不等。

原其致之之故，此瘡多由於有種之黽激也。

續次之變，以流血及潰爛爲最常，流血或乃如斯利害，至有性命之危，蓋腸內及膀胱內刺瘡所常見者也。

刺瘡之在皮上者，包括飯蕊及生如角之質。

刺瘡之較大而更多血者，皮面或有之，如花柳毒之飯蕊及肉粒是也。此見於男女外育具及繞糞門之處，乃黽激之液所致發也。

刺瘡按症而論，乃無毒之瘡，但以其破爛久耐與及流血，或足

以致命刺瘡或可誤爲膚癰

當生在膀胱及腸內

第刺瘡其膚乃體質相

同因其獨在刺之面而從不生入其連網底之內也在膚癰其膚乃異質異性者見於瘡底且亦見於附近連網之內也

然有一瘡始初爲平常之刺瘡卒或變作膚癰此切須謹記焉

### 論核瘡

斯爲核質之瘡而以其有小囊內鋪膚珠則似乎管核或球核至小囊之互相分隔不過獨以連網是爲藏血脂者

核筋網瘡乃瘡連網比本來格外多之名號也

核瘡時時皆由窩與核而起如起自乳核

此乃最起自胃腸鼻常之處

起自胃腸鼻

孔腮頭子宮陰道之涕窩且亦有起自肝與別經者也其起也

或作爲有囊或長圓形之萌芽、或作爲貼小管或曰小囊裏之  
膚之天生大長、而宛似原行之核質焉、此生長膚質、其基址之  
連網、性近於生長過度、而堆積於空間地內、直至此轉爲圓球、  
或轉爲圓條、此生長之質、多是有苞包裹、當其勻佈全核、則成  
核質生大、然其多是限於一定小葉之內、此以其增大、及以其  
壓力、能致管之堵塞、成而爲袋、變壞與變小焉、續次之變、其最  
常者、當推壞變爲脂之延、至變牛乳餅及變軟如涕者、

核瘤性韌、堅實而起阜、考其外邊、長形如卵、圓而似球、且顯然  
分葉、論色多像其從而生發之質、其長也緩、而鮮至甚大、當見  
於涕膜、此瘤則軟而似膠、且可逼出面上、在此轉爲有蒂、而成

一種涕質瘰癧肉，剖而視之，見其現作分葉，有時雖赤眼亦可見其核質之性，卽見其如窩之佈置，至鑄隙與如袋之穴，則每每有焉，以顯微鏡驗之，其核質之性，了然畢露矣。

正核癰，性俱無毒，而甚罕見，惟別種之癰，如筋網癰、肌癰、肉癰，則侵害核經較多，而每誤作核癰，如此之雜癰，乃謂之核筋網癰、核肌癰、核肉癰焉。

核癰與從核而發之毒癰，每每甚難分別，蓋二者連網所成之間地，俱有膚珠堆積也，且或肉癰侵入筋網，了無痕跡，則癰之經緯，核質藏於內者，欲斷其真性，常不得其確焉。

乳核乃核癰，或更妥貼，乃核筋網癰最多生之處，蓋膚之佈置

法、經緯相因之數、間地之大小多少、及其內所載珠之數、俱不甚合乎常制也、此等之癰、亦有似核及舊乳等名、考其所說、與上前所論者相符、而其顯微鏡所見之狀、乃見於第<sub>四</sub>圖<sub>二十</sub>也、

論毒癰

卽癰西名喇吵

凡真毒癰、按症而論、性極之毒、所謂毒者何、卽癰之增大、乃由珠之竄入隣質而毀之、且割後性趨於復發、而又重生於內、經與吸核也、別種異質之癰、亦有露毒性、所以割後重發、不足以爲前者所有、定是毒癰之證焉、

據顯微鏡所見、所有毒癰、其互相類似、在乎俱有種種形狀之珠、包藏於筋網經緯之內、而無間珠之質也、

見二十  
五圖

珠之款式

屬乎膚類，大而有諸般形狀，有多角形者，有圓者，有卵樣者，有具尾者，有黍狀者，其大小亦不同，小者中徑有一千五百分英寸之一，而大者有六百分之一，俱內藏大而現露之珠顆，珠顆之內，又有光亮之珠仁焉。

毒癰之珠，並無專類，因以上所名之珠，在別質之內，不拘是本然，或屬乎病，亦有同然絲毫不差者，第其總性，與其分佈在一筋網經緯之內，斯可以定其爲毒癰也。至眾珠之間，並無質線，或別樣之質，此爲毒癰與許多別種之癰最要之分焉。毒癰珠乃藏於連網所成空間之地，而此等之地，互相通連，論珠之性，則各大相懸殊，蓋在乎其所由發之處，或乃層膚，或乃柱膚，或

乃小囊核之膚也。由層膚者，可終以生成如角，每每露有刺珠。由柱膚者，其最外之珠，多仍復作圓條形，而在小囊核者，珠數可以重疊加增，所以其形因互相擠壓，便大變更，是以毒瘤有時分爲鱗珠膚瘤、圓條珠膚瘤及小囊瘤也。割開之面，有汁出焉。至經緯之多寡，看各種毒瘤而異。若瘤長之速，則經緯內藏許多圓或黍樣之珠，使長之緩，則只露不多之珠，而其質乃筋網且結密焉。

血脂乃藏於經緯之內，但從不入藏珠之窩。此事理甚爲緊要，蓋所以分辨毒瘤與肉瘤也。惟有種窩形之肉瘤，及瘤之起於內膚者，則不在此例。血脂又有吸脂與之並行，而此吸脂與窩

通連此於毒瘤之性趨於侵吸核有所關涉也論毒瘤之長醫學著述家有許多作膚珠乃獨由前在之膚而發而又有謂其可以由連網之珠而發或由遷移之白輪而發但二者之說兩並許之似亦近理以膚爲源者其珠較實在屬膚有如膚瘤至出自連網者其屬膚之性則不甚可見有如軟瘤硬瘤焉

瘤之經緯半爲長瘤處之連網所成而半乃新生者也

論其續次之變壞變如脂乃爲最要所有各種瘤類無不有之看多少而已大概以在軟瘤爲最現也至流血生色質壞變似瘤似膠則亦皆可有但變鉅則極罕矣

毒瘤種類如後 共分兩大隊

一小囊毒瘤、該括硬瘤、軟瘤、膠瘤、諸種、

二膚毒瘤、有鱗珠膚瘤、及圓條珠膚瘤、兩種、

**硬瘤**

此種之異、異在其長之老、其經緯之多而結密、其間地

之小、及其膚原質之稀少也、長出之膚質、速於消滅、雖其始或有甚多、其經緯隨後變硬收縮、而有疤質之性、瘤之中處、卒或乃結密筋網所成、膚質獨見於外邊而已、刮之、硬瘤割面白而閃亮、有筋網帶縱橫其間、瘤之較外處、比之中處、不若是之結實、刮之有汁流出、內有許多小粒離珠之珠顆、及有珠顆之珠、有此汁流出、乃瘤最形容之狀也、硬瘤最多生發之地、乃婦女之乳、肝經、與及養道、而最是直肛、幽門、與食脬也、然亦有見於

皮者焉

瘤之原質，迅然變小，而經頽敗之變，其外邊之處，卽瘤長之所，原質最多，但在中處，則幾乎全然不見。

考硬瘤，乃一界限清楚之瘤，硬而分作小葉，且參差不齊，其硬處與外界不齊，乃硬瘤異眾之狀也。瘤之中處，每每下陷，蓋因疤質之收縮，此乃乳生硬瘤極形容之狀。於此地位，合附連之質縮皺，或多或少不等。

硬瘤顯微鏡所見之狀，乃見於第廿六廿七廿八三圖。

**軟瘤**

此瘤之異於硬瘤，在其生長之速，經緯之少，及其軟也。

據顯微鏡所見，瘤之大半，乃有珠顆之珠所成，其大小，其形狀，