

卷五目次

不部

香木一十八種

柏子仁

一
合柏葉

松脂

二
合松節

肉桂

三
合桂心

辛夷

四

沉香

五

丁香

六

檀香

七

降真香

八

烏藥

九

乳香

十

沒藥

十一

血竭

十二

安息香

十三

蘇合香

十四

龍腦香

十五

樟腦

十六

阿魏

十七

盧會

十八

喬木一十八種

黃柏

一

厚朴

二

杜仲

三

椿根皮

四

合櫟

乾漆

五

海桐皮

六

苦練子

七

合棟根

槐花

八

秦皮

九

合歡皮

十

皂莢

十一

合莢刺

訶黎勒

十二

榆白皮

十三

蕪荑

十四

蘇木

十五

櫻櫛

十六

巴豆

十七

大風子

十八

灌木

一十八種

桑皮

一

合桑椹

桑枝

桑葉

楮實

二

枳實

三

合枳殼

山梔

四

酸棗仁

五

蕤仁

六

山茱萸

七

金櫻子

八

郁李仁

九

女貞實

附十

冬青

南燭枝葉

十一

五加皮

十二

枸杞子

附十三

地骨皮

蔓荆子

十四

紫荆皮

十五

木槿

附十六

芙蓉葉

十七

密蒙花

十八

窩木

五種

赤白茯苓

附一合

神琥珀

二

綠芩

三

雷丸

四

桑寄生

五

苞木

三種

竹葉
竹瀝
合竹
茹天竺
黃二

雜木無載

本草彙纂卷五

毘陵顧元交述

木部依舊本分香喬灌寓苞雜六類

柏子仁

香木之一
合劖柏葉

柏字從白西方木也。凡木皆東向而柏獨西指得陰氣最厚其子生於樹杪含蓄精粹氣香透心體潤滋腎同茯神棗仁生地麥冬主治心神虛怯同熟地龜板枸杞牛膝主治腎陰虧損其味甘亦能緩肝故王

好古以爲肝經氣分之藥。其葉苦澀最清血分。故吐
効崩漏者需之。採隨時令。如春採東夏採南之類。或
云當年新抽者更佳。焙乾點湯以代茶飲。過飲亦能
傷胃。仁則體性多油。腸滑作瀉。及膈間多痰者禁用。

松脂

香木之二

合松節松黃

松與柏皆凌霜不凋。而柏屬陰。松屬陽。松脂則又樹
之津液流注。而得乎火土之化。故其味苦而兼甘。氣
溫性燥。甘溫與脾部相宜。主除胃中伏熱。咽乾消渴。
之症。燥則除濕散風寒。苦而燥又能殺蟲也。松節等。

堅氣勁。炒焦治筋骨間病。能燥血中之濕。松黃卽花上黃粉。有除風止血之能。故頭風及下痢每用之。
附松烟墨。凡血症氾濫妄行。須燒松薰烟所作之墨。世所貨賣爲中下之品者皆是。若油烟則爲上品。反不宜於入藥也。水研服能止血。酒研溫服能行血。童便研則涼血。

婦人白帶。用松香五兩。酒二觔煮乾。木白杵細。酒糊丸如梧子大。每服溫酒送下百丸。
歷節風痛。四肢如解脫者。松節三十觔。酒五斗。浸

三七日。每服一合。日五六服。

頭旋腦痛。三月收松花並薹如鼠尾者。蒸切一升。
生絹囊浸酒三升。過五日。每空心煖飲五合。

自盜汗。百藥不效者。松香煮過六兩。熟地黃烏梅
肉各四兩。先搗爛。和松香爲丸。滾水送下。屢驗。

肉桂

香木之三
合桂心桂枝

肉桂色紫而厚。行下焦補命門之不足。益火消陰。雖
云春夏之禁藥。而真陽虛者勿論也。蓋凡木葉心皆
一縱理。獨桂有兩道。如圭形。此亦奇。中有偶陽。中有。

陰故能行兩腎之間宣通滯氣脈弦用建中湯者又取其有殺肝之義昔人有患眼赤腫痛而脾虛不能飲食者肝脉盛脾脉弱用涼肝則脾愈虛用緩脾則肝益旺但於溫平藥中倍加肉桂殺肝而益脾一治兩得之傳云木得桂而枯是也正與別錄桂利肝肺氣壯桂治腸痛腸風之意相符又桂性辛散破血能通子宮故力能墮胎而炒用則無妨至如一切血症之因於熱或大便熱結或肺熱咳嗽及產後血虛發熱或經行血熱先期或卽後期而因於陰虛內熱經

閉。或血熱經行作痛。或小兒痘瘡因血熱乾枯黑陷。
此等誤投禍不旋踵。

桂心卽肉桂去外粗皮及內薄皮。取心中味最辛者。
主治中焦心疼腹冷諸疾。

桂枝取枝上皮薄而味淡。輕浮上行。故能止煩出汗。
而張仲景治傷寒有當發汗。凡數處皆用桂枝湯。狀
又云無汗不得服桂枝。汗家不得重發汗。又汗多者。
用桂枝甘草湯。是又用桂枝止汗也。此等淆訛之說。
不可不辨。蓋桂枝辛甘大熱。能宣導百藥。通體脈。

陽中風營弱衛強。强者風邪中於衛氣而強也。桂枝調其營氣則衛氣亦和。邪無所容故自汗而解解則汗止。出汗止汗無二義也。無汗不得服桂枝。蓋麻黃症也。汗家不得重發汗。不得再用麻黃湯也。大抵辛專主散。肉桂大辛。辛能散結。故有通經逐瘀之能。桂枝辛甘。辛能解肌。甘能實表。故治風傷衛氣。又辛則橫行。桂枝味薄。專行上部肩臂。治痛風能領藥至痛處。以除肢節間痰凝血滯。

十全大補湯兼補氣血兩虛。伊尹古方用四君補

氣加木香。不使上焦氣滯。四物補血。加沉香。不使下焦血滯。上古氣血皆厚。故用二香補而兼之。以疎通。若近世之人氣血單薄。故東垣以黃芪代木香。更益上焦之氣。以肉桂代沉香。溫緩陰血。而使之發生也。

中風口渴。以桂心酒煮取汁。布蘸左嘴塗右。右嘴塗左。

死胎不下。肉桂朴硝當歸酒煎服。又方以桂末二錢。待痛緊時。以重便溫熱調下。亦治產難。又肉桂

同當歸牛膝治冬月難產產門交骨不開又制蒲黃黑豆澤蘭益母草紅花牛膝生地當歸治產後少腹兒枕作痛甚則加乳香沒藥。

辛夷香木之四

辛夷辛溫走氣而入肺。其體輕浮能助胃中清陽上行。所以能溫中治頭面目鼻九竅之症。狀其辛香走竅。凡鼻塞屬於虛人頭面屬血虛火熾者不宜服用。宜去心及外毛。毛射人肺令人欬。

沉香香木之五

沉香純陽而升。體重而沉。味辛走散。氣雄橫行。故治胸背四肢諸痛。及皮膚作癢。且香能溫養臟腑。保和衛氣。若寒濕滯於下部。以此佐舒經藥驅逐邪氣。若跌撲損傷。以此佐活血藥定痛散瘀。蓋雖云氣分之藥。而血隨氣行。以之疏通經絡。則血滯亦從之而去。至其性沉專補右腎。命門相火。用以納氣歸元。固爲聖劑。又云血虛不用沉香。爲其香烈多燥。未免傷血。必下焦虛寒者宜之。若水臓衰微。相火炎盛者。故不宜用。

時珍云。咀香甜者性平。辛辣者性熱。

丁香

香木之六

丁香煖胃。治嘔呃。脹滿之因。於寒者。若係火呃。乃禍匪輕。陶節菴云。丁香得柿蒂乾薑。則止呃。蓋指胃寒之呃耳。

此有二種。雄者顆小。雌者大如山茱萸。又名雞舌。入藥最勝。大明以丁香能治口氣。而朱震亨乃云。口居上地。氣出焉。脾有鬱火。溢入肺中。失其清和之意。而濁氣上行。發爲口氣。若以丁香治之。是揚

湯止沸耳。惟香薷治之甚捷。

烏鬚方以雞舌香同薑汁塗拔去白鬚孔中卽生黑大有奇驗。

檀香 香木之七

檀香理上焦氣主胸膈咽喉之間時珍云自旃檀辛溫氣分之藥理衛氣而調肺利胸膈紫檀鹹寒血分之藥和營氣而消腫毒治金瘡。

降真香 香木之八

降真香香中之清烈者也故能辟一切惡氣不祥身

番舶來者色鮮紅香氣甜而不辣入藥殊勝色深紫者不良上部傷瘀停積胸膈按之痛或并脇肋痛此吐血候也急以真降香刮末入藥煎服之。

紫金散治金瘡卽紫藤香之最佳者。瓮鋒刮下研末用。昔周琮被海寇刀傷血出不止筋如斷骨如折用花蕊石散不效。軍士造前散掩之血止痛定。明日結痂遂愈且無瘢痕。

烏藥 香木之九

烏藥味辛而薄性熱而散氣勝於味佐香附若婦人。