

金匱要畧淺註補正

卷八九

金匱要略淺註補正卷八

漢張仲景原文

閩長樂陳念祖修園淺註

男

蔚古愚
元犀靈右

同校字

蜀天彭唐宗海容川補正

夔門鄧其章雲航參校

嘔吐噦下利病脉證治第十七

夫嘔吐或穀或水或痰涎或冷洙各不相同今

嘔家

因有癰膿

與諸嘔自

不可治嘔

後其膿

盡嘔自愈

此以癰膿之嘔撇開以起下文諸嘔也

嘔家必有停痰宿水若

先嘔却渴者

痰水已去而

此為欲解先渴却嘔者

因熱而飲水過

多熱雖去而飲仍留此

為水停心下此屬飲家

新水之致嘔

嘔家

水從

本作渴

何以不可治嘔

今反不渴者。心下著有支飲。愈動而愈出故也。此屬支飲。宿水之致嘔者又其一

此以嘔後作渴為欲解。先渴後嘔為停飲。嘔而不渴為支飲也。

問曰。病人脉數。數為熱。則熱當消穀引飲。而反吐者。何也。師曰。不數

謂為熱也。而虛者亦見數脈。以過發其汗。令陽微。膈氣虛。其脉乃數。此數不為胃

為客熱。所以其不能消穀。皆胃中虛冷故也。又脉弦者。肝邪之象也。土虛而木乘之。

虛。則受也。今胃氣乏無餘。朝食暮吐。變為胃反。推其致寒。本下在

於上。而醫反下之。大傷令脉反弦。故名曰虛。

此言誤汗而脉數。誤下而脉弦。當於二脈中。認出虛寒。為胃反之本也。

〔補〕曰二脉數爲熱。若熱在胃。則當消穀引飲而不吐也。反吐者。非胃中有熱。乃客熱也。因過發其汗。令太陽之氣傷而微弱。不能充達於膈。膈與心包相連。太陽之氣從此而出者也。太陽之氣不充達於膈。則膈氣虛。膈虛連及心包。致脉不靖而數。凡人之脉皆應心包而動。詳余中西醫解膈氣動而脉數。故曰數爲客熱。以胃爲主。則膈爲客也。客熱在膈中。不在胃中。胃中仍虛冷。故脉數而仍不能消穀也。此即五瀉心湯及連理丸之治。又卽仲景所謂胃中空虛。客氣動膈之謂。膈與胃近。人不辨。是以此證此脉。多不能明。此是言客熱爲上段。其下段。又是言虛寒分爲兩段。各不相蒙。連接解之。便

其所以嘔也
血不足則胸中冷也

不可通下。節云脉弦者。下焦虛寒也。乃反胃之的候。而所以致此反胃脉弦者何故。蓋寒本在上。而醫反下之。以致肝經下焦之陽亦虛。不能化穀。故胃反。令脉亦弦。是肝下焦之虛寒。不僅胃冷而已也。按此兩段。雖皆論胃。而一是兼膈言。一是兼肝言。當分別之。

上言數為客熱。今再推言及脈微而數乎。蓋

寸口脈微而數。微則

而衛虛

無氣。無氣則榮

衛氣

而俱虛榮

之氣隨

虛則血

見日

不足

血不足

上雖見

陰火之數脈而

則胸中

必

冷。

此承上節。數為客熱。而推言脉微而數者為無氣。而非有熱也。

〔補〕曰：此以脉微爲主，而兼見脈數，故爲眞寒假熱。若脫微字，言數脈，則非眞寒假熱之脉矣。故註仲景書「一字不可略過，微則無氣」以下數句，注更不透。蓋氣化津液，微則陽氣微而氣乏；氣乏則津液不足。內經云：「水入於經，其血乃成。」是言津液上交於心，卽化爲血。西洋醫書及余中西醫解言之甚詳。此云「無氣則榮虛者」，卽謂津液不能化血也。故曰「榮虛則血不足」。血者心火之化，血足則火旺，血不足則胸中冷。指心包絡，血不溫通而言致嘔之由，亦多有此。若脫去嘔字，又於榮衛生化之理，不能透徹，則浮淺矣。

尤在涇云：合上二條言之，客熱固非眞熱，不可以寒治之。胸

中冷亦非真冷。不可以熱治之。是皆當以溫養真氣為主。真氣冲和純粹之氣。此氣浮則生熱。沉則生冷。溫之則浮。燄自收。養之則虛冷自化。若熱以寒治。寒以熱治。則真氣愈虛。寒熱內賊。而其病愈甚矣。

上言胃氣無餘。變為胃反。今且由胃而推言及脾手。蓋胃者陽也。脾者陰也。

跌陽脈浮而濇。浮則為胃之虛。濇

則傷

在

脾。脾傷則

胃中所納之穀而

不能磨

化為精粕而出

朝食暮吐。暮食朝

吐。宿穀不化。

而上下行而出

名曰胃反。

若

脈

和緩其土氣尚未緊竭

而濇。其

病難治。

一補

曰。一濇為陰虛。液竭而濇。陰液二字。淺注頗確。惜未發

明。且注緊字亦未顯。蓋飲食入胃。胃為陽土。主燥以化水。脾

爲陰土主潤以化食。脈瀼則陰液虛不能濡化其穀。西洋醫法謂有甜肉汁入胃化穀亦卽此理。今之膈食病糞如羊屎者皆是陰液虛故也。然往往治愈則以脾陰虛而胃陽不虛治陰而不慮損陽是以可愈。若緊而瀼緊則爲寒寒傷胃陽脾陰虛而胃陽亦虛補陽則傷陰滋陰則損陽故爲難治。

此承上節胃氣無餘變爲胃反而推言其病之并在於脾也。
一補曰嘔吐胃反無不兼別臟之病者故上凡三節脈數者是兼膈氣脈弦者是兼肝虛脈微數者是兼心血虛脈浮瀼者是兼脾土虛讀仲景書須如此分看合看乃能貫通。

病人欲吐者

病勢在上

不可

強

下之

○噦

雖在上

而腹滿

却不在上。是病在下。而氣溢於上也。

當視其二陰在前在後知何部不利藥以利之而愈。

此二節言病勢之欲上欲下宜順其勢而利導之也。噦病應歸橘皮竹茹湯節中。此特舉之。與上節爲一上一下之對子。非錯簡也。

胸爲陽位。嘔爲陰邪。使胸中陽氣足以禦邪。則不嘔。卽嘔而胸亦不滿。若

嘔而胸滿者。是陽不至而陰乘之也。以吳茱萸湯

主之。

此言濁陰居陽位。嘔而胸滿也。

〔補〕曰。仲景所謂胸滿。皆指膈膜言。凡言胸中。是指心肺。凡言心下。是正指膈。凡言胸前。是指膈上之膜。連接於胸者也。膈之根。正在肝中。肝體半在膈上。半在膈下。西洋醫法醫

林改錯皆剖視過證之內經其理不爽又與仲景凡言胸膈者其意皆合此胸滿正是肝中寒氣逆上而為胸膈滿且吐也故主吳萸以溫肝經此節是肝寒之循膈而上者則胸滿下節是肝寒之循經而上者則頭痛仲景文義細密如此

吳茱萸湯方

吳茱萸 一升

人參 三兩

生薑 六兩

大棗 十二枚

右四味以水五升煮取三升溫服七合日三服

〔受業林禮豐按〕

一重肝為陽位曠若太虛而胸滿者陰邪佔居陽位也故

之氣佐以入參大棗之一陰一陽以建脾胃之氣以健逆上之陰使陽光普照而陰翳自消有句乾嘔胸滿吐涎沫之患哉

有聲無物謂之乾嘔。則無物吐者盡

涎沫。兼頭痛者。

是寒氣從脛上攻於頭也。以

吳茱萸湯

主之。

溫補以驅濁陰。又以折逆衝之勢也。

此承上節而補出吐涎沫頭痛以明此證。用此湯之手也。
一李氏云二太陰少陰從足至胸俱不上頭。二經並無頭痛證。
厥陰經上出額。與督脈會於顛。故嘔吐涎沫者外寒也。頭痛
寒氣從經脈上攻也不用桂附用吳茱萸者以其入厥陰經
故耳。餘皆溫補散寒之藥。

陽不下交而

嘔。

陰不交而

腸鳴。

其升降失常無非由於

心下痞。

所致者

以

半夏瀉

心湯主之。

此為嘔證中有痞而腸鳴者出其方也。此雖三焦俱病而中

氣爲上下之樞。但治其中而上嘔下鳴之證俱愈也。

一補 曰此心下痞。仍是指膈言。觀胸痺及結胸陷胸痞滿等證。皆指膈間言。蓋心包絡連肺系循腔子爲一層白膜。至胸骨盡處則爲膈。由膈而下爲油網。以達心火於小腸。此心與小腸相表裏之路徑也。凡人飲水入胃。走膜膈下油網。以至膀胱。絕不從小腸中行也。詳吾中西醫解。今若心下膈間火不達於小腸。水不走入膀胱。水火糾結則爲心下痞。上逆犯胃則爲嘔下。溢犯小腸則爲腸鳴。皆水火糾結所致。故用薑半以破水。苓連以制火。參棗甘草保胃實腸。使水火不犯腸胃。各循其消導之路則愈。必如是解而後仲景所論痞滿。

陷痺皆能會通矣。

半夏瀉心湯方

半夏

洗半升

黃芩

乾薑

人參

甘草

兩各三炙

黃連

一兩

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日三服。

〔男元犀按〕

嘔而腸鳴並無下利心下痞下痞不因誤下何以上下之阻隔若是

飲必資中氣方中參棗草以培中氣藉半夏之降逆佐芩連以消痞復得乾薑之溫散使痞者通逆者降矣妙在去滓再煎取其輕清上浮以成化痞降逆之

耳用

乾嘔胃氣逆也若下利清穀乃腸中寒也今

乾嘔而下利

黏濁者

是腸中熱也可知嘔為熱利為挾熱之利以黃芩加

半夏生薑湯主之。

此言熱邪入裏作利而復上行爲乾嘔也與傷寒論大同小異、

黃芩加半夏生薑湯方

黃 芩

生 薑

各三兩

甘 草

二兩

芍 藥

一兩

半 夏

半升

大 棗

十二枚

右六味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜一服。

一男元犀按

太陽主開少陽主樞乾嘔者少陽之邪欲從太陽之開而外出也。下利者太陽之邪不能從樞外出而反從樞內陷也。用黃芩

加半夏生薑湯者轉少陽之樞達太陽之氣交上下清裏熱而薑夏又能止嘔降逆也。此即小柴胡湯去柴胡人參加芍藥去之者恐其助飲而增嘔加之者

取其和胃而降逆。伊聖之方。鬼神莫測也。

有聲無物為嘔。諸嘔吐也。有塞有熱。食入即吐。熱也。朝食暮吐。寒也。穀不得下。咽

者。以小半夏湯主之。祛停飲散氣結。降逆安胃自效。

此為嘔吐而穀不得下者。而出其總治之方也。

小半夏湯方 見痰飲

一犀按一胃主納穀。穀不得下者。胃氣虛寒也。嘔吐者。飲隨寒氣上逆也。胃虛

中散寒。使胃氣溫和。而嘔吐自平。

嘔吐而病在膈上。飲亦隨嘔吐而後思水者。知其解。急以水與

之。以滋其燥。若未思水者。為宿有支飲。阻其正津。而作渴。渴而多飲。則

散主之。

豬苓

此遙承第二節之意而重申之。並出其方治之。少與之飲。以救其液。恐舊飲方去。新飲復來。崇土以逐水。不使支飲阻其正津。則不渴。

補曰。從一後字。悟出思水者。是先思水。淺註真能玩味原文者也。仲景書皆當如此讀。

豬苓散方

豬苓

茯苓

白朮

各等分

右三味。杵為散。飲服方寸匕。日三服。

嘔而心煩。心中懊。內熱之嘔也。今嘔而脈弱。正氣虛也。小便復利。中寒盛也。身有微熱。見厥者。

正虛邪盛。而阻格其升降之機也。此為表裏陰陽之氣不相順接。故為難治。以四逆湯主之。

此爲虛寒而嘔者。出其方治也。陰邪逆則爲嘔。陽虛而不能攝陰。則小便利。眞陰傷而眞陽越。則身有微熱。虛陽又不能布護周身。而見厥。脈弱者。此表裏陰陽氣血俱虛之危候也。此證虛實併見。治之當求其本矣。

一補曰。嘔者小便不利。身熱者不見厥。今兩者俱見。則是上下俱脫之形。故難治。

四逆湯方

附子

生一枚

乾薑

半兩

甘草

二兩

炙

右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓分溫再服。強人可大附子一枚。乾薑三兩。