

足本丹溪心法

丹溪心法附餘卷之六

暑門

瘧

丹溪心法

瘧疾有風 暑 食 痰 老瘧 瘧母 大法風暑當發汗夏月多在風涼處歇遂閉其汗而

不泄故也 惡飲食者必自飲食上得之 無汗者要有汗散邪為主帶補 有汗者要無汗正氣

為主帶散 一日一發者受病一月 間日一發者受病半年 三日一發者受病一年 二日連

發住一日者氣血俱病 瘧病感虛者須以人參白朮一二貼托住其氣不使下陷後使他藥內傷

挾外邪同發內必主痰外以汗解散二陳湯加柴胡黃芩常山草菓煎服 久瘧不得汗者二陳湯

加枳榔倍蒼朮 一方加柴胡葛根川芎一補一發不可直截 老瘧病此係風暑於陰分用血藥

引出陽分則散入方宜

川芎 撫芎 紅花 當歸 炒栢 白朮 蒼朮 甘草 白芷

右剉水煎露一宿次早服

治瘧一日間一日發者補藥帶表藥後以截瘧丹截之若在陰分者用藥掣起陽分方可截即前

藥之屬

充按瘧在陰分須微起陽分者即格致論中云臟傳出至腑亂而失期也又當因其汗之多寡

而為補養升發之術下陷謂陽氣下陷入陰血中無汗要有汗多用川芎蒼朮乾葛升麻柴胡

之屬此丹溪治瘧之微旨學者所當知也

截藥常山飲 穿山甲 炮 草菓 知母 枳榔 烏梅 甘草 常山

右咬咀水酒一大碗煎半碗露一宿臨發日早服得吐為順 一云加半夏柴胡去穿山甲如吐
加厚朴又或加青皮陳皮

又方 柴胡 草果 常山 知母 貝母 檳榔

右用酒水同煎露一宿臨發前二時服

又治瘧母此藥消導

青皮 桃仁 紅花 神麴 麥芽 鼈甲醋炙 三稜 義木 海粉 香附並用醋煮

右為末丸如梧子大每服五七十丸白湯下

又治瘧寒熱頭痛如破渴飲水外多汗出

人參 白朮 黃芪 黃芩 黃連 山梔炒 川芎 蒼朮 半夏 天花粉

右咬咀水二鍾姜三片煎服

又治瘧疾發渴 生苾 麥門冬 天花粉 牛膝 知母 葛根 炒栢 生甘草

右咬咀水煎

截瘧青蒿丸 青蒿半斤 冬瓜葉 官桂 馬鞭草

右焙乾為末水丸胡椒大每一兩分四服於當發之前一時服盡 又云青蒿子一兩冬青葉二

兩馬鞭草二兩桂二兩末知孰是姑兩存之以俟知者

截瘧 檳榔 陳皮 白朮 常山銼三 茯苓 烏梅 厚朴 各一錢半

右咬咀作二服水酒各一鍾煎至一鍾當發前一日一服臨發日早一服服後少睡片時

又瘧疾後 白朮 半夏一兩 黃連半兩 白芍三錢 陳皮半兩

右為末粥丸梧子大每服六十丸姜湯下

附諸賢論

心法附錄曰世用砒霜等毒不可輕用俗謂之脾寒此因名而迷其實也苟因飲食所傷而得亦未必全是寒况其他乎在其陽分者易治陰分者難治瘧母必用毒藥消之行氣消堅為主東垣謂寒瘧屬太陽熱瘧屬陽明風瘧屬少陽在三陰經則不分總曰溫瘧此言是但三陰經說不明凡作於子午卯酉日者少陰瘧也寅申巳亥日者厥陰瘧也辰戌丑未日者太陰瘧也

附脉理

脉訣舉要曰瘧脉自絃絃遲多寒絃數多熱隨時變遷

心法附錄曰瘧脉多絃但熱則絃而帶數寒則絃而帶遲亦有病久而脉極虛微而無力似乎不絃然而必於虛數之中見絃但不搏手耳細察可見也

附諸方

黃連香薷飲

治伏暑發瘧煩渴者

見中暑

桂枝羌活湯

按料方

治瘧疾處暑前發頭痛項強脉浮惡寒有汗者

桂枝

羌活

防風

甘草

各半兩

右為粗末每服半兩水煎如吐加半夏麴等分

麻黃羌活湯

按料方

治瘧疾頭痛項強脉浮惡風無汗者

麻黃

去節

羌活

防風

甘草

各半兩

右為粗末每服五錢水一盞半煎如吐加半夏麴等分

麻黃桂枝湯

按料方

治瘧疾如前病而夜發者或惡風或惡寒

麻黃

去節

炙甘草

三錢

黃芩

五錢

桂枝

二錢

桃仁

二十箇

去皮尖

右為末水煎服桃仁散血緩肝夜發乃陰經而有邪用此湯散血中風寒也

桂枝黃芩湯按辨方治瘧眼藥寒熱轉大者知太陽陽明少陽三陽合病也

甘草 人參 黃芩各四兩半夏四錢柴胡二兩石膏 知母各五錢桂枝 二錢

右為粗末每服五錢水煎服

桂枝石膏湯按辨方治瘧疾先寒後熱熱多寒少 桂枝 五錢 石膏 知母各一兩半黃芩 一兩

右為末三分服每水二盞煎服間日者邪氣所合故也

以上數方發散之劑

人參養胃湯 治瘧疾寒多熱少者必須先用此藥發散然後用四獸飲之類裁之因食倍加草果

見胃寒類

萬安散濟生方治一切瘧疾得病之初以其氣壯進此藥以取効氣虛胃弱及妊婦不宜服之

蒼朮按辨方厚朴按辨方陳皮按辨方白茯苓 常山 酒浸甘草各一錢半

右咬咀水一盞半煎至一盞露一宿當發日作二服忌熱性物片時

定齋草果飲子簡易方快脾治瘧 草菓 蒼朮按辨方厚朴 陳皮 半夏麴 甘草 炙烏梅各五分

右咬咀每服半兩水盞半姜五片棗二箇同煎七分不拘時服寒多者加乾姜附子熱多者只加

柴胡瘧瘧加枳櫛

柴胡桂薑湯活人方治瘧疾寒多微熱或但寒而不熱者并治勞瘧

柴胡 四兩 桂枝 兩半 黃芩 一兩 瓜蒌根 一兩 牡蠣 燒碎 甘草 炙乾姜 各一兩 蛇

石咬咀每服五錢水一盞半煎至八分溫服

柴胡加桂湯活人方治瘧先寒後熱兼治支結

柴胡

八兩 去苗 人參 去芦

甘草

炙半夏 炮七

黃芩

肉桂

去皮 各二兩

右咬咀

每服五錢水盞半姜七片棗二枚煎服若渴者去半夏加人參瓜蒌根同煎服之

以上數方治瘧寒多熱少發散之劑 無汗可用

小柴胡湯

治瘧疾熱多寒少或但單熱頭疼口乾胸滿者 方見溫熱類

柴胡括蔞根湯

治瘧疾往來寒熱煩渴引飲

柴胡

去苗 一兩 七錢半

天花粉

一兩 黃芩 去黑

人參

甘草

炙七錢半

右服一兩姜五片棗一枚水二盞煎一盞去滓通口服

白虎加桂枝湯

治瘧疾但熱不寒及有汗者

知母

六兩

甘草

炙三兩

桂枝

三兩

粳米

三兩

石膏

一斤

右咬咀

每服五錢水盞半煎至一盞去滓溫服

清脾飲

治瘧疾往來寒熱

但熱不寒或熱多寒少口苦咽熱小便赤澀

青皮

去白

厚朴

姜製

白朮

半夏

湯洗

黃芩

草果仁

柴胡

去苗

茯苓

去皮

甘草

炙各等分

右咬咀

每服四錢水盞半姜五片煎七分溫服不拘時

參蘇飲

治發瘧熱多寒少兼咳嗽者 見傷風類

驅瘧飲

治發瘧熱多寒少者

前胡

柴胡

各四兩

桂心

桔梗

厚朴

半夏

各三兩

黃芪

乾姜

炮

甘草

炙各二兩

右剉水

二盞生姜三片棗四箇煎

以上數方治瘧熱多寒少發散之劑 有汗可用

大柴胡湯

治瘧熱多寒少目痛多汗脉大以此湯微利為度餘邪未盡以白芷石膏三物湯以盡

其邪方見溫熱

白芷石膏三物湯 白芷 一兩 知母 一兩 石膏 四兩

右為粗末每半兩水一盞溫服清

以上二方治瘧熱多寒少推逐調和之劑

四獸飲 簡易方 治五臟氣虛喜怒不節致陰陽相勝結聚涎飲與衛氣相搏發為瘧疾

人參 去芦 白朮 茯苓 橘紅 去皮 草菓仁 半夏 湯洗 棗子 生薑 烏梅 甘草 炙減

右咬咀以鹽少許淹食頃用厚皮紙裹了以水溼之慢火炮令香熟焙乾每服半兩水二盞煎六

分未發前併進數服

七寶飲 簡易方 治一切瘧疾不問寒熱多少及山嵐瘴氣寒熱如瘧

厚朴 姜製 陳皮 甘草 炙 草菓仁 常山 雞骨 檳榔 青皮 各等分

右咬咀每服五錢水一盞半酒半盞煎取一盞露一宿空心向東溫服睡少頃時須忌熱性物寒

多加酒服

清肺湯 三因方 治飲食傷脾停滯痰飲發為寒熱

厚朴 四兩 烏梅 去核 半夏 湯洗 青皮 良姜 草菓仁 去破 甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎七分未發前併進三服忌生冷油膩之物

以上三方治瘧寒多熱少止截之劑

常山飲 和劑方 治瘧疾發散不愈漸成勞瘵

知母 川常山 草菓仁 各三兩 良姜 二兩 甘草 烏梅 去核 各一兩六錢

右咬咀每服五錢水一盞姜五片棗一枚煎七分溫服

六和湯 人參 知母 草薺 貝母 烏梅 白芷 枳櫛 柴胡用酒一錢 常山 二錢

右劉姜三片棗一枚酒水同煎露一宿臨發前二時服

以上二方治瘧熱多寒少止截之劑

鬼哭丹 治瘧二三日一發者

常山三斤 醋浸春五日 夏秋七冬十日 枳櫛 各四半 夏 貝母 各二兩

右為末用雞子清麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸隔夜臨睡冷酒吞服次日早再進一服

秘方清脾丸 治瘧三日一發或十日一發

姜黃三錢 白朮半兩 人參 枳櫛 草果 莪朮醋炒 厚朴各半兩 黃芩 半夏 青皮各一兩 甘草三錢

右為末飯丸如梧子大每六十丸食遠白湯下日二服

紅丸子濟生方 專治食瘧 青皮炒三兩 阿魏醋化二錢 蓬朮醋京三稜二兩 胡椒 一兩

右為末別用陳倉米同阿魏醋煮糊丸如梧子大每服五十丸至百丸淡姜湯下或因食生果成

瘧用麝香湯吞下

老瘧飲三因方 治久瘧結成癥瘕瘵癖在胸脇諸藥不愈者

蒼朮油浸 草果去皮 桔梗 青皮 陳皮 良姜各半兩 白芷 茯苓 半夏湯洗去滑 甘草 炙桂心

枳殼麝炒 乾姜炮各三錢 紫蘇葉 川芎 各二錢

右咬咀每服四錢水一盞鹽少許煎七分空心服

山甲湯 久瘧瘵母不治者宜服四獸飲間服此湯 穿山甲 木鼈子等分

右為末每服二錢空心溫酒調下

鼈甲飲子濟生方 治瘵疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名曰瘵母

本草
草果仁 鼈甲醋炙 黃耆去芦 白朮 白芍藥 厚朴燬製 枳榔 木紅 川芎 甘草各分

右咬咀每服四錢水一鍾姜七片棗一枚烏梅少許煎溫服

十將軍丸 久癰不瘥服痛有瘡母

三稜毛一兩 莪朮生 青皮白法 陳皮去白 各草果去殼 川常山二兩 砂仁 枳榔 烏梅 半黃湯洗

石先將常山草果二味剉用酒醋各一椀入瓦器內先浸一宿後入八味藥同浸至晚用瓦銚內炭火煑乾取出晒如無日色用火焙乾為末半酒半醋打糊為丸如梧桐子大每服三四十丸白湯吞下日進三服忌生冷魚腥鹹酸油膩麵諸死毒物服四兩至八兩即除根凡有積聚及行瘴溼地方宜服之

以上諸方消導之劑

四將軍飲良方 治寒熱癰疾作而仆厥手足俱冷昏不知人此雖一時急救之方用之有驗

附子一箇炮 訶子四箇全 甘草炙四錢

右咬咀為四服每服水一鍾半生姜七片棗七枚煎取一半令熱灌病者立可甦省

廣按癰疾發作而僵仆不省人事者蓋由頑痰老痰膠固於中榮衛不行故所以中風中暑而卒倒不省人事者亦由痰之所致也附子性太熱走而不守本是治寒溼之藥今癰疾發作僵仆而用之以其性大熱能開散頑痰使榮衛得行故耳乃是劫劑非正治之藥也

靈薑飲滄療方 用生薑四兩和皮搗汁一椀夜露至曉空心冷服大治脾胃聚痰發為寒熱

廣按生薑自然汁凡中風中暑中氣中毒乾霍亂一應卒暴之證與童便同用立可解散蓋生

姜能開痰童便能降火故也

分利順元散滄療方 治體虛之人患癰疾寒多不可用截藥者

川芎 附子略一南星一兩木香五錢另判臨時入

右除木香不見火外三味各將一半去皮生用一半炮熟合和咬咀每服四錢棗七枚生姜十片水一鍾煎七分當發前一日及當發日早晨連進二三服半生半熟能分解陰陽也

一方 治久瘧 用青蒿桂枝各為末若寒多用桂多蒿少熱多用蒿多桂少三七分互用各以生

姜二兩連皮搗汁和熱酒調服以衣被蓋卧即愈

雄黃散保命集治久瘧不能食胸中兀兀欲吐而不吐此藥吐之必愈 雄黃 瓜蒂 赤小豆等

右為細末每服半錢溫水調下以吐為度

辰砂丸宣明方治一切脾胃虛熱毒者 信硃 甘草各一錢砂二錢大豆四十九粒

右為末滴水丸勻分作四十丸服發日日欲出煎桃心湯下一丸忌熱性物

尅効餅子和劑方治一切瘧疾發作有時先覺伸欠乃作寒慄股振頭顙中外皆寒腰脊俱痛寒戰

既已或內外皆熱頭痛如破渴飲冷水或痰聚胸中煩滿欲吐或先寒後熱或寒多熱少或熱多

寒少或但熱不寒但寒不熱或一日或隔日或發後六七日再發皆治之

龍腦 麝香 定粉研各五錢荷葉 萊豆 甘草各五兩硃砂一兩二錢信醋炙二兩金箔二十五箇為衣

右為末煉蜜搜和勻每兩作二十丸捏匾金箔為衣每服一餅子以新汲水磨化日發者未發前

服之間日發者頭夜服隔數日發者前一日夜服連日發凌晨服

不二散 人言為一兩飛麵四兩與言水和軟白扁豆末二兩細茶末二兩

石同和勻每服小半錢已前半日用溫茶調下再用茶盪淨忌食酒麵魚等物

椎硃丹 用椎黑豆四十九粒五月五日以冷水浸從早至巳時去皮眼乾研為末入信末一錢再

研勻細為丸雄黃為衣晒乾收貯少壯人如梧桐子大衰老人如黃小豆大小兒如萊豆大臨發

時五更面東井水下一丸不止并服黑豆圖者是

一方 治久瘧 大南星 二枚 好信 三錢

石先將南星開孔用信三錢研為末裝入孔內兩星相對用泥固濟炭火煨存性取出研為末用
菜豆粉打糊為丸如豆大每服一二丸臨發日五更溫茶清下白湯亦可

一方 人言 二錢 雄黃 菜豆 各五錢

石為細末麵糊為丸如筋頭大硃砂為衣每服十丸用桃柳條各七寸煎湯露一宿臨發日空心
服面向東忌食熱物魚腥油膩十日

瘧疾良方 百一選方 今人治瘧疾多用常山砒霜之類發吐取涎縱使得安脾胃不能不損不若此

藥最為妥當 辰砂 光明者 阿魏 真者 各一兩

石研勻和稀糊為丸如皂角子大每服一丸空心人參湯下

以上數方劫奪之劑

灸法 濟生方 治瘧疾久不愈

不問男女於大椎中第一骨節盡處先針後灸三七壯立効或灸第三骨節亦可

對金飲子 和劑方 治寒熱瘧疾愈後調理脾胃 厚朴 去皮 姜汁炒 蒼朮 去粗皮 薑汁炒 甘草 炙 各二兩 陳皮 去白

右咬咀每服四錢水一鍾姜三片棗一箇煎服一方加草果倍用蒼朮名草果平胃散

正氣散 徐同知方 退寒瘧止胃寒進食 藿香 兩 草果 兩 半夏 陳皮 厚朴 砂仁 甘草 各一兩

石剉為散生姜棗子煎溫服如瘧未至俟發日早服

草果飲 和劑方 治寒熱瘧疾初愈服此進食理脾 紫蘇 草果仁 良姜 炒 川芎 青皮 甘草 炙 陳皮 去白 白芷 各等分

石咬咀每服四錢水一鍾煎七分熱服

以上數方治瘧初愈理脾胃進食之劑

廣按瘧疾之源蓋由暑月中表氣虛而致中氣虛則水穀停聚而為痰飲於胸膈矣表氣虛則風暑入內而使血凝於經絡矣久則痰飲血液拂鬱稠粘膠固痞塞不通人之榮衛盡行陽分二十五度脊與背也夜行陽分二十五度胸與腹也榮衛行到病所不通乃作寒戰股振頭領中外皆寒腰脊俱痛此正氣入於內也寒戰俱已內外皆熱頭痛如破渴欲飲水煩滿欲吐自汗此邪火發於外也或獨寒而無熱或寒多而熱少或無汗者宜開溝豁痰為主用人參養胃湯草果飲子之類以發散之或熱多而寒少或獨熱而無寒或有汗者宜清熱補虛為主用白虎加桂枝湯小柴胡湯之類以發散之用發散之藥三五服後則用四獸飲六和湯之類以截之或瘧久在陰分亦須用血藥微起陽分然後截之可也

瘧疾治例 出明醫雜著

王節齋曰瘧是風暑之邪有一日一發有二日一發有三日一發有間一日連二日發有日與夜各發有有汗有無汗有上半日發有下半日發有發於夜者治法邪從外入宜發散之然以扶持胃氣為本又須分別陽分陰分而用藥邪瘧及新發熱者可散可截虛瘧及久者宜補氣血若過服截藥致傷脾胃則必延綿不休

主方 柴胡

去白木

一錢

蒼朮

一錢

以上三味

瘧疾必用之

陳皮

甘草

各五錢

乾薑一錢二分

若一日一發及午前發者邪在陽分加枯黃芩茯苓半夏各一錢一熱甚頭痛再加川芎軟石膏各一錢

口渴加石膏知母麥門冬各一錢

若間日或三日發午後或夜間發者邪在陰分加川芎當歸酒炒芍藥熟地黃酒炒知母各一錢一酒

洗紅花酒炒黃藥各四分提起陽分可截之

若問一日連發二日或日夜各發者氣血俱病加人參黃芪白茯苓各一錢以補氣川芎當歸白芍

藥熟地黃各一錢以補血

若陽瘧多汗用黃芪人參白朮以斂之無汗柴胡蒼朮白朮黃芩乾葛以發之

若陰瘧多汗用當歸白芍藥熟地黃黃芩黃藥以斂之無汗柴胡蒼朮大川芎紅花升麻以發之

故曰有汗者要無汗正氣為主無汗者要有汗散邪為主

若病人胃氣弱飲食少或服截藥傷脾胃而少食者加人參半錢酒炒芍藥大麥芽各一錢

若傷食痞悶或有食積者加神麴麥芽枳實炒各二錢炒黃連五分

若痰盛加姜製半夏南星枳實炒各一錢黃芩黃連各六分

若欲截之加檳榔黃芩青皮常山各一錢烏梅淨肉肥者三箇

若日久虛瘧寒熱不多或無寒而但微熱者邪氣已無只用四君子合四物湯加柴胡黃芩黃耆

陳皮以滋補氣血

痢十九

丹溪心法

痢赤屬血 白屬氣 有身熱 後重 腹痛 下血 身熱挾外感小柴胡湯去人參 後重

積與氣墜下之故兼升兼消宜木香檳榔丸之類不愈者用秦艽皂角子煨大黃當歸桃仁黃連枳

殼若大腸風盛可作丸服 保和丸亦治因積作後重者五日後不可下蓋脾胃虛故也 後重窘

迫者當和氣木香檳榔 腹痛者肺金之氣鬱在大腸之間如實者以劉氏之法下之虛則以苦梗

開支然後用治痢藥氣用氣藥血用血藥有熱用黃芩芍藥之類無熱腹痛或用溫藥姜桂之屬

下血四物為主 下血多主食積與熱或用朴硝者 青六丸治血痢効 痢疾初得一二日間以利為法切不可使用止澁之劑若實者調胃承氣大小承氣三一承氣下之有熱先退熱然後看其氣病血病加減用藥不可使用參朮然氣虛者可用胃虛者亦可用 血痢久不愈者屬陰虛四物湯為主涼血和血當歸桃仁之屬 下痢久不止發熱者屬陰虛用寒涼藥必兼升散藥併熱藥下痢大孔痛者因熱流於下也以檳榔木香黃連黃芩炒乾姜 噤口痢者胃口熱甚故也大虛大熱用香連丸蓮肉各一半共為末米湯調下又方人參二分姜炒黃連一分為末濃煎終日細細呷之如吐則再服但一呷下咽便開人不知此多用溫熱藥甘味此以火濟火以滯益滯 封臍引熱下行用田螺肉搗碎入麝香少許盒臍內 下痢不治之證下如魚腦者半死半生下如塵腐色者死下純血者死下如屋漏水者死下如竹筒注者不治 赤痢乃自小腸來白痢乃自大腸來皆溼熱為本赤白滯濁同法 下痢有風邪下陷宜升提之蓋風傷肝肝主木故也有溼傷血宜行溼清熱 內經所謂身熱則死寒則生此是大概言必兼證詳之方可今豈無身熱而生寒而死者 脉沉少留連或微者易治洪大數者難治也脉宜滑大不宜絃急 仲景治痢疾溫者五法可下者十法或解表或利小便或待其自已還分易治難治不治之證至為詳密但與瀉同立論不分學者當辨之 大孔痛 曰溫之一曰清之按久病身冷脉沉小者宜溫宜補暴病身熱脉浮洪者宜清有可吐者亦有可汗可下者 初得之時元氣未虛必狂蕩之此通因通用之法稍久氣虛則不可下壯實初病宜下虛弱良久病宜升之 先水瀉後膿血此脾傳腎賊邪難愈先膿血後水瀉此腎傳脾微邪易愈 下痢如豆汁者溼也蓋脾胃為水穀之海無物不受常兼四臟故五色之相雜當先通利此迎而奪之之義如虛者亦宜審之因熱而作不可用巴豆如傷冷物者或可用宜謹 又

戴云痢雖有赤白二色終無寒熱之分統作溼熱治但分新久更量元氣用藥與赤白帶同

入方 黃連 滑石 甘草 白芍 蒼朮 白朮 當歸 青皮 條芩

右劉水煎裏急後重炒黃連滑石加桃仁枳榔其者大黃嘔者用姜汁半夏

又方 乾姜一錢 當歸半錢 烏梅三箇 枳半錢 黃連

右劉作一服水煎食前若水瀉可等分用或加枳殼 當歸 芍藥 滑石 仁 甘草 白朮等

又方 治熱與血 大黃 黃連 黃芩 枳殼

右為末或湯調或作丸用麵糊或神麴糊丸服一本云誤服熱藥毒海藥毒犯胃者當明審以祛其

治白痢 蒼朮 白朮 神麴 茯苓 地榆 甘草 右劉水煎

治赤痢 地黃 芍藥 枳 地榆 白朮

右劉水煎 腹痛加枳殼厚朴後重加滑石木香枳榔有熱加黃芩山梔

又治痢方 滑石一兩 蒼朮半兩 川芎三錢 桃仁 芍藥半兩 炒甘草一錢

右為末姜一片搗細煎滾服

又方 孫郎中飲水過多腹脹瀉痢帶白 蒼朮 白朮 厚朴 茯苓 滑石

右咬咀水煎下保和丸 又云加炒麴甘草

又方 蒼朮 酒板 白芍 酪半酒 枳 炒半兩

右為末粥丸以四物湯加陳皮甘草水煎湯下

又方 痢後腰痛兩脚無力

陳皮 半夏 白芍 鉅一 茯苓 蒼朮 當歸 酒苓 鉅半 白朮 甘草 各二錢

右咬咀作一服姜煎食前服

又方 治小兒八歲下痢純血作食積治

蒼朮 白朮 黃芩 滑石 白芍 茯苓 甘草 陳皮 神麴炒

石咬咀水煎下保和丸

一老年七十面白脉絃數獨胃脉沉滑因飲白酒作痢下血淡膿水腹痛小便不利裏急後重參朮為君甘草滑石枳榔木香蒼朮為佐下保和丸二十五丸第二日前證俱減獨小便不利以益元散與之安

治痢十法

其或惡寒發熱身首俱痛此為表證宜微汗和解用蒼朮川芎陳皮芍藥甘草生薑三片煎 其或腹痛後重小水短下積此為裏證宜和中疏氣用炒枳殼製厚朴芍藥陳皮滑石甘草煎 其或下墜異常積中有紫黑血而又痛甚此為死血證法當用糯米桃仁滑石行之或口渴及大便秘口燥辣是名挾熱加黃芩或口不渴身不熱喜熱手慰溫是名挾寒加乾姜 其或下墜在血活之後此氣滯證宜於前藥加枳榔一枚 其或在下則纏住在上則嘔食此為毒積未化胃氣未平證當認其寒則溫之熱則清之虛則用參朮補之毒解積下食自進 其或力倦自覺氣少惡食此為挾虛證宜加白朮當歸身尾甚者加人參又十分重者止用此一條加陳皮補之虛回而利自止 其或氣行血和積少但虛坐努責此為無血證倍用當歸身尾却以生芍藥生羊生桃仁佐之復以陳皮和之血生自安 其或纏墜退減十之七八穢積已盡糟粕未實當炒芍藥炒白朮炙甘草陳皮茯苓煎湯下固腸丸三十粒然固腸丸性燥恐尚有滯氣未盡行但當單飲此湯固腸丸未宜遽用蓋固腸丸有去溼實腸之功 其或利後糟粕未實或食粥稍多或飢甚方食腹中作痛切不可驚恐當以陳皮白朮各半煎湯和之自安 其或久痢後體虛氣弱滑下不止又當以藥澁之可用訶子皮

肉豆蔻白凡半夏甚者添牡蠣可擇用之然須用陳皮為佐恐太澁亦能作痛又甚者灸天樞氣海
右前方用厚朴專瀉凝滯之氣然厚朴性大溫而散氣久服大能虛人滯氣稍行即去之餘滯未
盡則用炒枳殼陳皮然枳殼亦能耗氣比之厚朴稍緩比陳皮稍重滯氣稍退當去之只用陳皮以
和眾藥然陳皮去白有補瀉之兼若為參朮之佐亦純作補藥用 凡痢疾腹痛必以白芍藥甘草
為君當歸白朮為佐惡寒者加桂惡熱痛者加黃柏達者更能參以歲氣時令用藥則萬舉萬全豈
在乎執方而已哉

附脉理

脉訣舉要曰瀉則無血厥寒為甚尺微無陰下痢逆冷又曰無積不痢脉宜滑大浮絃急死無害

附諸方

五苓散 治伏熱下痢分利陰陽

黃連香薷飲 治感暑下痢鮮血

清暑益氣湯 治暑病內傷下痢不思飲食發熱

六合湯 治伏熱煩悶或成痢疾 俱見中暑

以上數方治因暑下痢之劑

敗毒散加石連肉 治下痢熱毒不進飲食

倉廩方仁存方 治下痢赤白或因先是寒邪中臟腑致發熱者敗毒散加陳米姜棗同煎 俱見傷風

防風芍藥湯拔粹方 治泄痢飧泄身熱脉絃腹痛而渴及頭痛微汗

防風 芍藥 黃芩 各一兩

右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓食前通口服