

辽宁省药品标准

一九七五

辽宁省卫生局

辽宁省药品标准

(1975年)



辽宁省卫生局

前　　言

为促进药品生产，提高药品质量，保证人民用药安全有效，根据卫生部关于制订地方药品标准通知精神，组织有关部门对我省原有药品标准进行了整理修订，编印成“辽宁省药品标准”（1975），作为省内生产、检验、供应、使用和药政管理部门控制药品质量的依据。过去经我局批准的标准规格与本标准有出入者，均按此标准执行。凡本标准未收载的药品，如进行商品性生产时，必须按规定履行审批手续。

本标准中，如有不够完善和遗漏之处，希有关单位提出意见，以便再版时修订。

辽宁省卫生局
一九七五年十二月

凡例

1. 辽宁省药品标准（以下简称标准）选载了辽宁省已生产供应使用的药品四百三十八种。凡是辽宁省生产的但属于中国药典（1975年）、部颁药品标准（1963年）及部颁抗菌素标准（1972年）收载的品种，本标准不再列入。

2. 标准的目次，为了使用方便，均按药品中文名称的笔画顺序排列的。少品种附列副名。

3. 标准中所用名词、术语、符号、通则、试药、试液、指示液、当量液、克分子液、一般测定法及一般检查法等，除另有规定外，均同中国药典（1975年）、部颁药品标准（1963年）及部颁抗菌素标准（1972年）的规定。

4. 检验方法中所列标准品或对照品，均指卫生部颁发的标准品或对照品。凡卫生部尚未颁发的标准品或对照品系指纯度较高的原料药品（按规定方法测定含量，并按实含量折算应用）。

5. 制剂所用的原料，均须符合中国药典（1975年）、部颁标准（1963年）及本标准的规定，中药制剂处方中原药材的整理炮制，除另有规定外，按“辽宁省中药炮制规范”（1975年）规定加工。

6. 用量，系指成年人的常用量。中药制剂处方中的分量，系指经整理炮制后的重量。

7. 各种药品的鉴别、检查、含量测定等，应按照中国药典（1975年）、部颁标准（1963年）、部颁抗菌素标准（1972年）及本标准规定的方法检验。在实际工作中，如采用其它方法，则应与规定的方法进行对比试验，根据试验结果掌握使用。但在仲裁时应以规定方法为准。

8. 度量衡采用公制，用下列符号表示：

度：

m =米 dm =分米=十分之一米

cm =厘米=百分之一米 mm =毫米=千分之一米

μm =微米=百万分之一米 nm =毫微米=十亿分之一米

量：

L =升 ml =毫升=千分之一升

μl =微升=百万分之一升

衡：

g =克 kg =公斤=一千克

mg =毫克=千分之一克 μg =微克=百万分之一克

9. 标准的实施与修改权属于辽宁省卫生局。

目 录

一 画

一扫光	1
乙酰甲萘醌片（止血片）	1

二 画

二母宁嗽丸	2
七制香附丸	2
九香止痛丸	3
九制大黄丸	3
九一提毒散	4
十香暖脐膏	4
十滴水	5
丁维葡萄糖	5
力维隆糖浆（浓缩）	6
人造补血药	6
人参健脾丸	7
人参养荣丸	8
人参女金丸	8
人参药酒	9
人参固本片	9
丁香六味散（高丽道·保如·吉日嘎）	10

三 画

三磷酸腺苷二钠	10
三碘软膏	12
三黄消炎片	12
小儿胺	13
小儿退热片	14
小儿解热止痛片	15
小儿复方新诺明片	15
小儿止咳糖浆	16
小儿化毒丸	17
小儿止嗽丸	17
小儿惊风丸	18
小儿宁嗽丸	18
小儿化食丸	19
小儿泻热丸（太极丸）	19

小儿琥珀丸	20
小活络糖衣丸	20
小儿疳积散	21
小儿定风散	21
小儿消疳散	21
小儿牛黄散	22
小儿止咳散	22
小儿清肺散	23
小儿疳药	23
小儿百效散	24
小儿牛黄清肺散	24
小儿安宫散	24
大黄清胃丸	25
山药丸	25
山豆根注射液	26
子鹿膏	27
上清片	27

四 画

水解肝 B ₁₂ 片（复方水解肝 B ₁₂ 片）	28
心舒平片	29
心舒平胶囊	29
心口痛药（胃痛散）	30
止痛灵	31
止痛灵片	32
止嗽青果丸	32
止咳丸	33
止痛风湿丸	33
止咳糖浆	34
止咳露	35
牛黄清胃丸	35
牛黄安心丸	36
牛黄清肺散	36
牛黄镇惊散	37
牛黄清脑片	37
五加皮酒	38
五海咳喘片	39

六合维生素糖丸	39
开郁舒肝丸	40
气管炎丸	41
木瓜丸	42
木香顺气丸（一方）	42
木香顺气丸（二方）	43
木瓜片	43
无味合霉素胶囊	44
牙痛水	44
化积丸	45
乌贝散	45
风寒膏药	46
风寒止痛膏（精制狗皮膏）	46
风寒膏	48
风湿药酒	49
风湿豨桐片	49
风湿关节炎片（一号）	50
风湿关节炎片（二号）	51
风湿关节炎酊	51
风湿丸（额力吉根·齐孙·古日苯·奈日拉嘎）	52
风湿止痛丸（纳如音·古日苯·奈日拉嘎）	52
双红抗喘片	53

五 画

四合素胶囊	53
四维葡萄糖	54
平热散（头痛粉）	54
平喘宁冲剂	55
甲氧苄氨嘧啶注射液	56
甘 露	57
甘草六味散（西赫日·额波苏·吉日嘎）	57
宁嗽太平丸	58
归红跌打丸	58
加味香连丸	59

六 画

肌 苛	59
肌苷注射液	60
优降宁（盐酸甲基丙炔苯胺）	61
优降宁片	62
优散痛片	62

多酶片	64
多种钙片	65
百日咳灵片	65
百喘朋片（咳喘片）	66
百花定喘丸	67
安痛定注射液	68
安痛定片	69
安钠咖片（苯甲酸钠咖啡因片）	70
安妥明丙二酯	71
安妥明铝盐	72
安神养心丸	73
安神定志丸	74
亚油酸乙酯	74
亚油酸胶丸	75
那可汀糖浆	75
羊胎片	76
羊肝丸	77
合霉素片（消旋氯霉素片）	77
红血宁片	78
红霉素眼膏	78
红曲液糖浆	79
红毛药酒	80
红药片	80
红花十三味丸（故日贡·阿日苯·吉日巴）	81
红花七味丸（故日贡·道老）	82
灰黄霉素药水	82
耳聋丸	83
回春丸	83
芎菊上清丸	84
老蔻丸	84
壮腰补肾丸	85
全鹿大补丸	85
关节止痛片	86

七 画

抗炎松	87
抗炎松片	88
抗菌止痢片	88
抗痢片	89
呋喃硫胺	90
呋喃硫胺注射液	91
呋喃硫胺片	92

呋喃苯胺酸片（速尿片）	92
芬那露	93
芬那露片	94
利血平注射液	95
利血生片	96
利肝生片	96
苄星青霉素G片	97
肝炎糖浆	98
肝B ₁₂ 注射液	98
肝B ₁₂ 片	100
肝乐片	101
肝宁片	101
肝浸膏片	102
肝铁胶囊	103
肝磷脂片	104
克霉唑	105
克霉唑片	106
克霉唑软膏	106
沃古林眼药水	107
麦精鱼肝油	108
补脑汁	108
补益活络丸	110
补虚固肾丸	110
鸡眼膏	111
驱虫丹	111
驱蛔糖	112
连翘败毒丸	113
连翘四味汤（杜格毛宁·都日苯汤）	113
灵芝草糖浆	114
辛荑散	115
沙参四味汤（骚日老·都日苯汤）	115
诃子五味丸（阿如拉·塔布）	116

八 画

肺复康片	116
板兰根注射液（201—2注射液）	117
奋乃静注射液	118
参茸安神丸	119
参茸丸	119
参茸补肾丸	120
参茸补丸	120
参茸多鞭酒	121
参茸虎骨药酒	122

参茸安神片	123
金匮肾气丸	124
豹骨木瓜丸	124
豹骨木瓜酒	125
河车参茸丸	125
明目羊肝丸	126
明目蒺藜丸	126
定中丸	127
定喘疗肺丸	127
定喘丸	128
青果丸	128
治伤跌打丸	129
青蛤散	129
坤灵丸	130
固肠丸	131
鱼鳔丸	131
制酸丸（庄西·吉日嘎）	132
松令片	132
治咳枇杷露冲服剂	133

九 画

胆维丁片	134
胆黄素片	134
胆黄素胶囊(附：猪胆膏的标准)	135
脉舒静片	136
冠心酮片	137
食母生片	138
胎盘片	139
胃可必舒	139
胃蛋白酶片	140
胃痛片	141
胃粘膜素	141
胃得宁胶囊	142
胃 散	143
胃溃疡散	143
胃康片	144
复肝生糖浆	144
复方黄连素片	144
复方正痛片	145
复方水杨酸钠注射液	146
复方对乙酰氨基酚片（复方扑热息痛片）	
	147
复方甘草片（止咳片）	148

复方肝平片	149
复方肝片	149
复方保泰松片	150
复方氨咖片	151
复方降压片	152
复方茶碱片	153
复方维生素U片	154
复方驱虫片	155
复方睾丸片	156
复方金刚烷胺片	156
复方强的松片	157
复方氨基比林散	158
复方亚油酸丸（益寿宁）	159
复方麻黄糖浆	160
复方五味子糖浆	161
复方咳必清糖浆	162
复方鱼肝油软膏	163
钙素母片	163
氯化可的松软膏	164
氟氢可的松软膏	165
氟灭酸	166
氟灭酸胶囊	167
胖得生	168
胖臌散	168
咳必清滴丸（枸橼酸维静宁滴丸）	169
咳 伏	169
浓补脑汁	170
香砂平胃丸	171
香苏正胃丸	171
香连散	172
除湿健胃丸（哈目·嘎布日·阿如巴）	172
追风丸	173
追风透骨丸	173
追风止痒丸	174
追风活血膏	175
保肺丸	175
保肺散	176
烂积丸	176
胡麻散	177
珍珠散	177
活胃散	178
活血止痛散	178
活血片	179

疮疖膏（金鸡膏）	179
草果四味汤（嘎高拉·都日苯汤）	180

十 画

消痛宁注射液	180
消咳宁片	181
消炎痛片	182
消炎眼药水	183
消疳肥儿丸	183
消瘿五海丸	184
消积白丸（查干·乌日勒）	184
酒石酸苯茚胺	185
酒石酸苯茚胺片	186
盐酸氯喘	187
盐酸氯喘片（喘通片）	188
盐酸乙基吗啡注射液〔麻〕	188
盐酸氟奋乃静注射液	189
盐酸苯海拉明注射液	190
盐酸麻黄碱滴鼻液	190
盐酸甲基麻黄碱	191
盐酸甲基麻黄碱片	192
盐酸甲烯土霉素	193
盐酸甲烯土霉素片	194
氨基青霉素	195
哮利平片	196
脑清片	197
烧烫宁软膏	197
氧化锌橡皮膏	198
健脑安神丸	198
健脑丸	199
柴胡舒肝丸	199
桔红化痰丸	200
桔核疝气丸	200
祛风解毒丸	201
调经养血丸	201
调经膏（坤灵膏）	202
调经和血膏（保元膏）	203
宽中老蔻丸	204
宽胸利膈丸	205
脐风散	205
桃花散	206
海马追风膏	206
益母膏	207

十一画

维丙胺	207
维丙胺注射液	208
维丁钙片	209
维生素A胶丸	209
维生素A糖丸	210
维生素A、D糖丸	210
维生素B ₁ 糖丸	210
维生素C糖丸	211
维生素B ₁ 、C糖丸	212
维生素D胶丸	212
维生素E胶丸	213
维生素B ₆ 软膏	213
麻杏止咳糖浆	214
麻杏止咳糖丸	215
麻杏止咳片	215
麻仁滋脾丸	216
脱氧核苷酸注射液	216
鹿茸精注射液	218
鹿胎丸	219
鹿茸膏	219
惊风抽搐丸	220
清凉润喉片	220
清凉油	221
清热化毒丸	221
清肝丸（泻青丸）	222
清胃和中丸	222
清热解毒丸	223
清宫丸	223
清热安宫丸	224
清瘟解表丸	224
清音丸	225
清脑安神丸	225
清肾诃子十味丸（补格仁奈·阿如拉·阿如卜）	226
清胃丸	226
清肺丸（阿古斯根·哈拉滚尼·阿日力嘎胡·乌日勒）	227
清肺散（一方）	228
清肺散（二方）	228
清肺止咳散	229
清热解毒片	229

清眩片	230
接骨七厘散	230
羚翘消毒丸	231
羚翘解毒丸	231
黄连上清丸	232
黄连清胃丸	232
黄连解毒丸	233
婴儿消食散	233
救惊散	234
银解片	234
绷带	235

十二画

强痛定	235
强筋松片	236
喘咳宁片	236
硝酸甘油酯片（硝酸甘油片）	237
氯灭酸（抗炎灵）	238
氯灭酸片（抗炎灵片）	239
氯霉素注射液	239
氯霉素耳滴丸	240
舒肝和血丸	241
舒肝理气丸	241
舒筋活络丸	242
舒筋丸	242
舒泰丸	243
舒肝健胃片	243
硫氧双二氯苯酚	244
硫氧双二氯苯酚片（别丁亚砜片）	245
硫酸软骨素注射液（康得灵注射液）	246
硫酸链霉素注射液	246
斑马眼药水	247
葡萄糖氯化钙注射液	248
溃疡散	248
蛲虫软膏	249
锌华油	250
犀角化毒丸	251
犀角紫草丸	251
跌打接骨丸	252
跌打损伤丸	252
跌打散	253
温中顺气丸	254
搜风顺气丸	254

滋肾丸	255
锁阳固金丸	255
疏风再造丸	256
筋骨丸	257
紫金散	257
遗尿散	258
琥珀止泻散	258
提毒散	259
裂口膏	259
痈疾片	259

十 三 画

新婴儿胶	260
新脚气膏	261
痰咳宁片	262
催乳片	263
催乳丸	263
碘糖丸	264
蜂乳胶囊	264
愈创木酚甘油醚片	265
感冒丸	266
感冒冲剂	266
解热清心丸	267
解毒消炎膏	268
腰痛丸	268
腰腿痛丸	269

十 四 画

槟榔七味丸（高由·道老）	270
鼻通	270
鼻通灵	271
槐角地榆丸	272
槟榔顺气丸	272
精制海马追风膏	273

十 五 画

镇痛安	274
镇惊丸	275

镇惊散	275
醋酸去炎松	276
醋酸去炎松软膏	277
醋酸磺胺米隆	278
醋酸泼尼松注射液	279
醋酸可的松滴眼液	280
醋酸氢化可的松滴眼液	281
醋酸强的松软膏	282
醋酸可的松软膏	283
樟脑酚液	283
樟脑软膏	284

十 六 画

磺胺甲基嘧啶钠注射液	284
磺胺软膏	285
磺胺米隆软膏	286
磺胺嘧啶软膏	286

十 七 画

磷脂麦芽糖	287
-------	-----

二 十 画

獾油	287
----	-----

附 录

注射剂	288
片 剂	290
丸 剂	292
散 剂	294
胶囊剂	295
糖浆剂	295
软膏剂	296
膏 剂	296
黑膏药	296
酒 剂	297
试 液	297
指示液	298

一 扫 光

【处 方】

松香[制]	15g	冰片	5g
彰丹	15g	枯矾	15g
黄柏	15g	轻粉	5g

【制 法】 以上六味，冰片过80目筛，轻粉研极细粉过120目筛。将黄柏粉碎过100目筛，再与松香等三味药掺匀，粉碎过120目筛。将上述药粉与冰片、轻粉配研，混匀。每袋重10g。

【性 状】 本品为粉红色粉末，味香。

【检 查】 应符合附录294页散剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 祛湿止痒，收敛生肌。用于皮肤湿痒，黄水疮，秃疮，薄皮疮。

【用法与用量】 外用。干敷患处或麻油调敷。

【贮 藏】 密闭，防潮。

乙酰甲萘醌片（止血片）

TABELLAE ACETOMENAPHTHONUM

本品含乙酰甲萘醌($C_{15}H_{14}O_4$)应为标示量的 90.0~110.0%。

【性 状】 本品为糖衣片。

【鉴 别】 取样品粉末少许（约相当于乙酰甲萘醌50mg），加乙醇5ml，煮沸，趁热过滤，再用5ml乙醇处理一次，合并乙醇，蒸干，残渣作下试验：

（1）取残渣约50mg，加N/10氢氧化钠液5ml，微热数分钟，冷却，加过氧化氢溶液数滴，用稀盐酸中和，滤过，用水洗沉淀，干燥，熔点约为106°。

（2）取残渣约0.5mg，加乙醇5ml溶解，加浓氨溶液2ml与氯乙酯数滴，显紫色，加20%氢氧化钠液5ml，显棕黄色。

（3）取试验（1）项下的滤液，应显醋酸盐的鉴别反应。

【检 查】 应符合附录290页片剂项下有关的各项规定。

【含量测定】 取本品110片，精密称定，研细，精密称出适量（约相当于乙酰甲萘醌0.2g），置脂肪抽提器中，用氯仿提取2小时，蒸去氯仿，加冰醋酸15ml与稀盐酸15ml，附回流冷凝器回流15分钟，冷却，避免氧化，加邻氨基二杂菲指示液0.1ml，用N/20硫酸铈液滴定，并将滴定结果用空白试验校正，即得（每1ml的N/20硫酸铈液相当于6.457mg的 $C_{15}H_{14}O_4$ ）。

【功能与主治】 维生素类药。用于阻塞性黄疸与其他缺乏维生素K所致的出血症。

【用法与用量】 口服，一次2~10片，一日3次。

【规 格】 2mg

【贮 藏】 置遮光容器内，密闭保存。

二母宁嗽丸

【处方】

知母	150g	贝母	150g
天门冬	150g	瓜蒌仁(炒)	150g
生地黄	150g	白果仁	100g
茯苓	100g	杏仁(炒)	100g
沙参	100g	百部(制)	50g
白芍	100g	清半夏	50g
甘草	50g	麦门冬	150g

【制法】以上十四味，混合均匀，粉碎过100目筛，使色泽一致，按药粉与蜜1:1的比例兑入嫩蜜，于90°合料制丸。每丸重10g。

【性状】本品为黑褐色圆形蜜丸，味甘微辛。

【检查】应符合附录292页丸剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】养阴润肺，止咳定喘。用于肺热咳嗽，痰中带血，气促胸满，口燥咽干。

【用法与用量】口服，一次1丸，一日2次，小儿酌减。

【注意】孕妇忌服。

【贮藏】密闭，防潮。

七制香附丸

【处方】

香附(七制)	700g	当归	200g
熟地黄	140g	生地黄	200g
白芍(炒)	200g	益母草	200g
川芎	150g	党参	100g
白朮(炒)	100g	茯苓	100g
枣仁(炒)	100g	阿胶	100g
陈皮	100g	山茱萸	100g
艾叶炭	100g	甘草(制)	45g
天门冬	125g	黄芩	100g
砂仁	100g	元胡(醋制)	100g

【制法】以上二十味，先将香附分做七份。一份用黄酒100g浸；一份用醋10g浸；一份用盐10g化水浸；一份用米泔水100g浸；一份用小茴香(盐炒)50g熬水浸；一份用益智仁(盐炒)100g熬水浸；一份用莱菔子(炒)100g熬水浸。浸的时间春秋三日，夏天一日，冬天七日，浸后炒干，再与当归熟地黄等十九味混合均匀，粉碎过100目筛，使其色泽一致，按药粉与蜜1:1.2的比例兑入中蜜，于90°合料制丸。每丸重10g。

【性 状】 本品为黑色圆形蜜丸，味苦。

【检 查】 应附合附录292页丸剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 行气解郁，调经止痛。用于月经不调，痛经，经行腹痛，带下，经漏。

【用法与用量】 口服，一次1丸，一日2次。

【注 意】 孕妇忌服。

【贮 藏】 密闭，防潮。

九 香 止 痛 丸

【处 方】

香附（制）	400g	元胡（醋制）	200g
五灵脂（醋制）	200g	乌药	200g
香橼	200g	厚朴（姜制）	200g
蒲黄	100g	乳香（制）	100g
檀香	100g	降香	100g
广木香	100g	零陵香	25g
香排草	25g	砂仁	25g
公丁香	25g	大黄（制）	200g
高良姜	15g		

【制 法】 以上十七味，混合粉碎过100目筛，使其色泽一致，按药粉与蜜1:1.5的比例兑入中蜜，于90°合料制丸。每丸重7g。

【性 状】 本品为黑褐色圆形蜜丸，味辛苦涩。

【检 查】 应符合附录292页丸剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 舒气解郁，散寒止痛。用于胃寒气滞，两胁胀满，胸腹作痛。

【用法与用量】 口服，一次1丸，一日2次。

【注 意】 孕妇忌服。

【贮 藏】 密闭，防潮。

九 制 大 黄 丸

【处 方】

大黄（九制）	500g	白芍	200g
当归	200g	生地黄	200g
川芎	200g	火麻仁	150g
郁李仁（炒）	150g	赤芍	150g

【制 法】 以上八味，先取大黄，另用当归、红花各100g煎汁浸透晒干，再用黄酒250g浸透蒸三次，将黄酒递减20g共蒸晒至九次，然后将大黄、白芍等八种药料，干燥粉碎过100目筛，使其色泽一致，按药粉与蜜1:1.3的比例兑入老蜜，于100°合料制丸。每丸重10g。

【性 状】 本品为黑褐色圆形蜜丸，味苦微辛。

【检 查】 应符合附录292页丸剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 消积滞，润燥通便。用于宿食停滞，大便燥结，习惯性便秘。

【用法与用量】 口服，一次1丸，一日3次，十岁至十五岁一次半丸，十岁以下酌减。
食前服。

【注 意】 孕妇忌服。

【贮 藏】 密闭，防潮。

九一提毒散

【处 方】

红粉	5g	石膏（煅）	45g
冰片	2.5g		

【制 法】 以上三味，除冰片外，共研极细粉，过140目筛，再与冰片配研，过120目筛，混匀。每袋重5g。

【性 状】 本品为粉红色粉末。

【检 查】 应符合附录294页散剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 化腐生肌。用于疮疖肿痛，流脓流水，疮面溃烂久不收口。

【用法与用量】 外用。撒于患处。

【贮 藏】 密闭，防潮。

十香暖脐膏

【处 方】

附子	150g	川楝子	150g
干姜	150g	吴茱萸	150g
小茴香	150g	韭菜子	150g
花椒	150g	大蒜	400g
肉桂	210g	丁香	50g
木香	60g	麝香	5g

【制 法】 以上十二味，将肉桂、丁香、木香共研细粉，过120目筛，与麝香套研，研细过筛，混匀。其余附子等八味酌予碎断，取植物油12kg同置锅中加热炸枯，去渣，滤净后炼至滴水成珠。另取彰丹4.5kg徐徐加入搅匀收膏。将膏浸泡于水中，以去其火毒。取膏加热熔化待温，加入麝香及肉桂等细粉，搅拌均匀，分摊于布上。每大张净重25g，中张净重15g，小张净重7g。

【性 状】 本品为黑褐色外用硬膏。

【检 查】 应符合附录296页黑膏药项下有关的各项规定。

【功能与主治】 散寒止痛。用于腹部寒痛，疝气痞块，大便溏泻，脐腹胀痛。

【用法与用量】 外用药。贴腹部。

【注意】 孕妇忌贴。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

十滴水(救急水)

【处方】

樟脑	25g
桉叶油	12.5ml
大黄	20g
辣椒	5g
桂皮	10g
姜	25g
小茴香	10g
乙醇(70%)	适量
全量	1000ml

【制法】 取大黄、辣椒、桂皮、姜、小茴香照酊剂通则项下浸渍法，浸渍3~5日，浸渍液溶解樟脑、桉叶油，再用乙醇稀释至需要量，滤过，即得。

【性状】 本品为棕黄色澄清溶液，有樟脑臭，味苦辣，在空气中易挥发。

【检查】 含乙醇量 应为60~70%。

比重 应为0.87~0.92。

醇浸出物 取本品2ml，置水浴上加热至干，于105°干燥2小时，冷却后称量，所含残渣应在1.4%以上。

【功能与主治】 中暑，头昏恶心，腹痛。

【用法与用量】 口服，一次2~5ml。

【规格】 5ml

【贮藏】 置阴凉处，密闭保存。

丁维葡萄糖

本品含葡萄糖($C_6H_{12}O_6 \cdot H_2O$) 应在98%以上。

【处方】

维生素D ₂ (骨化醇)	10000单位
葡萄糖	适量
全量	1000g

【制法】 取维生素D₂溶于少量乙醇中，加葡萄糖研和均匀即得。

【性状】 本品为白色结晶性粉末，味甜。

【鉴别】 取本品0.1g，加入温热的碱性酒石酸铜试液中，生成红棕色沉淀。

【含量测定】 葡萄糖 取本品，按中国药典1975年版葡萄糖注射液项下方法测定，即得。

【功能与主治】 营养滋补剂。适用于营养不良，孕妇，儿童发育期等。

【用法与用量】 口服，一次1～3汤匙，一日3～5次，加入饮料或温开水冲服。

【贮藏】 防潮，避光、避热保存。

力维隆糖浆（浓缩）

本品每100ml内含铁(Fe)应为0.77～0.95g。

【处方】

肝浸膏	相当于鲜肝	1000g
枸橼酸铁铵		40g
维生素B ₁		0.2g
维生素C		2g
乙醇		20ml
苯甲酸		5g
砂糖		500g
香精		适量
水		适量
全量		1000ml

【性状】 本品为深棕色糖浆液。

【检查】 本品在25°时比重为1.10～1.25。

【含量测定】 精密量取本品50ml，注入200ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀。精密取此稀释液10ml，加硫酸溶液(1→2)2ml，滴加1%高锰酸钾溶液至显淡红色5秒钟不退，加盐酸15ml，碘化钾2g，放置暗处15分钟，加水约至300ml，用N/20硫代硫酸钠液滴定，近终点时加淀粉指示液2ml，继续滴定至蓝色消失，即得(每1ml的N/20硫代硫酸钠液相当于5.585mg的Fe)。

【功能与主治】 本品用于贫血，营养不良，体力虚弱，食欲不振。

【用法与用量】 口服，一次10ml，一日3次。

【贮藏】 密闭，避光，凉处保存。

人 造 补 血 药

本品每100ml中含铁(Fe)应为0.39～0.47g。

【处方】

枸橼酸铁铵	20g
维生素B ₁	0.05g
蔗糖	750g
焦糖	100g
枸橼酸	6g
苯甲酸钠	1.5g
亚砷酸钾溶液	0.5ml

水	适量
全量	1000ml

【制 法】 将枸橼酸铁铵、枸橼酸及维生素B₁分别溶解，分次放入已溶好的糖浆内，随加随搅拌。另量取亚砷酸钾溶液加入糖浆内，然后将苯甲酸钠加入糖浆内，加适量水至规定容量，混匀，即得。

【性 状】 本品为暗棕色糖浆状溶液，具特臭，味甜。

【鉴 别】 (1) 取本品3ml，加水至15ml，加2N氢氧化钠液10ml，1%铁氰化钾液10ml，密塞，振摇后，再加异丁醇约5ml，略加振摇，静置后，异丁醇层应显蓝色萤光(维生素B₁)。

(2) 取本品5ml，加水5ml，加过量的氢氧化钠试液，煮沸，即发生氨气，可使湿润的PH试纸呈碱性。

(3) 取本品适量，加强热炭化，残渣加稀盐酸，加热使溶解，滤过，滤液显铁盐的鉴别反应。

【检 查】 混浊度 取本品5ml，加水至50ml，振摇混合后，应无混浊。

比 重 不低于1.3。

pH 值 应为3.0~4.0。

砷 盐 精密量取本品10ml，于50ml量瓶中，加水至刻度，摇匀。精密量取稀释液2ml，加水21ml，加盐酸5ml，依法检查(中国药典1975年版附录)，含砷量应为百万分之四至百万分之六。

【含量测定】 精密量取本品20ml，置碘量瓶中，加稀硫酸20ml，混匀后，放冷至15°，滴加N/10高锰酸钾液至显橙红色为止。再加盐酸15ml及碘化钾2g，静置3分钟后，加淀粉指示液1ml，用N/10硫代硫酸钠液滴定，即得(每1ml的N/10硫代硫酸钠液相当于5.585mg的Fe)。

【功能与主治】 治疗贫血药。可用于缺铁性贫血。

【用法与用量】 口服，一次1汤匙，温开水冲服。一日3次，服后忌饮茶2小时。

【贮 藏】 置干燥阴暗处保存。

人 参 健 脾 丸

【处 方】

人参	1000g	甘草	1000g
茯苓	1500g	山药(炒)	1500g
香附(制)	1500g	薏苡仁(炒)	1500g
麦芽(炒)	2000g	砂仁	1000g
白朮(炒)	1500g	陈皮	1500g
山楂(炒)	1500g	厚朴(姜制)	1500g
芡实(炒)	1500g	桔梗	2000g
青皮(炒)	1000g	莲子肉(炒)	1500g
枳壳(炒)	1500g	白扁豆(炒)	1500g
六曲(炒)	2000g	当归	1500g