

青 岛 概 况

。 内 部 印 发 。

青岛市史志编纂委员会办公室

一九八五年六月

青 岛 概 况

· 内部印发 ·

青岛市史志编纂委员会办公室

一九八五年六月

说 明

《青岛概况》是青岛市史志编纂委员会按照山东省地方史志编纂委员会关于编写出版山东各地概况的统一部署，组织青岛市史志编纂委员会办公室及平度、即墨、胶县、崂山、莱西、胶南各县县志办公室共同编写的。编写《青岛概况》的目的是：将在编志过程中搜集的部分材料，先行整理，内部印发，以期能够概括地反映青岛的市情、县情，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

《青岛概况》的编写坚持以马列主义、毛泽东思想为指导，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义，坚持实事求是，力求做到材料真实，观点正确。在编排上，分市、县成篇，市及各县概况均

按建置沿革、自然条件、经济状况、文化事业、重大事件、著名人物、名胜古迹等七个方面记述。为避免内容重复，市的概况除综合反映市及各县的全貌外，主要记述市区情况；凡宜由各县记述的内容，均分别写入各县概况。

在编写《青岛概况》的过程中，我们多次得到市、县各有关部门和中央、省驻青有关科研机关的大力支持，市、县统计局并就有关统计数字作了校核，工贸联营青岛包装印刷厂（原山东平度印刷厂）积极承担了印刷任务，在此一并表示感谢。

由于我们的水平有限，经验不足，内容一定会有疏漏与错误，恳请各级领导和广大读者批评指正。

青岛市史志编纂委员会办公室

一九八五年六月

目 录

地图（八幅）

青 岛 市	1
即 墨 县	53
崂 山 县	87
胶 县	119
胶 南 县	151
平 度 县	183
莱 西 县	215

青 岛 市

建 置 沿 革

位置 青岛市地处山东半岛西南部，位于东经 $119^{\circ}30'$ — $121^{\circ}00'$ ，北纬 $35^{\circ}35'$ — $37^{\circ}09'$ ，东南濒临黄海，东、北与烟台市相邻，西与潍坊市接壤。总面积10,654.1平方公里，其中：市内市南、市北、台东、四方、沧口五区92.4平方公里，黄岛区152平方公里，所属六县10,409.7平方公里。

沿革 青岛原系渔村，建置前已发展为口岸，属即墨县管辖。1891年（清光绪十七年）清政府为防外国侵扰，决定调登州镇总兵章高元率兵四营移驻胶澳，青岛遂又成为海防重镇，是为青岛建置的开始。1897年11月德帝国主义以巨野教案为借口，出兵侵占胶澳，翌年三月强迫清政府签定

《胶澳租界条约》，青岛由此沦为德国殖民地。1914年11月，日本帝国主义又趁列强忙于欧战，出兵青岛，取代德国成为青岛的殖民统治者。第一次世界大战结束后，中国人民为收回青岛进行了广泛的斗争，迫使日本在华盛顿会议上同中国签署了《解决山东悬案条约》，于1922年12月将青岛交还中国。青岛收回后，先属北洋政府，称胶澳商埠；1929年4月又归国民党政府，称青岛特别市，为直辖市。抗日战争爆发，日本帝国主义于1938年1月再次侵占青岛。抗日战争胜利后，国民党政府在美帝国主义军队的支持下，于1945年9月接收青岛，仍为直辖市。1949年6月2日青岛解放，饱经帝国主义和国内反动派轮番蹂躏、压迫的青岛市，从此回到了人民的怀抱。

区划 德国强占下的“胶澳租界地”，其区域从崂山湾东半岛东北角起，经崂山中部、白沙河沿胶州湾岸至灵山卫、薛家岛，包括从薛家岛往

西南至半岛，陆地面积共551.73平方公里（包括附近岛屿）。1931年和1935年国民党政府先后将即墨县的惜福镇、王戈庄等地和崂山地区划入青岛，市的区域有所扩大。1939年敌伪政府曾将即墨、胶县划归青岛。1945年国民党政府又恢复沦陷前的区域。在德占时期青岛划分为青岛区和李村区，此后区划变动频繁，到1946年国民党政府将全市划分为台东、台西、市南、市北四个市区和四沧、李村、薛家岛等八个乡区。青岛解放后，区划变动较大，1951年为六个市区和一个管理郊区工作的崂山办事处。后因调整市管县的范围，改变个别区的建制，市的区划作过五次调整，1983年调整为六县六区，即现今的市南区、市北区、台东区、四方区、沧口区、黄岛区和崂山县、即墨县、胶县、胶南县、平度县、莱西县。

人口 1984年末全市共有153.5万户，

623.9万人，比1949年增长53.8%，其中市内六区33.6万户，122.9万人。在市区人口中：男性62.7万人，占51%，女性60.2万人，占49%；农业人口9.0万人，占7.3%，非农业人口113.9万人，占92.7%。1984年市区人口出生率为15.3‰，死亡率为5.4‰，自然增长率为9.9‰。据1982年人口普查统计：市区人口18岁以下的32.7万人，19岁—60岁的74.8万人，61岁以上的9.9万人；大学文化程度的占18.7‰，大专肄业及在校学生占8.7‰，高中占158.3‰，初中占368.7‰，小学占244.1‰，不识字或很少识字的占136‰（不包括不满六岁儿童）。全市有归国华侨628户，908人；侨眷3361户，11,753人；港澳同胞眷属2964户，10,045人。

民族 据1982年人口普查统计，市区人口共有22个民族。其中汉族1,167,817人，占99.48%；少数民族6047人，外国人加入中国籍的6人。在21

个少数民族中,有蒙古族117人,回族1671人,藏族1人,维吾尔族7人,苗族7人,彝族2人,壮族55人,布依族3人,朝鲜族84人,满族4036人,侗族3人,瑶族6人,白族11人,土家族12人,畲族5人,高山族6人,纳西族3人,达斡尔族1人,毛难族1人,锡伯族15人,俄罗斯族1人。

自然条件

地形 本区地势,南、北两侧隆起,东高西低,中间低陷。即北为大泽山丘陵区,南是崂山、小珠山和铁槌山侵蚀剥蚀低山及丘陵区,中间为铺镇台地、胶莱凹陷平原、莱阳盆地等。其中山地约占15.51%,丘陵占25.08%,平原占37.76%,洼地占21.65%。海岸分为岬湾相间的山基岩岸、山地港湾泥质粉砂岸及基岩砂砾质海岸三种基本类型。浅海海底则有水下浅滩、现代水下三角洲及

海冲蚀平原等。

地质 本市所处大地构造位置为新华夏第二隆起带次级构造单元—胶南隆起区东北缘和胶莱凹陷区中南部。因长期隆起、剥蚀，故区内缺失整个古生界地层及部分中生界地层，仅见有元古界粉子山群、胶南群和五莲群变质地层，中生界上侏罗系莱阳组、白垩系青山组与王氏组等陆相沉积地层和火山岩层，以及新生界第四系沉积层。其中青山组火山岩层十分发育，在本市出露极为广泛。岩浆岩以元古代胶南期月季山式片麻状花岗岩及中生代燕山晚期的艾山式花岗闪长岩和崂山式花岗岩为主。市区全部座落于该类花岗岩之上。区内除发育有近东西的基底褶皱构造外，主要为新华夏系（北、北东向）、华夏式（北东向）及北西向断裂构造。其中以北东向压性、压扭性华夏式断裂构造为本区主要构造骨架。自第三纪以来，区内以整体性较稳定的断块隆起上升

为主，一般上升幅度不大。区内第四纪沉积地层，分为上更新统陆相层和全新统陆相及海相层。陆相地层分布于分水岭两侧和丘陵地带。海相地层主要分布于沿海5米高程线以下的滨海平原、潮滩和近岸浅海区。

山脉 全市大体有三个山系。东南是崂山脉，山势陡峻，主峰海拔1133米。从崂顶向北绵延到即墨县东北部，向西南绵延到青岛市区。北部为大泽山（海拔736.7米），平度境内诸山及莱西部分山峰均属之。南部为大珠山（海拔486.4米）、小珠山（海拔724.9米）、铁槌山（海拔595.1米）等组成胶南山群。

河流 全市流域面积在100平方公里以上较大河流共32条，其中流域面积在500平方公里以上的有5条：大沽河、北胶莱河、南胶莱河、小沽河、泽河。大沽河是全市最大河流，发源于招远县会仙山至胶县码头村入海，流域面积4631.3

平方公里，总长170.6公里。它是目前青岛市区汲取径流水和地下水的主要水源地。

海岸 港湾 岛屿 全市海岸线总长730.64公里。分布着丁字湾、鳌山湾、崂山湾、沙子口湾、汇泉湾、胶州湾、黄岛前湾、唐岛湾、灵山湾、琅琊湾等49处海湾（港湾）；有黄岛、唐岛、灵山岛、田横岛、竹岔岛、槟榔岛、莲岛、小青岛、大公岛、小公岛、徐福岛等大小岛屿52个，礁石54处。还有滩涂14处。据调查资料，本区（岸段）海水盐度2月一般为31.0—32.0‰；5月与2月大致相似，一般为31.4—32.0‰；8月因降水和径流增加，盐度普遍降至30.0—31.7‰；11月一般变化于31.6—32.2‰之间。

青岛属正规半日潮港，每个太阴日（24时48分）有两次高潮和两次低潮。高潮出现在月亮中天后4小时50分；低潮出现在月亮中天后11小时02分。潮差为1.9至3.5米，大（小）潮差发生于

朔或望（上弦或下弦）日后二至三天。胶州湾内港区比栈桥外海高，低潮潮时迟10分，而潮差大10厘米左右。青岛八月份的潮位比一月份的潮位一般皆高0.5米。台风过境或东南大风产生增水，寒潮过境或西北大风产生减水，个别日期影响潮位达1米以上。青岛验潮站1950—1956年观测的平均潮位命名为“黄海平均海水面”，其高度在青岛观象山国家水准原点下72.289米，我国从1957年起，大陆国土的地物高程以此为零点起算。

气候 青岛地处北温带季风区域，属温带季风气候。市区由于海洋环境的直接调节，受来自洋面上的东南季风及海流、水团的影响，故又具有显著的海洋性气候特点：空气湿润，雨量充沛，温度适中，四季分明。春季气温回升缓慢，较内陆迟来一个月；夏季湿热多雨，但无酷暑；秋季天高气爽，降水少、蒸发强；冬季风大温低，持续时间较长。据1898年以来85年气象历史

资料查考，市区平均气温 12.2°C ，极端最高气温 36.2°C （1939年7月31日），极端最低气温 -16.4°C （1931年1月10日），气温平均年较差为 26.4°C 。以八月份最热，平均气温 25.1°C ，一月份最冷，平均气温 -1.3°C 。日最高气温 $\geq 30^{\circ}\text{C}$ 的日数年平均为11.4天，日最低气温 $\leq -5^{\circ}\text{C}$ 的日数年平均为22天。降水量年平均为702.5毫米，四季雨量分配是春季占14%，夏季占57%，秋季占22%，冬季占7%。年降水量最多达1272.7毫米（1911年），最少仅308.3毫米（1981年），降水的年变率为62%。年平均降雪日数只有10天。气压平均为1008.6毫巴。年平均风速为5.3米/秒，以南东风为主导风向。年平均相对湿度为73%；七月份最高，为89%；十二月份最低，为68%。海雾多频，全年平均有浓雾51.3天，轻雾108.2天，主要雾季在3—7月。青岛的灾害性天气是寒潮、暴雨、大风、干旱，但机遇较少。

土壤 全市土壤分为6个土类，13个亚类，24个土属。六个土类中，在以花岗岩和片麻岩风化物为主的成土母质上发育形成的棕壤占的比重最大，占可利用面积的58.5%，广泛分布于山地丘陵区，多数已辟为农田。由于棕壤所处的地形部位较高，水土流失较严重，土壤肥力不高。其次是砂姜黑土，具有“黑土层”和“砂姜层”的显著特征，占可利用面积的22%，主要分布在莱西、即墨盆地和胶莱河谷，目前大部分砂姜黑土的农业生产水平较低，尚有很大的开发潜力。再次是潮土，占可利用面积的16.7%，广泛分布于大小河流两侧的冲积平原或河流上游山丘间的盆状谷地，肥力较高。另外，胶南县北部和平度县一些石灰岩出露的残丘坡地上分布着小面积的褐土，只占可利用面积的0.98%。莱西、胶县低洼平地有小面积的幼年水稻土分布。自即墨金口至胶南白马河口的滨海一带还分布着亟待开发的滨海

盐土。

资源 全市共有耕地781.9万亩，林地158.7万亩，荒山荒地108.32万亩，沿海滩涂56.3万亩，浅海水面86.7万亩。

青岛地区矿藏较少，主要有石墨、萤石、沸石、膨润土、珍珠岩、大理岩、花岗岩、重晶石、蛇纹岩、锆英砂等非金属矿。另有少数有开采价值的金属矿。其中：石墨，平度、莱西两县分布广、储量较大。膨润土，莱西、胶县两县均有分布、储量较大。沸石和珍珠岩，莱西、胶县、崂山三县均有分布，莱西县储量较大。大理岩，平度县储量较大，品种较多，莱西、胶南两县也有分布。花岗岩，崂山县储量较大，质地优良，莱西等县也有分布。金属矿，平度县金矿脉分布较广。

青岛海区港湾众多，岸线曲折，滩涂广阔，水质肥沃，饵料基础雄厚，理化环境条件适宜，是多种水生物繁衍生息的场所，具有较高的经济