

全国中草药新医疗法展览会 技术资料选编

(外科疾病)

江苏省镇江市革命委员会生产指挥组科技组翻印

一九七一年十月

毛 主 席 语 录

领导我们事业的核心力量是中国共产党。
指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

备战、备荒、为人民。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

团结新老中西各部分医药卫生工作人员，组成巩固的统一战线，为开展伟大的人民卫生工作而奋斗。

前 言

在无产阶级文化大革命伟大胜利的推动下，在党的“九大”精神鼓舞下，我国医药卫生战线形势一派大好。广大医药卫生人员高举毛澤东思想伟大紅旗，狠批叛徒、内奸、工贼刘少奇的反革命修正主义卫生路线，坚决落实毛主席“备战、备荒、为人民”的伟大战略方针和“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的光辉指示，涌现出许多认真学习毛泽东思想的先进集体和先进事迹，各项工作取得了很大的成绩。

毛泽东思想的光辉照亮了我国医疗卫生事业发展的道路。当前，我国广大城乡，以除害灭病为中心的爱国卫生运动，波澜壮阔，滚滚向前；深受贫下中农欢迎的合作医疗制度不断巩固和发展；数以百万计的“赤脚医生”队伍在毛泽东思想哺育下茁壮成长。遵照毛主席关于“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”的伟大教导，在各级革委会的领导下，在解放军的带动下，广泛开展了用中草药、新医疗法防治常见病、多发病的群众运动。在群众运动中，广大医药卫生人员运用毛主席的哲学思想指导医疗实践，发掘、继承祖国医学遗产，走中西医结合的道路，创造了世界医学史上旷古未有的奇迹。这是无产阶级文化大革命的丰硕成果，是毛泽东思想的伟大胜利！

在这一伟大胜利的凯歌声中，“全国中草药新医疗法展览会”于一九七〇年十二月在北京举行。

为了满足广大群众的需要，我们将全国各地报送展览会的有关技术资料选编成册（按内容分成若干分册，在展览期

间陆续发行，最后汇成总集），以便于广大工农兵群众、“赤脚医生”和革命医务人员交流经验，进一步在三大革命运动中总结提高，为创造中国的新医学、新药学而奋斗！

由于我们认真学习毛泽东思想不够，选编工作中定有不少错误和缺点，希望同志们批评指正。

全国中草药新医疗法展览会

一九七〇年十二月

编 辑 说 明

一、本《选编》广泛地选载了全国送展材料中的技术资料。为了便于交流，我们注明了材料来源（有的省、市没有报具体单位，只能注以省、市名）。

二、为了便于推广，防止同名异物、同物异名而用错药，我们根据送展标本进行了植物鉴定，并在相应的材料末尾注以学名（未送标本者，暂缺，一般常用中药不加注）。

三、东北三省所报材料中的中草药剂量用的是十两制，我们是照原样收载的，请使用时注意。

目 录

消毒	(1)
麻醉	(2)
止痛	(4)
烧伤	(12)
冻伤	(29)
感染	(31)
破伤风	(41)
急性乳腺炎	(46)
淋巴结结核	(49)
胆道感染	(54)
胆石症	(55)
急性阑尾炎	(56)
肛门直肠脱垂	(58)
泌尿系结石	(59)
血栓闭塞性脉管炎	(64)
断指再植	(67)
骨折	(70)
骨髓炎	(87)
骨、关节结核	(93)
腰椎间盘突出症	(95)
跌打损伤	(96)

消 毒

用途：泡手消毒。

方药：鲜大叶桉树叶。

制法：取上药 1 公斤，洗净切碎，加水 11 升，煮沸，浓缩至 9 升，成棕色溶液。

用法：按一般手术洗手常规，用肥皂水擦手三次，抹干后浸泡于上液中，5 分钟即可。更换时间，一般在冬季手术少的情况下，每周更换一次，4 月份后手术较多情况下，每 3 天更换一次。

效果：使用于外科手术泡手 217 例（包括无菌、半无菌和有菌手术），除 1 例无菌手术感染、5 例半无菌手术感染外，均未发现无菌手术感染现象。又使用于妇产科及五官科手术 73 例，均未发现感染现象。4 月份天气转暖后，曾将用上液消毒后之手在血平板上划痕培养，发现有葡萄球菌生长，乃在上述 10 升消毒液中加苯甲酸 20 克，每次培养观察 1 周，共培养 3 次，未发现任何细菌生长。

材料来源：广东省惠阳专区。

注：大叶桉为桃金娘科植物 *Eucalyptus robusta* Sm.

用途：皮肤消毒。

方药：20% 大叶桉叶溶液。

制法：用大叶桉叶 1 公斤，水 6 升，放在器皿里煮沸半

小时,約剩 5 升溶液即成(如有小叶桉則用 $\frac{1}{4}$ 的小叶桉叶, $\frac{3}{4}$ 的大叶桉叶同煮,效果更好)。

用法:用于針灸及皮下、肌肉和靜脈注射前皮肤消毒。

效果:共用3000余例次,均未发生过化脓感染,故可代替酒精和新洁而灭。

材料来源:广东省广州市第八人民医院。

注:該院还用 1 克精制的桉叶结晶体,冲水 400 毫升,作皮肤消毒用。

麻 醉

用途:局部麻醉。

方药及用法:25%九里香注射液,0.5%两面針注射液。单独或混合使用作局部浸潤,也可作粘膜表面麻醉用。

效果:用于阑尾切除、胃次全切除、甲状腺次全切除、脑脓肿开顱引流等手术173例,年龄最小9个月,最大72岁,均取得良好效果,一般小手术不需用麻醉前用药,較大手术前使用苯巴比妥钠100毫克或杜冷丁100毫克,肌肉注射。0.5%两面針注射液用于鼻息肉、鼻甲手术表面麻醉,效果亦滿意。其优点是麻醉效率高,鎮痛時間长,无不良反应。缺点是:(1)腹部手术腹肌較紧张,故对深部手术較為困难;(2)前者开始作用時間 10~20 分钟(比普魯卡因长),后者开始作用時間短(3~6 分钟),两种混合使用,可使开始作用時間縮短。

材料来源:广东省梅县专区人民医院。

用途：表面麻醉。

方药及制法：取鲜九里香一斤，洗净，捣烂，加三花酒（或50%酒精）1升，浸泡24小时，取滤液备用。

用法：直接涂于咽喉部粘膜表面。

效果：用于扁桃体挤切术110例，效果良好。涂后数分钟出现麻醉作用，药效持续10分钟左右。

材料来源：广西壮族自治区人民医院。

注：九里香为芸香科植物小叶九里香 *Murraya paniculata* (L.) Jack. var. *exotica* (L.) Huang

用途：表面麻醉。

方药：生草乌、生南星、生半夏、土细辛各10克，蟾蜍、花椒各4克。

制法：取上药共研细末，浸于70%酒精100毫升内2天即成。

用法：用时在少量浸液内加适量樟脑及薄荷脑，用小棉球蘸浸液贴于手术部位。

效果：拔牙69例，脓肿切开12例，囊肿切除2例，均在无痛下完成手术，无副作用。

材料来源：江西省。

用途：表面麻醉。

方药：花椒30克，蟾酥0.0167克，75%酒精100毫升。

制法：选择大而成熟的花椒（干品），压碎，置于酒精中浸泡96小时（经常振摇），取上清液加已研细的蟾酥，再浸24小时，取棕红色上清液密封备用。（行浅部皮肤手术者另加薄荷脑0.1克）。

用法：用棉球蘸药液涂于手术部位（或塞入鼻腔手术处），5分钟后刺激无痛觉即可手术。

效果：进行鼻息肉摘除术4例，扁桃体挤切术2例，效果良好。

材料来源：河北省武清县医院。

止 痛

用途：止痛。

方药：雪上一支蒿。

制法：将雪上一支蒿块根洗净，晒干，取100克研成粉，浸于0.5当量盐酸溶液500毫升中3天，过滤。滤渣中再加0.5当量盐酸溶液250毫升，浸泡2天，过滤。两次滤液合并，用5%氢氧化钠中和至pH6左右，加注射用氯化钠6.7克，搅拌溶解，加注射用水至4000毫升，煮沸30分钟，放冷后过滤至澄明，分装封口，用15磅高压30分钟消毒，即可供肌肉注射。每支1毫升，相当于生药25毫克。

用法：成人每次肌注10~25毫克（儿童3~5毫克），每日一至二次，日总量不超过50毫克（儿童不超过10毫克）。也可口服，成人口服安全量为150毫克以内。

效果：共用过12111人次，镇痛效果明显。昆明医学院用注射剂治疗创伤、术后疼痛及晚期肿瘤疼痛72人次，59例有效。其中创伤及术后疼痛者36例，全部在用药后15~20分钟显效，药效持续12~36小时，不必用其他止痛剂。

材料来源：云南省东川矿务局医院等。

注：1.雪上一支蒿为毛茛科植物 *Aconitum bullatifolium* Levl. var. *homofrichum* W. T. Wang 或 *Aconitum brachypodium* Diels 以块根入药。

2.本药有毒，必须严格控制用量。中毒轻者嗜睡，口腔灼热感，分泌物增多；重者全身发胀发麻，恶心，呕吐，流涎，头昏，有便意。重者瞳孔散大，血压下降，呼吸困难，或有抽搐，可因循环、呼吸衰竭死亡。抢救办法：
(1)竹筍、竹根、竹子、竹叶、芫荽、防风、茶叶、甘草，任选2~3种各五钱，水煎服；(2)猪油、红糖、蜂蜜，任选一种煮稀饭吃；(3)用阿托品皮下或静脉注射。

用途：止痛。

方药及用法：鴨脚蓮(全株)。煎剂：干品一至三钱水煎服；片剂：每片0.3克(相当于生药0.3钱)，每次服三至四片；注射剂：每安瓿2毫升(相当于生药1.5克)。

效果：用于手术后止痛等209例，181例有效，一般用药后20~30分钟见效，每日口服三次可维持24小时，肌肉注射2毫升可维持3~4小时。对晚期癌肿引起的疼痛效果更好。

病例：黎××，男，39岁。肠系膜及盆腔晚期癌肿引起疼痛，必须注射冬眠药物及吗啡才能止痛。用鴨脚蓮注射剂一支即可止痛。

材料来源：广东省广州市第一人民医院等。

注：鴨脚蓮为木通科植物尾叶假荔枝 *Stauntonia hexaphylla* Decne var. *urophylla* H.-M. 当地又名土牛藤。

用途：止痛。

方药及用法：小白撑块根。洗净晒干备用。成人每日一至二次，每次100毫克，用酒或温开水送服。

禁忌：5岁以下儿童禁服。

效果：对骨折、腰肌劳损、扭挫伤、风湿性关节炎等十余种疾病进行止痛观察，在188例中有效者176例，12例无效。

材料来源：云南省昆明医学院第二附属医院。

注：小白撑为毛茛科植物美乌头 *Aconitum pulchellum* H.-M. 或具泡乌头的块根。含乌头碱，有毒。要严格控制剂量。如中毒可用竹叶或竹皮、竹根煎水服，服糖水也可解毒。

用途：止痛。

方药及用法：山藤藤秧（根、藤）。煎剂：制成10%煎剂，每次口服10~20毫升；注射剂：制成15%注射液，每次肌注2毫升。

效果：用于外伤痛、胃肠道疼痛、神经性头痛、术后疼痛等共169例，显著止痛者占87%。

材料来源：河北省迁西县。

注：山藤藤秧为葡萄科植物山葡萄 *Vitis amurensis* Rupr.

用途：止痛。

方药及用法：黄荆子。煎熬多次，浓缩后，用酒精提纯，制成100%浓度注射液，每支2毫升含生药2克。成人每次肌肉注射2毫升。

效果：共治手术后疼痛、急慢性胃炎、胆囊炎、胆道蛔虫病等126例，其中对胃肠疼痛及手术后疼痛较好，对癌肿

引起的疼痛效果較差。

材料来源：四川省成都市第一人民医院。

用途：止痛。

方药及用法：那藤一两。加水浸没药面，煎成30毫升，疼痛时服。必要时一天服三次。

效果：对113例病人进行止痛效果观察，其中手术后疼痛35例，非手术疼痛78例，一般服药后15分钟止痛，药效持续4小时以上。未发现副作用。

材料来源：广西梧州专区人民卫生服务站，贺县皮肤病医院。

注：那藤为木通科植物 *Stauntonia hexaphylla* Decne 又名七姐妹藤。

用途：止痛。

方药及用法：暗板虫（鼠妇虫，潮虫）。口服液，将暗板虫洗净，按1:15~1:20加水煎至含量为10%，用三层纱布过滤，加适量防腐剂即成，每次口服5~10毫升。胶囊：将虫洗净，用温水将虫杀死，置方盘中，在60°C干燥箱中烘6~8小时，研细过筛，加入淀粉和糖使成10%散剂，分装胶囊，每粒含暗板虫0.1克，每次服2~4粒。也可制成脱蛋白的注射剂。

效果：用于各种手术后病人100余例，有明显止痛镇静作用。

材料来源：青海省第二人民医院。

用途：止痛。

方药及用法：王瓜根。洗淨，晒干，切成薄片。成人每次一至二分，嚼烂吞服，每日用药次数，根据病情酌定。儿童减量。

效果：治疗外伤痛、手术后疼痛、胃肠道疼痛等65例，48例治愈，11例減輕。一般用药后5~30分钟见效，药效持續半小时至72小时。

材料来源：福建省龙岩县医院。

注：王瓜根为葫芦科植物王瓜 *Trichosanthes cucumeroides* Maxim. 的根。

用途：止痛。

方药及用法：金腰莲块根。洗淨，切片，晒干，碾成細粉。痛时服0.3~0.5克。

效果：共治外伤痛、牙痛、喉痛、腹痛等60余例，一般服药后2~5分钟止痛，药效持續40分钟至6小时。

材料来源：四川省峨眉县医院，五通县医院。

注：金腰莲为葫芦科植物雪胆 *Hemsleya amabilis* Diels 又名金莲盆、金龟莲。

主治：止痛。

方药及用法：积雪草（全草）。晒干研細，成人每日一至一钱半，三次分服。

疗效：共治疗胸、背及腰部外伤性疼痛42例，27例止痛，14例好轉，1例无效。

材料来源：福建省厦門市向阳人民医院。

注：积雪草为伞形科植物 *Centella asiatica* (L.) Urb.

用途：止痛。

方药及用法：青骨藤根。晒干研细，压片，每片0.5克。成人每次服2~4片。

效果：对产后宫缩痛、手术后痛等32例进行止痛观察，一般服后15~30分钟显效，药效持续5~20多小时。

材料来源：云南省。

注：青骨藤为石竹科植物稍粘女娄菜 *Melandryum viscidulum* (Bur. et Fr.) Williams

用途：止痛。

方药及用法：止痛草。按伤处大小取鲜全草三至五两捣烂，外敷患处。

效果：共治20例，其中有较大骨折3例，敷药后止痛效果显著。一般敷药一次，止痛作用可达28小时。

病例：陈××，男，25岁。X线透视诊断为下肢胫腓骨横断、开放性骨折。夹板固定后，疼痛剧烈，用西药止痛无效，改用上药二两捣敷患处，10分钟后痛减，随后逐渐消失。

材料来源：湖北省广济县。

注：止痛草为报春花科植物泽珍珠菜(星宿菜) *Lysimachia candida* Lindl.

用途：止痛。

方药及用法：大救架皮，每次0.1~0.3克，水煎服。也可制成散剂或片剂。

效果：对15例外伤痛、头痛、牙痛、腹痛、肝区痛等病人进行止痛效果观察，一般用药后3~5分钟止痛，药效持

续6~8小时。

材料来源：山西省永济县。

注：大救架原单位未送检标本，只附送一份不清楚的照片，从照片看来，很像瑞香科植物黄芫花 *Wikstroemia chamaedaphne* Meisn. 志此以供参考。

用途：止痛。

方药及制法：取两面针根、七叶莲叶切碎，置有盖容器内，加70%酒精适量浸渍12小时，装入渗漉筒，以每分钟5毫升速度渗漉至滤液呈无色，取滤液减压浓缩，回收酒精，静置过滤，加注射用水稀释至全量，滤液分装灭菌（煮沸半小时）即得。

用法：肌注，每次2毫升（每毫升相当于生药两面针0.5克、七叶莲1克）。

效果：对205例病人进行止痛效果观察，有效率达95%，一般用药后3~10分钟止痛，药效持续4~8小时，对胆道蛔虫病、肠蛔虫病、溃疡病等尤佳。

材料来源：福建省福州市第二医院。

注：两面针为芸香科植物 *Zanthoxylum nitidum* (Lam.) DC. 以根入药，又名入地金牛。

用途：止痛。

方药：七叶莲。

用法：制成注射剂，每支2毫升（相当于七叶莲干叶3克）。

效果：临床应用12例，注射后5~15分钟见效，持续止痛效果4~10小时。

病例：刘×，61岁。右股骨頸骨折痛极而晕倒，注射本品2毫升，10分钟疼痛緩解，30分钟消失。

材料来源：广东省博罗县长宁公社新村大队医疗站。

注：七叶蓮为木通科植物尾叶假荔枝 *Stauntonia hexaphylla* Decne var. *urophylla* Hand.-Mazz.

用途：止痛。

方药及用法：天茄子。秋后果熟时摘下晒干，压破取种子，同时挖根，洗净切片，晒干研細粉。痛时服根粉1克，儿童酌减。种子置烧红之瓦片上，用竹管吸烟熏之。

效果：胃痛等服药粉，种子烟治牙痛。共治235例，一般用药后3~5分钟止痛，药效持續2~4小时。

材料来源：四川省峨眉县医院，中国人民解放军40医院。

注：天茄子为茄科植物刺天茄 *Solanum surattense* Burm.f.

用途：止痛。

方药及用法：通城虎。晒干，研成細粉备用。成人每日一至三次，每次服一至五分，小几减半。也可取适量撒于患处。

效果：共治各种疼痛病人185例，179例痊愈，6例好转。

材料来源：广西玉林县防治院。

注：通城虎为马兜鈴科植物 *Aristolochia* aff. *henryi* C.Y. Wu

用途：止痛。

方药：披麻草、一支蒿、洋金花各20克，麝香2克，制

草烏、独定子（金鉄鎖）、广血竭、三七各100克，重楼150克，心不甘（万年青）、制川烏各50克，元胡索250克。

用法：上药共研細末，成人每日二次，每次服0.5克。

效果：治疗外伤性疼痛、风湿性关节痛、腹痛等138例，36例止痛，102例好轉。

材料来源：云南省昆明市第二人民医院。

注：披麻草为百合科植物蒙自藜芦*Veratrum mengtze-anum* Loesn.f.或大理藜芦*Veratrum taliensis* Loesn.f.

烧 伤

主治：烧伤。

方药及用法：（1）虎杖根研細末，食油調涂，用于輕症患者；（2）虎杖根浓汁調涂創面，用于重症患者。

疗效：共治1000余例，效果良好。

病例：羊××，男，37岁。燙伤面积80%，有水泡。经上药調涂5天见好，10天后长出肉芽。

材料来源：浙江省金华地区（綜合材料）。

注：虎杖为蓼科植物*Polygonum cuspidatum* Sieb.et Zucc.

主治：烧伤。

方药及制法：虎杖粉（虎杖根洗淨晒干，研細）800克，茶液（陈茶叶100克，加水3000毫升，燉后取液）2800毫升，調成糊剂，隔水燉半小时备用（也可用茶油調敷）。为防治