

动物奥秘探索

DONGWU AOMI TANSUO

(二十八)

DONGWUAOMITANSUO

吉林音像出版社
吉林文史出版社

动物奥秘探索

(28)



吉林音像出版社


吉林文史出版社



目
录

南美秃鹫	/ 1
加那利黑蛎鹬	/ 1
关岛阔嘴鸟	/ 2
红金翅	/ 3
红脸杜鹃	/ 4
鸚鵡	/ 5
阿留申鵝	/ 8
阿劳特拉鸚鵡	/ 9
阿姆斯特丹信天翁	/ 11
白鹭	/ 13
马里亚纳绿头鸭	/ 14
美洲鸳鸯	/ 15
塞舌尔斑鸠	/ 16
蒙特祖马鹌鹑	/ 17
毛里求斯鹌	/ 18
夏威夷水鸡	/ 19
乌卢古鲁丛伯劳	/ 20
鸛	/ 21
秃头雕	/ 22
拉索云雀	/ 24
科隆群岛鹰	/ 25
褐鹌鹑	/ 27
寡妇鸥	/ 29
古巴钩嘴鸢	/ 32





贡	/ 34
粉红燕鸥	/ 34
非洲塞舌尔鸢	/ 36
非洲吉布提鹈鹕	/ 38
刀嘴凤冠雉	/ 39
达尔文美洲鸵	/ 40
查塔姆岛歌鸲	/ 41
捕蚱鸟	/ 42
查塔姆岛歌鸲	/ 43
白颈乌鸦	/ 44
斑尾雉鸡	/ 45
北美红眼雀	/ 46
喜欢吃水果的蕉鹃	/ 47
雨燕形态特征及营巢习性观察	/ 47
塞舌尔猫头鹰	/ 51
卷羽鹈鹕	/ 53
大草原的保护神——大鸨	/ 54
海南鹇	/ 56
科隆群岛鹰	/ 57
苍鹰	/ 59
青藏高原的“神鹰”	/ 61
世界上最大的鹰——菲律宾鹰	/ 65
鹭鹤	/ 66






目 录

中白鹭	/ 66
黑脸琵鹭—面临厄运的珍禽 ...	/ 68
具有黑白两色个体的涉禽—岩鹭 ...	/ 72
白琵鹭—长着铲子一样大嘴的珍禽	/ 75
黄嘴白鹭—一身雪白无暇的涉禽 ...	/ 79
天之骄子—大天鹅	/ 82
小天鹅—大天鹅的近亲	/ 86
双角犀鸟	/ 91
罕见的犀鸟——白喉犀鸟和棕颈犀鸟	/ 92
美丽的“爱情鸟”——冠斑犀鸟	/ 95
可爱的遗鸥	/ 98
游隼	/ 99
燕隼	/ 100
嘴上具有 2 个齿突的猛禽—褐冠鵟隼和黑冠鵟隼	/ 101
白腹隼雕和棕腹隼雕	/ 105
大红鹳	/ 108
黑鹳—栖居于深山中的涉禽	/ 112





东方白鹳—体态优美的大型涉禽 …	/118
白头鹮鹳—羽色美丽的大型涉禽 …	/122
栖居于深山中的涉禽—黑鹳 ……	/125
蓑羽鹤 ……	/130
黑尾蜡嘴雀 ……	/132
八哥 ……	/134
褐胸山鹧鸪 ……	/136
赤颈鸫 ……	/137
白额山鹧鸪 ……	/139
红喉山鹧鸪 ……	/141
海南鵲 ……	/142
燕雀 ……	/144
红额金翅雀 ……	/146
黑颈鹤 ……	/148
红嘴蓝鹊 ……	/151
丹顶鹤 ……	/153





南美秃鹫

秃鹫栖息于美洲新大陆，有加利福尼亚秃鹫和南美秃鹫（又叫安第斯秃鹫）两种。秃鹫是世界上最大的飞鸟之一，体长约 130 厘米，体重达 10 千克。这两种秃鹫都属于濒危动物。

南美秃鹫翼展长度比加利福尼亚秃鹫稍长，可超过 3 米。羽毛呈黑颜色，头颈有一圈白颜色，头略带桃红色。雄秃鹫头上有一块很大的肉冠。南美秃鹫分布在南美洲的太平洋沿岸到安第斯山脉区域，主要是辽阔的平原地区。动物的尸体是它们的主要食物，包括各种鱼类。它们每隔一年到 3000 米高的高山上去繁殖一次，每次生下两个白颜色的大蛋，有 10 厘米那么长。



加那利黑蛎鹬

(Haematopus meadewaldoi)




蛎鹬是一类涉禽，属蛎鹬科，蛎鹬属。它们的特点是都有桔红色的又长又扁的喙。产于全球的温带和热带地区。蛎鹬身体矮壮结实，约长40—50厘米。粗壮的腿略带桃色，翅膀长而尖。羽毛有黑白变色的色彩。

蛎鹬主要食软体动物，如牡蛎、蛤、蚌类。它们在海水退潮的时候袭击那些露出水面张开着贝壳的软体动物。蛎鹬窝筑在地面上，通常在沙地上产下2—4个蛋。

全球大约有7种蛎鹬。欧洲蛎鹬分布于欧洲、亚洲和非洲。上体呈黑色，腹部呈白色。美洲蛎鹬产于西半球的海岸地区。上体黑色，腹部白色，头和颈也是黑色。北美洲西部的黑蛎鹬以及澳大利亚的乌黑蛎鹬除了腿略带桃黄色以外，全身都是黑色。

大西洋加那利群岛的黑蛎鹬属濒危动物。



(Myiagrafreycineti)

阔嘴鸟属雀形目，阔嘴鸟科，是旧大陆的一




类热带鸟，大约有 14 种。阔嘴鸟实行一夫妻制。

阔嘴鸟样子矮矮胖胖。体长约 12—28 厘米，喙短而宽，根部有毛。栖息在森林或沼泽地区，花园中也常见了它们的身影。所有的阔嘴鸟都声音嘹亮。它们的窝形状像梨，通常悬持在水面的树上，出口开在旁边。

多种阔嘴鸟栖息在马来群岛，也有一些分布在南亚次大陆和菲律宾群岛。非洲大约也有两种。亚洲的阔嘴鸟主要呈绿色或蓝色。非洲阔嘴鸟呈褐色或灰色。上面有红色或者黑色的色彩。栖息在喜马拉雅山脉到婆罗州的阔嘴鸟是比较典型的一种，喜欢群居而且吵闹。体长约 25 厘米，长尾巴，食昆虫。羽毛呈绿色，头呈黑色和黄色，到尾部逐渐变蓝。

产于马来群一种体型较小的绿阔嘴鸟比较安静，体长只有 15 厘米。

关岛阔嘴鸟属濒危动物。




(*Cardueliscucullata*)



红金翅是南美洲北部地区产的一种雀，属雀形目，雀科。羽毛呈猩红色，黑色的头、翼和尾巴。是金丝雀的野生祖先。金丝雀是人们很喜爱的一种普通笼鸟，与红金翅同雀科。不少人把体毛呈红色的金丝雀也称为红金翅，其实红金翅非常贵。数量已经非常稀少，有些动物学家认为它已经绝种。比较认可的看法是它已处于濒危状态。

金丝雀羽毛呈红色的一种是由红金翅杂交而得的。由于这个原因。人们滥捕野生的红金翅，导致它数量日益减少，面临绝种的危险。



(*Phaenicophaeus pyrrhocephalus*)

杜鹃属鹃形目，杜鹃科，全球大约有 60 多种。

杜鹃广泛地分布于全世界，特别是旧大陆的温带和热带地区。常栖息在森林和灌木丛中，颇为害羞。往往是只闻其声，不见其形。我们常根据它们的叫声来给它们命名。

普通杜鹃身长约 16 厘米，羽毛大部分或部分




呈明亮的鲜绿色。大型的地栖杜鹃身长可达 90 厘米。多数地栖杜鹃呈土灰色或褐色，也有些身上有红色或白色的斑纹。有些热带杜鹃的背上翅膀上有像彩虹一样的蓝色。多种杜鹃的翅短。尾巴较长，有的特别长。尾巴羽毛的尖端还点缀着白色。地栖杜鹃的腿比树栖杜鹃长。脚掌前后有双趾。喙粗壮结实，有点向下弯曲。

多种杜鹃最惹人注目的特性是把蛋下在别的鸟类的窝里，靠其他鸟来帮它孵化。这种“寄生”的方法对提高小杜鹃的生存能力倒也很有好处。

那些自己养育子女的杜鹃则用树枝把窝筑在低矮的灌木丛中，蛋由父母轮流孵化。小杜鹃孵出来以后父母双方共同喂养。

红脸杜鹃属濒危动物。



(*Geopsittacus occidentalis*)

鸚鵡属鸚形目，鸚鵡科，是一类色彩艳丽的鸟。全世界有 340 多种鸚鵡，分属 6 个亚科，70—80 个属。包括产于澳洲和东印度群岛等地的美冠



鹦鹉、短尾鹦鹉、相思鹦鹉、金刚鹦鹉、长尾鹦鹉等等。下面我们分成4节介绍。

鹦鹉中，体型最小的是产于新几内亚及其附近岛屿的侏鹦鹉，身长只有8.4厘米。最大的是产于南美洲的金刚鹦鹉，身长竟可达1米。不过，这得归功于它那很长的尾巴。产于新几内亚的短尾鹦鹉虽然那么长，但体重可以超过它。

鹦鹉的喙弯曲有勾，腿较短。它们的脚掌前后有双趾，走起路来样子很怪，但爬起树来却是行家。这时候，它们的喙往往会助一臂之力。鹦鹉的舌头厚而强健，能够巧妙地摆弄它们的食物——种子和水果。以食花蜜为主的短尾鹦鹉舌头很长，舌尖像刷子。

鹦鹉主要栖息在热带区域，只有少数飞到北方和南方的温带地区。分布最多的地区是南美洲、澳大利亚、新几内亚及其附近岛屿。非洲和亚洲大陆的品种较少。

鹦鹉身上的色彩主要是绿色，但也有许多例外。一些美洲鹦鹉以蓝色和黄色为主。不少鹦鹉的翅膀上有红色。色彩最鲜艳的当数短尾鹦鹉。它们以红色和绿色为主色，配以蓝色、紫色、棕色、黄色和黑色。美冠鹦鹉基本上是白色和黑色，偶尔也有些黄色、红色和桃色。





鹦鹉的窝都设在洞中。树洞、白蚂蚁堆起来的洞、岩石里的洞，还有地面上的洞都是它们的家。只有产于南非洲的僧鹦鹉（长尾鹦鹉的一种）例外，它们用树枝自己筑起很大的巢。多数情况下，这些巢穴都是公用的，但每对僧鹦鹉都有自己的进出口。所以有的时候，它们的巢穴会大到把支撑它的树枝压垮。

20 世纪中期，许多僧鹦鹉曾引进到美国当笼鸟。这些僧鹦鹉有些不甘遭囚禁，越笼而逃。更多的是由它们的主人放生，因为他们忍受不了它们的吵闹。这些僧鹦鹉后来倒也很好适应了温带的气候，在美国的许多地区繁殖起来。然而它们还是不受欢迎，因为它们在非洲家乡曾毁坏庄稼，名声不好。


人们喜欢饲养鹦鹉，主要因为它们善于模仿人和别的声音。其中当属处身长 30 厘米，有着红色短尾巴的灰鹦鹉最为出色。实验证明，它的认知能力可以和海豚以灵长类相比。亚马孙鹦鹉是美洲鹦鹉中最善说话的鹦鹉。

由于人们大量捕捉和饲养鹦鹉，许多鹦鹉脱离了它们原先的生活环境，造成面临绝种的危险。每年都有几千只鹦鹉非法或合法地带进欧洲和北美，许多在路途中就死去。为了保护鹦鹉的生存，



最好的办法是除了现有的笼鸟之外，不再捕捉野生的鸚鵡来饲养。为此，许多国家都严格地限制捕捉、输出和输入鸚鵡。但总是有不少违法分子置若罔闻。澳大利亚鸚鵡、巴哈马鸚鵡、地鸚鵡、红眉鸚鵡、红尾鸚鵡等几十种鸚鵡都已面临绝种的危险。

分布在我国中部和南部地区的红领绿鸚鵡、绯胸鸚鵡、大绯胸鸚鵡、花头鸚鵡、灰头鸚鵡、长尾鸚鵡、短尾鸚鵡等都属我国二级保护动物。



(*Branta canadensis leucopareia*)

鹅和鸭、天物同属雁形目，鸭科，也是一种水禽。体型比鸭大，比天鹅小。严格说起来，鹅是指栖息到北半球温带和北极地区的3种水禽。它们有很强的迁徙能力，但也能在新英格兰和阿拉斯加这样的严寒地区过冬。

黑雁也是一种野生鹅。体型与最小的加拿大鹅相似。在北极地区筑窝，冬天在海水中度过。两种白鹅、雪鹅和体形较小的罗斯鹅也在北极地





区筑窝。头白色，羽毛呈蓝灰色的蓝鹅过去长期独立分成一种。现在普遍认为应归属于雪鹅。它和雪鹅的区别只在于羽毛的色彩不同。

灰雁是纯种的欧亚大陆野鹅之一，它是现在许多种家鹅的祖先。不过，我国体格魁梧的家鹅除外，据说它们是体态苗条的亚洲天鹅的后代。

在北美洲，加拿大鹅是分布最广，比较常见的一种。后来被引进到英国和斯堪的纳维亚。从北极圈里的阿拉斯加和加拿大到美国大草原的广大陆地，都是加拿大鹅筑窝的地方。由于栖息地地理状况的差异。所以各产地的鹅，包括它们的亚种在色彩和本体型的大小上都有差异。其体长从64—114厘米都有。它们的头、头颈和尾巴和呈黑色。脸颊上有白色的斑块。身上也有褐色的色斑。

产于加拿大阿留申群岛的阿留申鹅正面临绝种的威胁，属濒危动物。



阿劳特拉鹈鹕

鹈鹕属鹈鹕目，鹈鹕科，全球共有20多种。



它既是游禽，又是潜鸟。其特点是有一身致密如丝般的羽衣和退化残留的尾巴。

鸕鶿的喙长而尖，翅膀短而狭窄，它的脚长在身体的后面，走起路来显得很滑稽。翅膀收起来的时候，羽毛紧贴背部。脚趾长而且带一些蹼。许多鸕鶿在夏天有竖起的鲜艳耳朵簇毛和鸟冠，但到冬天的时候就没有那么醒目了。一年中不论哪一个季节，雄鸟和雌鸟的外表看起来都没有多大差别。

鸕鶿的食物主要是鱼和无脊椎动物。鸕鶿求爱的时候，会成双成对地在水面上跳起优美的舞蹈。它们用植物筑成的，在水上飘浮的窝通常靠在芦苇上，雌鸟一窝生下2—8个白色的蛋，然后雄鸟和雌鸟轮孵化。蛋的颜色在孵化的过程中逐渐变淡。过了20—30天以后，带着鲜艳色彩条纹的小鸟会破壳而出。

鸕鶿栖息在热带和气候温暖的温带地区。产于古北区（包括欧洲、亚洲北部和非洲撒哈拉以北地区）的鸕鶿是一种小型的鸕鶿，身长只有25.5厘米。旧大陆和澳大利亚产的鸕鶿体型较大，体长约48厘米。旧大陆和大利亚产的鸕鶿体型较大，体长约48厘米。中美洲和北美洲产的鸕鶿体长可达70厘米。



大多数鸕鶿会飞，新热带区的一些鸕鶿不地飞，只能在水中游。产于马达加斯加的阿劳特拉鸕鶿和产于厄瓜多尔的阿蒂特兰鸕鶿属濒危动物。

分布在我国东北等地的角鸕鶿和赤颈鸕鶿属国家二级保护动物。



阿姆斯特丹信天翁

信天翁是大型海鸟，属信天翁科，全球大约共有十几种。它是最善于滑翔的鸟类之一，有风的时候一边几个钟头停留在高空，那副又长又窄的翅膀可以一动也不动。可是没风的时候，要靠翅在空中支撑自己结实的身体可就难了。这时候，它们情愿浮在水面上。像所有的海鸟一样，信天翁喝海水为生，食物主要是鱿鱼。有时候它们也跟随船只吃一些船上抛下来的食物。



信天翁在繁殖的时候才飞回陆地。通常它们都是成群结队地飞到遥远的海岛上去，在那里交配。然后雌鸟会在光秃秃的地面上，或者是在筑起的巢中产下一个又大又白的蛋来。蛋由雄鸟和雌鸟轮流孵化。小信天翁长得很慢，特别是那些