

中華民國二十三年十一月

致正丸散膏丹集

上海市國醫學
編輯

第四冊各方原名首字筆畫與頁數對照表

蜈 葶 葵 葱 葛 萬 聖 椿 礪 睡 當 照 煮 滑 滌 滋 溫 搜 愈 塌 催

十三

四四四四四三二二二二一一一一一
七四三二二〇八七七六四三二一〇七五四三二一

蒲翠綠碧熊漢漏槐對寧奪壽團 雷雌隔鈎遇辟解補

十四畫

九九九八八八八七七七七 七七六六六六六四
八七四〇七六四一〇八三一 〇〇九六五三〇八

楸蝦蟆蔓莖翦磁瘡熟潤撥摩寬 銀酸遠豨蛛蒼莖蒺

十五畫

○六十四四二八七四三

[illegible]

攷正丸散膏丹集

上海市國醫學會編輯

十三畫

【催生如聖散】

王肯堂甲方催生如聖散

見證治準繩

〔功用〕催生。

〔藥品〕黃蜀葵子小半合。(炒。一作二錢。)

〔用法〕研爛。酒濾去滓。溫服。漏血胎乾難產痛極者，并進三服。良久。腹中氣寬胎滑。即產。然須見正產候。方可服之。

王肯堂乙方催生如聖散

同前又名王肯堂辛方烏金散又名王肯堂丙方黑神散

〔功用〕瘦胎。治逆產橫生。並治胎前產後崩

漏等證。

〔藥品〕百草霜。香白芷。(不見火)各等分。

〔用法〕研爲末。和勻。每服二錢。臨產時。童便及米醋少許打爲膏。沸湯調下。或用酒。童便。各半盞同煎。纔沸乘熱服。難產者再服即下。

【場氣丸】

錢乙場氣丸 〔功用〕治肝氣乘脾腹脹

〔藥品〕胡椒一兩。蠟尾。(去毒。滾醋泡。炒香。)(五錢。)(一方有木錢。一錢。)

〔製法〕共研末。麴糊爲丸。如粟米大。

〔用法〕每服五七丸至三十丸。不拘時陳米飲送下。

王肯堂甲方場氣丸 見證治準繩 〔功用〕治腹脹。

〔藥品〕木香。五錢。雞心檳榔。一雙。黑牽牛。二兩。(半生半炒。取頭末。一兩。)

〔製法〕共研細末。神麴糊爲丸。如黍米大。

〔用法〕每服二三十九。薑湯送下。

王肯堂乙方場氣丸 同前 〔功用〕治小兒疳氣。腹脹喘急。并面浮腫。

〔藥品〕丁香。胡椒。(炒)各五錢。蘿蔔子。(炒)白牽牛。各七痰五分。

〔製法〕共研爲末。麴糊爲丸。如小豆大。

〔用法〕三歲兒每服三十丸。米湯送下。

【場氣散】

惠濟場氣散 〔功用〕治氣滯。

〔藥品〕茴香。(炒)白牽牛。(炒)甘草。(炙)木香。各一分。

〔用法〕研爲末。每服五分。紫蘇湯調下。

楊氏塌氣散 〔功用〕治小兒腹脹。氣喘體腫面浮。

〔藥品〕陳米・（炒黃）青皮・（去麴）巴豆・二十一粒。同炒至黃色去巴豆（甘草）各五錢。黑牽牛・二錢五分。（半生。半炒。）肉豆蔻・二個。（煨香）檳榔・一個。

〔用法〕研爲末。每服五分。米飲調下。

王肯堂塌氣散

見證治準繩

〔功用〕治小兒腹脹氣粗。並疳疾相攻。面目浮腫。

〔藥品〕木香・一錢。青皮・五錢。巴豆・二十粒。（同豆炒黃色。去巴豆。）

〔用法〕研爲末。三歲兒每服五分。食前米湯調下連進卽效。

【愈風丹】

張子和愈風丹 〔功用〕治諸痺寒熱交作筋骨疼痛。手足拘牽。麻木不仁。及諸風癱瘓。口眼

歪斜。半身不遂。風溼等證。

〔藥品〕甘草・三錢。芍藥・川芎・桔梗・白殭蠶・（炒）細辛・羌活・南星（薑製）各五錢。麻黃・（去節）白芷・防風・天麻・全蠍・（炙）各一兩。

〔製法〕共研末。煉蜜爲丸。如彈子大。硃砂・五錢。爲衣。

〔用法〕每服一丸。細嚼。清茶或溫酒送下。

王海藏愈風丹 〔功用〕治癘風。

〔藥品〕苦參・（取末）四兩。卑角・（剉寸許。無灰酒浸一宿。以水一碗。按成汁。去滓。入砂

器中文武火熬。)各一斤。土花蛇。(去腸。陰乾。酒浸。取淨肉。晒乾爲末。)白花蛇。烏梢蛇(依前酒浸。取肉爲末。)各一條。

〔製法〕研爲末。入前二味和丸。如梧桐子大。

〔用法〕每服六七十丸。空腹時煎通聖散送下。乾物壓之。一日三次。間日浴之。汗出爲度。〔雜論〕此方治癘風甚效。惟因肝經血熱。脾經血虛。腎經虛火。脾肺氣虛。致遍身作癢。屑破成瘡。或內熱生風而眉鬢脫落。或皮膚赤暈。或搔起白屑。形似癘風而實非癘風者。不可服。服之反成癘風。不可不慎。

王肯堂愈風丹

見證治準繩

〔功用〕治足三陰虧損。風邪所傷。致肢體麻木。手足不隨等證。

〔藥品〕天麻。牛膝。(酒浸。焙。)萆薢。玄參。各六兩。杜仲。七兩。羌活。十四兩。當歸。熟地黃。生地黃。各一斤。獨活。五兩。肉桂。三兩。

〔製法〕共研末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。

〔用法〕每服五七十丸。熱湯送下。

〔搜風丸〕

劉河間搜風丸 〔功用〕治邪氣上逆。風熱上攻。頭目眩暈。二便結滯。

〔藥品〕人參。薄荷。茯神。各五錢。藿香二錢五分。蛤粉。天南星。(一作五錢。)大黃。滑石。黃芩。各二兩。牽牛。四兩。乾薑。生白礬。半夏。寒水石。各一兩。

〔製法〕研爲細末。滴水和丸。如小豆大。

〔用法〕每服十九丸。加至二十九丸。生薑湯送下。一日三次。

沈金鰲搜風丸

見沈氏
尊生書〔功用〕攻積。

〔藥品〕黑丑頭末。二兩。大黃。枳實。檳榔。各五錢。

〔製法〕共研末。米糊爲丸。如梧桐子大。

〔用法〕每服二三錢。米飲送下。

溫中丸

許叔微溫中丸

濟本事方
見類證普

〔功用〕治婦人衝任虛損。血氣虧傷。月水斷續。腹中疝痛。寒熱煩瘥。咽燥舌乾。心神忪悸。頭目眩暈。肢體倦怠。腰背引痛。筋脈拘急。帶下赤白。

〔藥品〕生地黃。生薑。各一斤。（均切碎。各研取汁。將薑汁炒地黃渣。再將地黃汁炒生薑渣。

。）白芍藥。二兩。人參。（去蘆）蒲黃。（炒）當歸。（酒洗）琥珀。（另研）白茯苓。（去皮）黃耆。（蜜炙）延胡索。（炒）麥門冬（去心）烏梅肉。（焙）各一兩。

〔製法〕研爲細末。另用白艾葉。一斤。清水一斗。煎取濃汁熬成膏。和前藥爲丸。如梧桐子大。

〔用法〕每服五十丸。空腹食前。溫米飲送下。

王肯堂溫中丸

見證治
準繩

〔功用〕治小兒胃寒瀉白。腸鳴腹痛。吐酸不食。及霍亂吐瀉之虛者。

〔藥品〕人參。白朮。甘草。各等分。

〔製法〕共研細末。薑汁麵糊爲丸。如綠豆大。

〔用法〕每服二三十九。不拘時米飲送下。

張路玉溫中丸

見張氏醫通

〔功用〕治黃胖而腫足脹。

〔藥品〕橘皮。半夏。茯苓。各一兩。甘草。〔炙〕五錢。黃連。香附。苦參。鉞炒。〔醋煨。鋪過。〕各五錢。白朮。二兩。神麴。一兩。

〔製法〕研爲細末。醋水各半泛丸。如梧桐子大。

〔用法〕每服七八十九。用白朮。六錢。陳皮。一錢。生薑。三片。煎湯送下。虛加人參。一錢。病輕者。服六七兩。小便卽長。病甚者。服一斤。小便始長。積聚去淨。再以六君子之類調補之。

〔溫白丸〕

局方溫白丸

見太平惠民和劑局方又名局方萬病紫苑丸方

〔功用〕治胸腹中一切積聚。久癥。堅痞。胸滿聚腹脹。嘔噦。氣

逆。氣滿。氣脹。水飲。噎膈。食滯。五種淋證。九種心痛。七十二種風證。癰瘰。偏枯。眉落。髮墮。遁尸。疰忤。癩癧。蟲積。婦女經帶。憂鬱。肝氣。鬼胎。等證。

〔藥品〕桔梗。柴胡。萸蒲。吳茱萸。〔湯泡七次。焙乾。〕紫苑。〔去苗土〕黃連。〔去毛〕肉桂。

〔去粗皮〕厚朴。〔去粗皮。薑汁炙。〕人參。〔去蘆〕赤茯苓。〔去皮〕皂角。〔去皮子。炙。〕

蜀椒。〔去目并合口。炒出汗。〕巴豆。〔去皮心膜。出油炒。細研。〕各五錢。川烏頭。

〔炮。去皮臍。〕二兩五錢。〔一方有炮薑。五錢。〕

〔製法〕研爲細末。和勻。煉蜜爲丸。如梧桐子大。

〔用法〕每服三九。漸加至五七九。食後臨臥薑湯送下。如息賁。加人參。紫菀。伏梁。加葛蒲。黃連。桃仁。痞氣。加吳茱萸。乾薑。肥氣。加柴胡。川芎。奔豚。加丁香。茯苓。遠志。久病服之。皆能瀉出蟲蛇惡穢之物。

王肯堂甲方溫白丸

〔見證治準繩〕

〔功用〕治小兒久瀉。脾虛不食。食卽瀉出。不能消化。

〔藥品〕白朮。一分。(米泔浸。切焙。)丁香。五分。(炒)半夏。一錢。(米湯泡洗七遍)

〔製法〕共研細末。生薑自然汁。煮麵糊爲丸。如梧桐子大。

〔用法〕半歲兒每服三九。三五歲五七九。淡生薑湯送下。早晚二次。

王肯堂乙方溫白丸

〔功用〕治小兒脾氣虛困。泄瀉瘦弱。冷疳洞利。及因吐瀉。或久病成慢

驚癲癱者。

〔藥品〕天麻。五錢。白附子。天南星。(剉。湯洗。焙乾。)白蠟。蜜。(炒)各一兩。乾蠟。(去

毒)一錢。

〔製法〕共研細末。湯浸寒食麵爲丸。如綠豆大。仍於寒食麵中養七日。取出用。

〔用法〕每服五七九。至二三十九。空腹時生薑汁和米飲送下。量病勢漸加九數服之。

〔滋陰地黃丸〕

王肯堂滋陰地黃丸

〔見證治準繩〕

〔功用〕治腎虛不足兩耳虛鳴。腰汁不乾。

〔藥品〕熟地黃。一兩。山茱萸。五錢。白茯苓。甘菊花。牡丹皮。何首烏。〔黑豆蒸三次〕黃藥。
各四錢。

〔製法〕研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。

〔用法〕每服三五十丸。熱湯送下。

沈金鰲滋陰地黃丸

見沈氏
醫生書

〔功用〕生津。養血。

〔藥品〕熟地黃。四兩。山茱萸。山藥。天門冬。麥門冬。生地黃。知母。貝母。當歸。香附。
各二兩。茯苓。牡丹皮。澤瀉。各一兩五錢。

〔製法〕〔用法〕俱同上。

李東垣滋陰地黃丸 卽李東垣熟地黃丸。

〔滋陰百補丸〕

沈金鰲滋陰百補丸

見證治
準繩

〔功用〕治婦人諸虛百損。五勞七傷。陰陽不和。乍寒乍熱。心腹

疼痛。不思飲食。怔羸無力。

〔藥品〕香附。一斤。〔用酒。醋。鹽。童便。各浸四兩。焙。〕益母草。八兩。當歸。〔酒洗〕六
兩。熟地黃。〔薑汁炒〕川芎。白朮。各四兩。白芍藥。三兩。延胡索。人參。茯苓。各二
兩。甘草。〔炙〕一兩。

〔製法〕共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。

〔用法〕每服五六十丸。空腹時熱湯送下。

鮑相璈滋陰百補丸

見驗方新編

〔功用〕治男婦陰虛。五心煩躁。骨蒸內熱。四肢無力。困憊羸瘦。

。自汗盜汗。遺精白濁。五淋帶下。

〔藥品〕熟地黃・八兩。牡丹皮・澤瀉・各三兩。山茱萸肉・山藥・龜版・（炙）各四兩。知母・茯苓・黃蘗・各二兩。

〔製法〕共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。

〔用法〕每服三錢。鹽湯送下。

【滋陰清化丸】

沈金鰲甲方滋陰清化丸

見沈氏尊生書

〔功用〕治痰熱。

〔藥品〕熟地黃・生地黃・天門冬・麥門冬・當歸・龜甲・阿膠・白芍藥・茯苓・山藥・貝母・天花粉・甘草・五味子。

〔製法〕共研細末。煉蜜爲丸。如芡實大。

〔用法〕每服一丸。口含化下。

沈金鰲乙方滋陰清化丸

同前

〔功用〕治火嗽。

〔藥品〕生地黃・（酒浸）熟地黃・（酒浸）天門冬・麥門冬・各二兩。黃蘗・（鹽酒炒）一兩五錢。白芍藥・（酒製）茯苓・山藥・枸杞子・玄參・薏苡仁・各一兩。五味子・七錢。甘草・五

錢。

〔製法〕共研細末。煉蜜爲丸。如彈子大。

〔用法〕每服一九。空腹時口含化。如痰嗽太甚，加陳皮。貝母。各一兩。

沈金鰲丙方滋陰清化丸

同前

〔功用〕治相火生痰。及內傷欬。

〔藥品〕天門冬。麥門冬。生地黃。熟地黃。知母。貝母。茯苓。山藥。天花粉。五味子。甘草。

〔製法〕共研細末。煉蜜爲丸。如彈子大。

〔用法〕每服一九。口含化下。

顧世澄滋陰清化丸

見瘍醫大全

〔功用〕治肺癰。

〔藥品〕天門冬。〔去心〕麥門冬。〔去心〕枸杞子。知母。〔酒洗〕當歸。〔酒洗〕生地黃。〔酒洗〕熟地黃。〔酒煮〕川貝母。〔去心〕各二兩。北五味。七錢。牡丹皮。山茱萸肉。玄參。各一兩。白茯苓。山藥。各一兩五錢。

〔製法〕共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。

〔用法〕每服三錢。空腹時熱湯送下。

〔滌痰丸〕

嚴用和滌痰丸 〔功用〕豁痰。清熱。利氣。補虛。治中風痰迷心竅。舌強不能語。

〔藥品〕半夏。膽星。〔並薑製〕各二兩五錢。枳實。橘紅。茯苓。各二兩。石菖蒲。人參。各一

兩。竹茹。甘草。各五錢。

〔製法〕共爲細末。將膽星煇化泛丸。如梧桐子大。

〔用法〕每服二三錢。熱湯送下。

王氏方滌痰丸

〔功用〕滌痰。

〔藥品〕半夏麴。桔礬。阜角。〔火炙。刮去皮弦子。〕玄明粉。白茯苓。枳殼。各等分。

〔製法〕研爲末。霞天膏和丸。如梧桐子大。

〔用法〕每服二三十丸。熱湯送下。

【滑石散】

孫思邈甲方滑石散見千金要方〔功用〕治轉脬。

〔藥品〕滑石一兩。凝水石。二兩。葵子。一合。

〔用法〕研爲末。清水一斗。煮取五升。時時服。一升卽利。

孫思邈乙方滑石散同前〔功用〕治產後淋。

〔藥品〕滑石。一兩二錢五分。通草車前子。葵子。各一兩。

〔用法〕研爲末。每服方寸匕至二匕。漿水調下。

圭背堂甲方滑石散見證治準繩〔功用〕治轉胞。

〔藥品〕白滑石。亂髮灰。車前子。木通。各一兩。寒水石。二兩。冬葵子。一合。

〔用法〕劉散。清水一斗。煮取五升。時時服。一升卽利。

王肯堂乙方滑石散

同前

〔功用〕治女勞疸。

〔藥品〕滑石。一兩五錢。枯白礬。一兩。

〔用法〕研爲細末。每服二錢。食前大麥粥清調下。以小便出黃水爲度。

〔雜論〕此卽硝石方。硝與滑字形相近。未知孰是。姑兩存之。

王肯堂丙方滑石散

同前

〔功用〕治小兒溺短作痛。

〔藥品〕滑石。括樓根。石葦。(去毛)各等分。

〔用法〕搗羅爲散。每服五分。煎大麥飲清調下。一日二次。量兒大小加減。

【養肝散】

羅天益養肝散

見衛生寶鑑

〔功用〕治雀目羞明。小兒疳眼翳膜。

〔藥品〕夜明砂。青蛤粉。穀精草。各一兩。

〔用法〕研爲細末。每服一錢。五七歲以上二錢。獾豬肝。一大片。批開。摻藥在內攤勻。麻線纏定。以米泔半碗。煮肝熟。取出。肝湯傾碗內。薰眼。分肝作三服。嚼訖。卻用熱肝湯下。一日三服。不拘時候。大人雀目。空腹時服。至夜便見物。如患多時。一日服二次。

王肯堂甲方養肝散

見證治準繩

〔功用〕治內外障翳眼。

〔藥品〕夜明砂末・二錢。

〔用法〕用豬肝・二兩。批開。搽夜明砂末在肝內。麻繩縛定。清水一盞。煮令肝轉白色。取出爛嚼。用煮肝湯送下。食後服。

王肯堂乙方煮肝散

前同

〔功用〕治眼生黑花。漸生內障。及鬪睛偏視。風毒攻眼。腫痛澀癢。

短視倒睫。雀目。

〔藥品〕羌活。獨活。〔均去蘆〕青箱子。甘菊花。各一兩。

〔用法〕研爲細末。每服三錢匕。羊子肝。一葉。〔剉細〕淡竹葉數片。同裹如糝子。另用雄黑豆・四十九粒。米泔一碗。銀石器內。同煮至黑豆爛。泔乾爲度。取肝細嚼。溫酒送下。又將豆食盡。空腹日午夜臥服。

王肯堂丙方煮肝散

前同

〔功用〕治婦人冷勞。脾胃虛乏。大腸轉洩。水穀不化。四肢羸瘦。口

內生瘡。不思飲食。虛乏無力。

〔藥品〕北柴胡。縮砂仁。蒔蘿。蔓撥。各三分。白朮。白芷。胡椒。白薑。陳皮。山茵陳。人參。蕪荑仁。木香。紫苑。白芍藥。北細辛。桂心。各五錢。

〔用法〕研爲細末。以覆豬肝。一具。〔去脂膜切如柳葉片。新汲水洗過。〕葱白・三寸。〔細切〕入藥末・五錢於鉢內。以新汲水二大盞。入鹽醋少許。以瓷碗合煮。令水盡。空腹隨意食之。食前飲下。食後良久飲暖酒一盞。晚食前熱服。

【照水丸】

王肯堂甲方照水丸

見證治準繩

〔功用〕治目生翳膜。

〔藥品〕海螵蛸・一錢。硃砂・五分。片腦・五釐。黃蠟・八分。

〔製法〕研爲末。先熔蠟攪微冷。入末和爲丸。如麻子大。帶扁些。

〔用法〕每用一丸。臨臥時納眼中翳膜上。次日照水自落。

王肯堂乙方照水丸

同前

〔功用〕治目生翳障。侵及瞳人。及一切目疾。

〔藥品〕龍腦・滑石・丹砂・（通明者）烏賊魚骨・（去甲）各一錢。

〔製法〕研爲細末。和勻。先用黃蠟・一塊。（如阜子大）於新白瓷蓋內。慢火熔。以紗帛濾。

在淨蓋內再熔化。將前藥末同拌和。捏作餅子。如綠豆大。用薄絹或紗袋盛之。以硃砂

・五錢。放淨碗內。上置交橫竹片。鋪藥於上。熏之。勿令透氣。透一地坑。放藥碗在

內。蓋好。後以黃土蓋之。七日取出。貯淨瓷瓶中。去硃砂不用。

〔用法〕每用一餅。臨臥時貼在眼瞼。卽睡至曉。用水一碗。覷之。其藥自落水中。淨浴目患

。卻用絹帛裹起。安潔淨處。臨臥依前再使。每餅可用半月。候藥力慢時。方易一餅。

如兩目有疾。卽用兩餅。

【當婦丸】

王海藏方當歸丸

〔功用〕和血。

〔藥品〕四物湯・防風・獨活・全蠍・各五錢。茴香・（炒）續斷・各一兩。苦棟・玄胡索・各七