

动物奥秘探索

DONGWU AOMI TANSUO

(三十九)

DONGWUAOMITANSUO

吉林音像出版社
吉林文史出版社

动物奥秘探索

(39)



吉林音像出版社

吉林文史出版社



目
录

黑翅鸢	/ 1
红脚隼	/ 4
棕尾鵟	/ 7
山斑鸠	/ 9
青脚鹬	/ 11
矶鹬	/ 13
黑腹滨鹬	/ 16
白腰杓鹬	/ 18
鸦嘴卷尾	/ 19
黑卷尾	/ 21
鹊鹬	/ 23
大红鹳	/ 25
智利红鹳	/ 26
小红鹳	/ 28
双辫八色鸫	/ 29
白额燕尾	/ 31
蓝八色鸫	/ 32
灰雁	/ 34
山鹊鸽	/ 36
白腹黑啄木鸟	/ 38
棕颈犀鸟	/ 40






目
录

白眉姬鹀	/43
白喉犀鸟	/44
大杜鹃	/47
董鸡	/49
黑头蜡嘴雀	/51
黄喉鹀	/52
红头咬鹃	/54
白鹭	/56
画眉	/59
石鸡	/61
小鹀	/62
发冠卷尾	/64
杂色山雀	/66
乌林鹀	/67
黑顶蟆口鹀	/70
橙胸咬鹃	/72
鬼鹀	/74
纵纹腹小鹀	/77
极北柳莺	/79
长尾林鹀	/81
须浮鹀	/83
扇尾沙锥	/85



目
录

黄腿渔鸮	/ 88
红嘴鸥	/ 89
白颈鸦	/ 92
蚁鴽	/ 93
树鸮	/ 95
黄(斑)苇鵲	/ 97
环颈鸮	/ 101
灰头鸮	/ 103
乌雕鸮	/ 105
厚嘴苇莺	/ 107
栗苇鵲	/ 109
草鹭	/ 112
林雕鸮	/ 115
雕鸮	/ 117
黑喉石(即鸟)	/ 121
东方大苇莺	/ 123
黄嘴角鸮	/ 125
栗鸮	/ 127
金翅雀	/ 129
灰头鸮	/ 131
仓鸮	/ 132
加拿大黑雁	/ 135



乌灰鸫	/137
小鸦鹃	/138
牛背鹭	/140
双斑绿柳莺	/145
褐翅鸦鹃	/147
锡嘴雀	/150
喜鹊	/151





黑翅鸢

中文名：黑翅鸢

拉丁名：Elanus caeruleus



英文名：Black-

Winged Kite

物种分类：脊索

动物门→脊椎动物亚

门→→鸟纲→今鸟亚

纲→→今颚总目→隼

形目→→→鹰科→

→黑翅鸢属

分布范围：全世界共 5 个亚种，中国有 1 个亚种。

Elanus caer-

uleus caeruleus, 分

布葡萄牙亚、非洲

(非洲西北部、阿

拉伯半岛和撒哈拉

的南部非洲)、亚





洲南部。

Elanus caeruleus caeruleus, 分布苏门答腊。

E. c. hypoleucus, 分布爪哇、伦巴克 (Lombok)、苏门答腊、加里曼丹、苏拉威西岛 (Sulawesi)、苏禄群岛、卡拉奥 (Kalao) 和菲律宾等地。

E. c. Wahgiensis, 分布巴布亚新几内亚中部和东部高地。

E. c. Vociferus, 分布中国南方云南 (留鸟), 体色较淡、体型较小。国外分布印度、巴基斯坦、斯里兰卡、尼泊尔、孟加拉和马来半岛。

中国为南方亚种 *E. c. Vociferus*, 分布云南 (留鸟)。

保护级别: 《中国濒危动物红皮书·鸟类中》列为易危种;

已被列为国家Ⅱ级重点保护动物;

CITES1995 年列入附录Ⅱ

动物简介: 别名: 灰鹞子。

野外鉴定: 体型较小, 翅长 275~287mm; 上体灰色, 翅上小覆羽黑色。下体白。上嘴具弧状垂; 鼻孔裸露, 眼先被须。

形态: 成鸟体长 315~345mm。前额灰白, 眼先须羽和眼上的狭窄眉纹黑色; 头顶、后颈、背



部、尾上覆羽和中央尾羽表面，初级覆羽，大覆羽和次级飞羽皆为烟灰色，初级飞羽亦烟灰而尖端缀灰褐色，翅上小覆羽黑亮而成黑斑；尾下覆羽、体下、腋下、翅下覆羽均白色。雌雄鸟相似。幼鸟头顶棕色，上体棕褐，皆具白色羽缘；颊和喉白色。虹膜朱红色，幼鸟呈黄或黄褐色；嘴黑色，蜡膜及嘴角亮黄色；跗蹠和趾深黄，爪黑色。

生境：常栖息云南海拔 800~2100m 的森林山区。也在开阔的田野活动。

食性：以动物为食，主要是鼠类和鸟类。此外还吃蜥蜴、青蛙和昆虫等。

行为：常见单个飞翔于田野和稀树上空，也栖息在电线杆和树木顶端，或翱翔天空。不善鸣叫，有时飞行较低。

繁殖：每年 3~4 月繁殖。巢筑于大树树杈上，由小枝、细树根和纤细草茎作垫物。每窝卵 3~4 枚，每枚，每次产卵间隔 2~3 天。孵化期为 26 天。

迁移：中国境内在云南为留鸟；在浙江为夏候鸟。

环境压力：黑翅鸢在我国分布狭窄，数量稀少。随着森林的采伐，栖息地破坏，今后会更加濒危。




红脚隼

中文名：红脚隼

拉丁名：Falco amurensis

英文名：East-
ern Red
footed Falcon



物种分类：脊

索动物门→脊椎动

物亚门→→鸟纲→今鸟亚纲→→今颚总目→隼形
目→→→隼科→→隼属

分布范围：在国外繁殖于俄罗斯的西伯利亚、
朝鲜和蒙古等地，越冬在印度、缅甸、泰国、老
挝和非洲。在中国几乎遍及全国各地，其中在黑龙
江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山东、山
西、内蒙古、甘肃、宁夏、陕西、四川等地为夏
候鸟，上海、浙江、贵州为旅鸟，云南为冬候鸟。

保护级别：国家Ⅱ级重点保护动物

动物简介：红脚隼又叫青燕子、青鹰、红腿
鹞子等，是小型猛禽。



体长 26~30cm, 体重 124~190g。羽色与猛隼、燕隼相近, 但也有明显的差异, 上体的体羽主要为暗石板灰黑色, 尾羽和翅膀为灰色, 没有横斑。尾下的覆羽和覆腿羽为橙棕栗色, 腋羽和翼下的覆羽为纯白色, 颊部、喉部和颈部的侧面为灰白色, 胸部、腹部和两胁为灰色, 胸部还具有纤细的黑褐色羽干纹。虹膜暗褐色, 眼周和蜡膜橙黄色, 嘴肉红黄色, 基部淡黄色, 先端黑色, 脚、趾橙黄色, 爪呈淡红色, 与猛隼、燕隼等隼类不同。

栖息于低山疏林、林缘、山脚平原和丘陵地区的沼泽、草地、荒野、河流、山谷和农田耕地等开阔地区, 特别是有稀疏树木的平原和低山、丘陵等地区较为常见。通常单独活动, 飞翔时两翅快速煽动, 间或进行一阵滑翔, 也能通过两翅的快速煽动在空中作短暂的停留。主要以蝗虫、蚱蜢、蝼蛄、螽斯、金龟子、蟋蟀、叩头虫等昆虫为食, 也吃小鸟、蜥蜴、石龙子、蛙和鼠类等小型脊椎动物, 其中害虫占其食物的 90% 以上, 在消灭害虫方面功绩卓著。觅食方式主要通过在空中飞翔寻觅地面食物, 发现后则冲下捕食, 也在空中追捕猎物。

在中国春季迁到北方繁殖地的时间大多在 4



月末至5月初，秋季离开繁殖地的时间大多在10月末至11月初。它是迁徙旅程最远的猛禽，单程为13,000~16,000kg。

繁殖期为5~7月份，通常营巢于疏林中高大乔木树的顶端，有时也侵占喜鹊等其他鸟类的巢，我国古代《诗经》中有“维鹊有巢，维鸠居之”的诗句，这种“鹊巢鸠占”现象中所指的“鸠”就是红脚隼。巢近似球形，有顶盖，侧面有两个出口，口径为17mm，巢距地面的高度为6~20m，主要由落叶松、柞树、刺槐等树木的干树枝构成。每窝产卵4~5枚。卵呈椭圆形，白色，密布红褐色的斑点。卵的大小为 $37 \times 30\text{mm}$ ，卵重为14~19g。孵卵由亲鸟轮流进行，孵化期为22~23天。雏鸟为晚成性，孵出后由亲鸟共同抚养大约27~30天后离巢。

注：在《中国鸟类野外手册》中将红脚隼的不同亚种分为红脚隼（拉丁名：*Falco vespertinus*；英文名：Red-footed Falcon）和阿穆尔隼（拉丁名：*Falco amurensis*；英文名：Amur Falcon）两种。



棕尾鵟

中文名：棕尾鵟

拉丁名：Buteo rufinus

英文名：Long-legged Buzzard

物种分类：

脊索动物门→脊椎动物亚门→→鸟纲→今鸟
亚纲→→今颞总目→隼形目→→→鹰科→→
鵟属

分布范围：全世界2个亚种，中国只有1个亚种。

B. rufinus rufinus，分布欧洲东部和南部，亚洲、中亚细亚和阿富汗。

B. r. Cirten-
sis，分布于北非，
从摩洛哥到埃及。

中国为指名亚种 *B. r. Rufinus*，
分布于新疆（留
鸟），西藏（旅鸟、





冬候鸟)，甘肃（留鸟）。

保护级别：《中国濒危动物红皮书·鸟类》中列为稀有种；

国家Ⅱ级重点保护动物；

CITES1995 年列入附Ⅱ。

动物简介：别名：大豹、鸽虎。

野外鉴定：上体褐色；第 2~5 枚初级飞羽外翮具横斑；下体棕白色；尾部棕褐色，与其他种鸢不同。飞行时，翅上举呈“V”形，翼尖黑色。

形态：中大型猛禽。成鸟头、颈棕褐色，具黑色羽轴；眼先及眼上下淡色而具黑色羽领；上体余部近褐，羽缘茶棕；初级飞羽黑褐，内翮自缺刻至羽基白色，贯以淡棕褐色横斑；次级飞羽较淡、内翮具暗褐色横斑；翅下覆羽和腋羽大都为棕褐色，尾羽淡棕褐，羽干纹白，尾尖淡棕，具宽阔的暗褐色次端斑。颈、喉、胸主要为棕色；下腹淡棕白；覆腿羽近栗色；尾下覆羽与下腹相

似。幼鸟体色与成鸟相似，但尾羽具较多的暗褐色横斑。

虹膜黄褐或黄白色；嘴黑色；蜡膜黄绿色；跗蹠淡





黄；爪脚黑色。

生境：栖息于草原、平原、半沙漠和山区等开阔地带，在森林中不易见到。


食性：主要食物为鼠类，也吃蛙、鸟类、蜥蜴等。

行为：常单独活动。常在岩石、土丘上站立等待寻找地上猎物。不善鸣叫，在求偶时期鸣叫，叫声如“pece-oo”，声，叫声短而尖锐。

繁殖：筑巢在岩石或峭壁上，周围有灌丛覆盖。巢材由枝条和干草作成。每窝卵2~5枚。卵白色或白绿色；卵大小为 $60 \times 47\text{mm}$ （许维枢，1995）。

迁移：为留鸟。

环境压力：棕尾鸢是草原地带猛禽，在我国分布狭窄，数量稀少。



中文名：山斑鸠

拉丁名：Streptopelia orientalis

英文名：Oriental Turtle Dove

拉伯半岛以及喜马拉雅山—横断山脉—岷山—秦岭—淮河以北的亚洲地区。)，印度次大陆及中国的西南地区（包括印度、孟加拉、不丹、锡金、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡、马尔代夫以及中国西藏的东南部地区等。），中南半岛和中国的东南沿海地区（包括缅甸、越南、老挝、柬埔寨、泰国以及中国的东南沿海地区、香港、海南岛。），太平洋诸岛屿（包括中国的台湾省、东沙群岛、西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛以及菲律宾、文莱、马来西亚、新加坡、印度尼西亚的苏门答腊、爪哇岛以及巴布亚新几内亚。）

在中国分布几乎遍及全国各地。种群数量较多。

动物简介：全长 33cm。上体以褐色为主，颈基两侧各有一带蓝灰色羽缘的黑色斑块；肩羽具



显著红褐色羽缘；尾端灰白；下体以粉褐色为主，腹部淡灰色。

栖息于多树地区，平原至中山地带的阔叶林和针阔混交林内；繁殖季节多在地带，冬季迁至平原。常结群活动。取食于地面，主要以杂草种子、植物的嫩叶和果实、农作物种子为食，也吃昆虫及其幼虫。繁殖期4~7月；一般产两窝。以稀疏树枝构成平盆状，在树上和灌木丛间筑巢。每窝产卵两枚，卵白色。雏鸟孵化18天左右出壳。双亲均参加育雏。



中文名：青脚鹬

拉丁名：Tringa nebularia

英文名：Common Greenshank

物种分类：脊索动物门→脊椎动物亚门→→
鸟纲→今鸟亚纲→→今颚总目→鸻形目→→→鹬
科→→鹬属

分布范围：分布于欧亚大陆及非洲北部（包括整个欧洲、北回归线以北的非洲地区、阿拉伯