

1119
1994-1-13
99349

中医研究丛书

妇科要略補註

韓王輝輯

山西省中医研究所印

中医研究丛书

妇科挈要补註

韓玉輝輯

山西省中医研究所

1963·10

原序

我因父亲早丧，在童年的時候，便和热爱祖国医学，而且接受三世家傳的祖父在一起生活。当我还在十五、六歲的時候，祖父便开始教我學医。从二十一歲起，就輟學經、史，專攻歧黃，并試行治疗。由于我自小对医学的耳濡目染和祖父多年的諄諄教誨，更加以每当临床之時，祖父对我的精心指点，所以在我行医初期，是頗称順手的。正由于这样，那时，我便自謂深得家傳，頗竊自負。嗣后，我在邊做邊學中，先后涉猎了《傷寒論》、《金匱要略》，以及先哲們的其他医学論著，方术越多，疗效更佳。至是更沾沾自喜，自負尤甚。

但是，在我沾沾自喜的同时，由于我接触的範圍逐漸擴大，而所遇的病症越來越杂，不仅破綻不時出現，而且对不少疑难大症，竟至不知原因何屬，一籌莫展，这才开始懂悟，前之自負，实系初生之犢不畏虎的幼稚表現。从此，虛心地

苦学苦钻，从实践中细心体察，始知不論先人秘傳，名家遺著，決不允許食古不化，要在灵活掌握，辨証施治。就如：《金匱》所載大黃牡丹皮湯、局方龍膽泻肝湯，原方各有主治，运用之际，君、臣、佐、使的安排，仍須自有主張，运用不当，实難收效。如同一龍膽泻肝症，若阴道肿潰，宜龍膽草為君；若阴道发炎出血，宜生地為君，這就是經過反复實踐才体会所及的。又如婦人三十六症，古人有溫經湯，在引用時，又因補熱藥較多，收效不大，經臨床試用解恨煎，就效果可靠。還有婦人崩漏出血的止崩湯，舒肝解郁的逍遙散，以及應用最廣的平胃散之類。若地黃之生用、熟用，健胃的蒼朮、白朮，亦必須因人因病制宜，間不容發。如何才能運用得當，收效立竿見影，其中都蘊藏着無限的科學道理。回憶我從開始行醫直至現在五十年來，實際就是本着家傳醫術；參考經典著作，賢哲論著；依靠自己亲自實踐，在臨床中繼續摸索，逐步体会，逐步學習了五十年。會不斷將我体会摸索中印象最深，作用較著的措施摘要記錄下來，拟作嗣后繼續証驗的資料。時值大躍進中，大家都在為建設社會主義效勞，我也就情不自禁地以掬誠獻曝的心情，將我五十年來治療婦女病的記錄摘要，拟名“妇科掣要”

的先行出版，以供家庭自行医疗及医界同仁研究时参考。但由于我年老昏聩，学识浅陋，谬误之处，在所难免，渴望读者和医界同仁多方指教。

韓玉輝 1959年7月

再序

余識陋学疏，安敢著書問世，党号召繼承發揚祖國医学，互相交流学术經驗，曾于五九年輯《妇科挈要》一卷，將五十年來之臨床經驗草創擇要撰出，书中未詳研討，遺誤难免。今得門生協助，重加整理，全書分述調經、崩漏、帶下、嗣育、癥瘕、妊娠、产后、乳病、雜症等，言淺易明，不若旨深而難喻。卷中系吾平生治療心得，而非纂集前人已效之方，應今人无限之疾，非若按圖索驥，刻舟求劍之比也。此編惟望家喻戶曉，遇病寧症施藥，以濟世活人，裨益于人民健康之一端焉。

韓玉輝 1963年7月

目 录

論女子天癸	(1)
第一章 月經病	(2)
第一节 調 经	(2)
第二节 经候不調	(5)
第三节 经水不匀	(6)
第四节 经痛腹脹發燒	(7)
第五节 经未來先腹痛	(9)
第六节 经后腹痛	(9)
第七节 经行无定期	(10)
第八节 氣滯血郁經痛	(11)
第九节 经血逆行	(12)
第十节 年老經水復行	(13)
第十一节 經水量多行過復行	(13)
第十二节 妇女經候不准妄行	(14)
第二章 崩漏	(16)
第一节 闪跌血崩	(16)
第二节 抑郁血崩	(17)
第三节 年老血崩	(17)
第四节 崩日久漏下	(18)

第五节 经多崩漏 (19)

第三章 論 帶 下 (20)

- 第一节 帶下通治 (20)
- 第二节 白 帶 (21)
- 第三节 黃 帶 (22)
- 第四节 赤 帶 (22)
- 第五节 赤白帶下 (23)
- 第六节 五色帶下 (24)

第四章 調節生育論 (25)

- 第一节 少腹卵部迫痛不孕 (25)
- 第二节 少腹急迫不孕 (26)
- 第三节 小便艰涩腹胀足肿不孕 (27)
- 第四节 经前洩水不孕 (28)
- 第五节 交感出血不孕 (29)

第五章 論 瘡 瘘 积 聚 (30)

- 第一节 瘰癧病 (30)
- 第二节 血 瘘 (31)
- 第三节 血 瘴 (32)
- 第四节 肠覃病 (32)
- 第五节 石瘕病 (33)

第六章 論 妊 娠 (34)

- 第一节 安胎理气 (34)
- 第二节 妊娠胎动不安 (35)
- 第三节 妊娠腹中疼痛 (36)

第四节	养血安胎	(37)
第五节	胎血热凉胎	(37)
第六节	妊娠胎漏	(38)
第七节	妊娠胞阻	(38)
第八节	妊娠激经	(39)
第九节	妊娠小便短涩	(40)
第十节	妊娠转胞	(40)
第十一节	妊娠子瘖	(41)
第十二节	妊娠子痫	(41)
第十三节	妊娠子淋	(42)
第十四节	妊娠子烦	(42)
第十五节	妊娠子嗽	(43)
第十六节	妊娠子悬	(44)
第十七节	妊娠子气	(45)
第十八节	妊娠子肿	(45)
第十九节	妊娠子满	(46)
第二十节	妊娠子死腹中	(47)
第二十一节	妊娠子唏 (钟鸣)	(47)

第七章 論产后 (49)

第一节	产后血晕	(51)
第二节	产时下血过多血晕	(52)
第三节	产时去血少瘀血发晕	(52)
第四节	产后呕吐下痢	(53)
第五节	产后气喘腹痛	(54)
第六节	产后大喘大汗	(54)
第七节	产后亡阳发狂	(55)
第八节	产后小便频数时忽寒战	(55)

第九节	产后恶露停络	(56)
第十节	产后小便出屎	(56)
第十一节	产后拘挛	(57)
第十二节	产后浑身麻痛	(58)
第十三节	产后乳少	(59)
第十四节	产后三症	(59)

第八章 妇人三十六疾 (61)

第一节	十二癓	(61)
第二节	九 痛	(61)
第三节	七 害	(61)
第四节	五 伤	(62)
第五节	三 瘴	(62)

第九章 論妇人乳病 (64)

第一节	乳房肿痛	(64)
第二节	乳 瘤	(65)
第三节	乳 疣	(65)

第十章 妇人杂症 (67)

第一节	瘰 瘤	(67)
第二节	肝 瘊	(68)
第三节	阴 挺	(69)
第四节	肠 痞	(70)
第五节	妇人阴中生疮	(70)
第六节	妇女小戶嫁痛	(71)
第七节	如女干血勞	(72)
第八节	脏躁悲伤	(72)

第九节 呃 逆.....	(73)
第十节 怒气伤肝.....	(73)
第十一节 湿热脚气.....	(74)
第十二节 阳气下陷症.....	(75)
第十三节 避孕.....	(76)

妇科挈要补注

論女子天癸

《素问·天真论》说：“女子七岁，肾气盛，齿更发长；二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子”。在女子一生发育过程中，十四岁左右月经始潮，二十岁左右发育成熟，三十岁左右体力充沛，四十岁左右开始衰退，五十岁左右月经闭止，任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。后人每以天癸混解为月经，其实经文既称天癸至，又有月事以时下，说明天癸、月经是两种物质，且男子亦有天癸。经云：“男子八岁，肾气实，发长齿更，二八肾气盛，天癸至，精气溢泻，阴阳和，故能有子”。从女子天癸阴精至，任脉通，太冲脉精血充盈，月事以时下，故有子。男子天癸阳精至，精气溢泻，两神相搏，合而成形。如此，男女天癸为生育主要之物质，是以阴阳和平，男女媾精，则有子。若阴阳乖舛，既莫能有子，则易生病。然女子善怀，郁则诸病发生也。女子冲任二脉，寒邪所伤，少腹掣痛，经水不匀，令阴恶寒，或牵引腰脊，诸症蠢起，千变万端。妇人三十六疾，皆因肝郁而生，按四诊、八纲，辨明寒热、虚实，临床诊断确当，行其针药，必然治危得安矣。

第一章 月經病

女子阴类也，以血为主，其经血上应太阴，下应潮海，然月有盈亏，潮有朝夕，月经三旬一至，与之相符，故谓之月信也。一月一行，其常也，一月数行，其病也，有两月行者为并月，有三、四月行者为居经，有一年行者为避年，或一生不行经而生育者为暗经，此所禀不同，亦非病也，故不需治。

此外，在女子有五种先天性缺陷，叫五不女，即螺、纹、鼓、角、脉。骨如环不开的叫螺；阴窍屈曲象螺纹盘旋的叫纹；阴户如有皮如鼓，仅有小窍通溺的叫鼓；阴中有物挺出，状如阳物，称雌雄人的叫角；终身不行经，不受孕的叫脉，这五种女子沒有生育本能，不能治。

第一节 調 經

病症：一切营血虚滞，经水不调，脐腹作痛，及崩中漏下，癰癧块痛等。

病因：柯韻伯曰：“心生血，肝藏血，脾统血，凡生血者则求之于心，调血者当究之于肝”。妇女冲任二脉皆起于胞内，然冲为血海，任主胞胎，冲任的盛衰，都能造成妇女经、带、胎、产的病症，且冲任与肝脾相关，大凡情志抑郁，劳躁著邪，心肝脾三经受伤，皆可致月经失调、崩带等病。

脈象：浮、沉、迟、数、滑、滯、牢、芤。

治法：补血、活血、和血、调经，以四物湯治之。四物具生长收藏之功用，益营卫，滋气血，入心肝脾三经。四味分阴阳，助血之动者为阳，能调血中之气，有归、芎主之；统血之静者为阴，能养五脏之阴，有地、芍主之。

方歌：四物地芍与归芎，血家百病此方通，妇女月经不调病，临时加减变化灵。

方剂：当 归三錢 川 芎二錢 白 芍二錢 生 地三錢
水煎、溫服。

方解：当归(酒洗)味辛苦，性甘温，为血中之气药，养血、活血、润燥、去瘀生新。欲上行而止血用归头，欲养血而守中用归身，欲破血而行下用归尾，欲活血而统治气血昏乱用全归，可引血各归所归。如欲去其滑性，以土炒之。地黄味甘性寒，主伤中逐，血痺。能清心火之烦热，止肺金之逆热，除肝木之血热，泻脾土之湿热。干者性缓，养阴清热。熟者甘微温，良者九制，能滋阴补肾，且不滞腻，若制不到则腻膈，故配伍多用砂仁和。白芍气味苦平，主邪气腹痛，通经脉，能调血中之气，除血痺，破坚积，利小便。酒炒入气分而行血，醋炒入血分而解郁，欲活血行瘀用赤芍。川芎味辛性温，治中风入脑，寒痺筋挛，血闭不孕，上行头角，引清阳之气而止痛，下行血海养新生之血以调经。

辨证加减：春脉弦，头痛，倍川芎；夏脉洪滑，肚疼，倍芍药；秋脉涩，血虚，倍地黄；冬脉沉，寒不食欲，倍当归。

若祛寒则加温燥药：萸芋(盐炒)、肉桂、附子、干姜。萸芋疏肝燥脾，温中下气，脾胃湿寒，呕吐泄泻，用盐炒可引入肾经，助水以生肝木；肉桂暖下焦，温腰肾，引火归元；熟附子回阳救厥逆，阴寒泄泻，生用行皮肤，驱风散寒；干姜暖胃除寒，若炮则补脾胃，暖下焦，止泄泻。

若清热则加温凉药：黄芩、黄连、梔子三味俱苦寒，用时恐

过寒而凝血，所以多用酒、姜制。酒芩行气血分，泻肝肺经之实热；酒连清心肝脾经之郁热，姜制能和肝胃湿热，止吐痢；梔子清三焦之郁热。

欲补虚加助阳滋阴药：山芋、丹皮。山芋酸温，补腰肾，壮元阳；丹皮泻血中之伏火，滋阴而和血。

欲调和气血则加舒气行血药：如香附、烏药。香附醋制入肝经走血分，疏气开郁活血，酒制入气分，舒气行血，童便制入下焦，治下元虚寒气痛，香附炭去瘀生新止血，单用七制，四制香附丸，调经止痛；烏药理气散寒，舒郁除痛。

欲逐瘀则加行血药，如桃仁、红花、元胡。桃仁破血行瘀；红花去瘀生新；元胡活血导滞，理气止痛。

如经水先期，一般认为属热，以脉象虚弦鑑別。虚则营血虚，弦则卫气躁。若先期量多而色鲜红，无血块，由于阳气躁，阴血热所致，四物加知母、黄柏、黄芩、地骨皮、芥穗，抑阳润躁，养阴为是。

若先期量少而色淡红，由于血虚，湿热渗入血分所致，四物加芥穗、木通，养血、利水、化湿为是。

若经水后期量少，少腹墜痛有块，乃寒湿结滞，气血抑郁，四物去地黃，加香附、干姜、烏药，以舒郁行气血，散寒湿为是。

如大便下血，乃怒气伤肝，气不摄血。若先便血后粪为近血，本方加黑芥穗、黑地榆、杜仲炭、椿根皮。若先便粪后血为远血，本方加入参、熟地炭、炒槐实、枳实。

如脾胃损伤，失血过多，本方加入参、白朮、茯苓、炙草，名八珍湯，助脾气，补阴血为宜。

此方乃肝经调血之专剂，非心经生血之主方。四物具生长收藏之作用，故荣气血，安行经隧。

· 若血虛加参、芪；血结加桃、红；血寒加桂、附；血热加

芩、连。

欲行血白芍換赤芍，熟地換生地，欲活血去地黃，欲止血去川芎。

随便加減，則不拘于四物矣。如遇血崩，脫血昏暈，四物不能驟補，恐助滑脫，當補氣生血，助陽生陰長之功用，故調經者，舍四物不能為功，此柯韻伯深明四物湯之長也。

按語：武之望載《濟阴綱目》，配合百卌方，本人以臨床經驗運用的數條，簡單加減之。

第二节 經候不調

病症：虛勞失血，月經不守，或五心煩熱，食少體倦。

病因：勞傷氣血，脾胃虛弱。

脈象：浮革、沉牢。

治法：助陽補氣、養血調經，以十全大補湯治之。

方歌：補氣補血用八珍，氣血雙療功獨崇，再加黃芪與肉桂，十全大補方雄。

方劑：黃芪三錢 肉桂一錢
川芎錢半 酒白芍二錢 人參二錢 白朮二錢
茯苓二錢 炙甘草二錢 大熟地三錢

方解：黃芪補氣固胃；白朮除濕扶脾陽；甘草和中扶脾，使陰陽調和；人參又能鼓肺脾之氣；茯苓能消肺脾之濕熱；地黃滋陰補腎，隨肉桂興奮真陽；當歸、白芍、川芎，養血調經。

按語：薛立齋曰：“氣血兩虛，變生諸症，但用此湯以補氣血，便能旋轉造化之機，諸症悉退，氣可召而至，血易亏而難生，苟不以求其血脉之主而養之，則營氣終歸不足，所以倍黃芪、人參為君，而佐茯苓以入心，以安神定志，使甘溫之品，始得化而為血以養身，然心苦緩必得，白芍之酸以收欽神明，使

营行脉中，流于五脏，名之曰大补，而收效者，有如此矣。”

第三节 經水不勻

病症：妇人多因七情所伤，致使血衰气盛，经水不调，或遵前，或错后，或多或少，或色淡，或紫块，或崩漏带下，肚胀疼痛，子宫虚寒不孕。

病因：劳伤气血，冲任虚损，月经淋沥不断，以及妊娠胎气不固，或劳损坠胎。

脈象：沉弦缓，或牢。

治法：以理气养血，调经种玉湯治之。

方歌：调经四物吳茱芋，香附丹苓延广皮，經前加上芩知柏，錯后桂姜熟艾宜。

方剂：当归三錢 川芎二錢 白芍二錢
熟地三錢 吳茱芋一錢半 香附一錢半 丹皮二錢
延胡索一錢半 茯苓三錢 陈皮二錢。水煎服。

方解：吳芋味辛性溫，入肝腎脾胃四經，溫中散寒濕，止嘔吐吞酸，头痛泄泻，脘腹脹痛，寒疝脚氣。香附味辛苦性平，入三焦肝經，理氣解郁，調經止痛，胸腹脹痛，胃脘兩脇痛，盐炒則入血分，醋炒則解肝郁，酒炒則行經絡，姜汁炒則化痰飲，炒黑則止血，血虛及火甚勿用。丹皮味辛苦微寒，入心肝腎三經，清血中之伏熱，散瘀血、吐血、便血、勞熱骨蒸、經閉癰瘕、腸痈瘍瘍。茯苓味淡平，入心脾肺腎四經，主胸膈逆氣，憂恚驚邪，恐悸，心下痛，寒熱煩滿，安神魂，定惊悸，滲濕利尿。延胡索味辛苦，性溫，入肺肝脾三經，活血散瘀，利氣止痛，月經不調，崩中淋瀉，癰瘕結塊，胸腹諸痛。陳皮味辛性溫，入肺肝胃脾四經，調氣消食化痰，肝胃脹痛，嘔吐恶心，破結，止嘔吐咳嗽。

按語：如月經前期行本方加酒芩、炒黃柏，化肝腎之郁熱。