

傷寒真方歌括

傷歌

括寒

真

方

光緒癸卯冬月  
湖南書局校刊

傷寒真方歌括目錄

閩長樂陳念祖修園著

東治林壽萱校

卷一

太陽上篇方法

太陽中篇方法

計歌括拾壹條

計歌括玖條

太陽下篇方法

太陽救誤變症方法

計歌括叁條

計歌括拾捌條

卷二

陽明上篇方法

陽明中篇方法

計歌括拾條

計歌括肆條

傷寒真方歌括目錄

陽明下篇方法

計歌括叁條

卷三

少陽上篇方法

少陽中篇方法

計歌括陸條

計歌括叁條

少陽下篇方法

計歌括壹條

卷四

太陰全篇方法

計歌括貳條

卷五

少陰全篇方法

計歌括陸條

卷六

厥陰全篇方

陰陽易差後勞復病方法

計歌括伍條

計歌伍條

未附魏念庭先生跋語



傷寒真方歌括卷一

閩長樂陳念祖修園著

洽南林壽萱校

太陽上篇方法

太陽為寒水之經。主一身之膚表。邪之初傷。必自太陽經始。論云。太陽為病。脈浮。頭項強痛。惡寒。統傷寒中風而言也。傷寒詳見中篇

茲請先別中風之病。論云。太陽病發熱。汗出惡風。脈浮緩。或見鼻鳴。

乾嘔者。為中風病。主以桂枝湯。服湯啜粥。得漿漿微似汗。則愈。若服

桂枝湯。大汗出不解。所以然者。以風邪得微汗。則除。得大汗。反不除。

病不去。則變浮緩之脈。而為洪大。仍用桂枝湯。取微似汗。則愈。倘若

不愈。則病如瘧狀。日再發。邪淺欲散宜桂枝二麻黃一湯。撤其餘邪。則全



愈矣。○前症是汗後餘邪未盡，以小劑爲緩汗法。此症是過經不解，不可不汗，故制此湯以急汗之。不可大汗，故制小劑以小汗之。人知大劑急汗之法，而不知小劑亦有急汗之法也。○若太陽病得之八九日，頭痛項強，雖日久而未去，熱多寒少，往來如瘧而頻發。本論云三度發。是邪淺而欲衰，面上反有熱色，身癢必得少汗而全愈。宜桂枝麻黃各半湯主之。○桂枝症而兼喘者，宜桂枝加厚朴杏仁湯主之。○若燒針針處核起，因驚而發奔豚者，宜灸其核，以桂枝加桂湯主之。○若奔豚症欲作未作，其悸只在臍下者，宜茯苓桂枝甘草大棗湯主之。○若悸在心下，又手冒心者，因發汗過多所致，宜桂枝甘草湯主之。○若候汗遂漏不止，惡風，小便難，四肢拘急者，宜桂枝加附

子湯主之。○若桂枝症誤下之後胸滿者是陰邪盛于陽位恐芍藥  
附和陰氣宜桂枝去芍藥湯急散之。若兼惡寒者恐薑桂力微宜桂  
枝去芍藥加附子湯以溫散之。○若汗後陽虛陰氣凝聚身痛者以  
桂枝新加湯行其陽氣。○又有太陽傳入本腑症發熱六七日不解  
煩渴飲水水入即吐小便不利者宜五苓散表裏兩解之。又有太陽  
裏症而表邪具在下後心下滿小便不利者宜桂枝去桂加茯苓白  
朮湯利水則表邪自化。此皆太陽症虛邪之方法也。

### 桂枝湯

發熱自汗是傷風桂葛生薑芍藥逢頭痛項強浮緩脈必須稀粥合  
成功

芍藥桂枝生薑各三錢 炙草三錢 大棗四枚 水煎溫服須臾啜稀粥

溫覆取微似汗。○此方最切於時用。申風汗自出者用之。服麻黃湯復煩者用之。下後脈仍浮者用之。氣沖利不止者用之。陰症脈浮為欲愈亦用之。

桂草辛甘化陽助太陽融會肌氣芍草苦甘養陰啟少陰奠安營血。薑佐桂枝行陽。棗佐芍藥行陰。此方本不發汗。藉熱粥之力充胃氣以達於肺。令風邪從皮毛而解。不傷氣血為諸方之冠。

時醫以桂枝湯麻黃湯。地非北方時非冬月。戒不敢用。以羌獨蒼芎荊防代之。而不知此等藥更燥烈。害人也。桂枝湯以桂枝為君。色赤入心生血。得芍藥之苦以和之。為陰陽調和之劑。麻黃湯以

麻黃爲君比物輕清走表絕無辛烈之味悍澀之氣又佐之桂枝  
人心化液杏仁入肺降氣甘草安內攘外不加薑之上行爽之留  
中逕走肌表不傷津液觀蒼芎羌獨之類孰和平孰峻烈耶

桂枝二麻黃一湯

汗出不徹邪還襲如瘧頻來時翕翕桂枝湯二麻黃表後脈洪籍  
此輯。

桂枝 一錢三分  
芍藥 生薑 各一錢  
炙草 七分  
麻黃 七分  
杏仁 十六箇

大棗 一枚  
先煮麻黃去沫後入諸藥溫服○此是麻黃症只用桂枝

湯汗不徹之故故又作此湯再解其肌微解其表此又桂枝後更用

麻黃法也○按柯韻伯云麻黃湯桂枝湯兩方各煎聽用加各半湯

則各取其半而合服之。此湯則取桂枝湯二分麻黃湯一分合而服之。猶水陸之師各有節制。兩軍相爲表裏。異道夾攻之義也。後人等其分兩合爲一方。與葛根青龍輩何異。

桂枝麻黃各半湯

面熱身癢。感雖輕。小汗輕施。顧衛營。麻杏桂薑芍棗草減之各半定方名。

桂枝

一錢二分

芍藥 生薑 炙甘草 麻黃 各八分 杏仁

七枚

大棗

二枚半

先煎麻黃去沫。入諸藥煎溫服。○此方原小劑治欲退之餘邪。活人借用之以代解肌諸方。

桂枝加厚朴杏仁湯

桂枝厚朴杏仁湯諸喘皆須疎利方誤下喘成還用此去邪下氣本相當。

即桂枝湯加厚朴各一錢五分杏仁十四枚○論云喘家作桂枝湯加厚

朴杏仁主之言本然之喘也又云太陽症下之微喘者表未解也此湯主之言誤下之喘也。

桂枝加附子湯 照桂枝湯加附各一錢

桂枝加桂湯 照桂枝湯加桂二錢

太陽誤下遂拘急湯本桂枝加附入更有核起作奔豚桂枝加桂湯宜察名遂漏症乃汗多脫液陽虛之候此方固陽即所以止汗止汗即所以救液此桂枝加附子湯歌也。

○又加桂枝者取味重則能達下也。○此桂枝加桂湯歌也。

茯苓桂枝甘草大棗湯。

欲作奔豚臍下悸。八錢茯苓。桂枝四二甘。四棗水。甘瀾直伐腎邪安。

丙志

茯苓八錢。桂枝四錢。甘草二錢。大棗四枚。取水揚三五百遍。名甘瀾。

水用甘瀾水三杯。先煮茯苓至二杯。入諸藥。煮七分。溫服。○此方安腎以鎮水。使水不凌心。補脾以制水。使水不泛溢。

桂枝甘草湯

又手扪心因過汗。心下悸動欲得按。桂枝炙。草合辛甘。斂液安心固。

附錄

桂枝二錢。甘草二錢。水煎服。○辛從甘化陽中有陰。故能補陽以止。

汗生心液而定悸

桂枝去芍藥湯○卽桂枝湯去芍藥○誤下後胸滿是陰邪盛於陽位用此湯急散之不用芍藥者恐其寒性下行領陰邪入於腹中而爲腹滿等症也○桂枝去芍藥加附子湯○卽前方加附子一錢○惡寒爲陰氣凝聚恐薑桂力薄故加附子○按此卽下篇桂枝附子湯方也但分兩不同主治遂別而方名亦因以異耳

桂枝去芍因胸滿脈促令平舒上腕若稍惡寒而內弱速加附子不容緩

按喻嘉言謂陽邪盛於陽位故胸滿脈促不知陽邪胸滿多兼喘



汗等症已有葛根黃芩黃連湯法今但云胸滿是陰氣凝聚減去  
芍藥意在急散若微惡寒者又加附子以助薑桂之力其汲汲於  
扶陽可見若果陽盛則桂枝不堪入咽况更加助陽之附子乎卽  
云脈促爲陽不知陽盛於上則促陰盛於內逼陽於外亦促也或  
問桂枝人參湯症與此何別曰風爲陽邪邪傷於外不曉解散而  
數下之則病之熱邪盡陷於下焦藥之寒性反留於心下焦斯爲  
協熱之利不止寒留心下斯爲陰盛之心下痞故以理中湯理其  
中氣氣以升陽降陰如兵法擊其中而首尾應也若此症中下二焦  
無症則只宣上焦之陽則撥雲見日不必多所審顧也

桂枝加芍藥生薑人參新加湯