

庫 文 華 中

集一第育教衆民

品 藥 用 常

編 成 汝 華



行 印 局 書 華 中

常用藥品

目次

第一章 內科病的藥	一
一 傷風咳嗽	二
二 胃腸病	三
三 心臟衰弱	四
四 發痧	五
五 貧血	六
六 痧子	七
和瘧疾	七
蛔蟲	七
第二章 口腔和咽喉病的藥	一一
一 齒齦腫	一二
二 喉痛和蛾脹	一二
第三章 眼科病的藥	一二
第四章 外科病的藥	一三
一 皮膚病	一四
二 創傷和火傷	一五
三 凍瘡	一六
四 癰	一七
五 肌肉痠痛	一八
六 蟲咬	一九
第五章 中毒的藥	一九
第六章 常用的消毒藥	二一
第七章 常用的維他命	二二
第八章 藥品的處理	二三
(附) 常用的藥品表	二三

常用藥品

第一章 內科病的藥

一 傷風咳嗽

傷風咳嗽在醫學上叫做感冒，是最普通的病。輕的傷風，只是鼻塞、流鼻涕、打嚏、微咳、多少有些頭痛。這種輕傷風，是因為受了一些寒，或者身上出汗的時候，吹着一些風而發生的。只要服些發散藥，出一些汗就會好的。現在把中西兩種發散藥記在下面：

中藥方：有下列二方，可選服一方。

- (一)薄荷三錢(後入) 白芷一錢 甘草五分 水煎服。(鼻塞重可服)
- (二)紫蘇一錢五分 薄荷一錢五分(後入) 桔梗一錢 甘草五分(微咳可服)

西藥方：

- (一)阿斯匹靈〇·五公分 頓服，每天一兩回(食後服)。發汗。
- (二)亞士北羅〇·五公分 頓服，每天一兩回(食後服)。發汗。
- 西藥治鼻塞的，有舒而通，可滴入鼻中。(新亞藥廠出品)

傷風咳嗽厲害的，普通叫做重傷風，中醫稱為風溫。要發熱、頭痛、咳嗽、喉頭還有些腫痛。要服發汗、退熱、止咳、消炎等藥。

中藥方：

(一) 桔梗一錢 甘草一錢 薄荷頭一錢五分(後入) 前胡二錢 水煎服。

(二) 桔梗一錢 甘草一錢 苦杏仁三錢(去皮尖) 紫苑二錢(炒) 象貝母三錢 水煎服。

西藥方：

(一) 亞士北羅〇·五公分 每天一兩回 解熱、發汗。

(二) 百欵定 每回二片，每天一兩回 去痰、鎮欵。(新亞出品)

(三) 消治龍 仙法龍 注射，每回三至五立方厘米。殺菌、消炎。(信誼新亞出品)

(四) 地亞淨 內服，每回一片，每天兩片。殺菌、消炎。

重傷風有病菌的關係，所以最好注射消治龍等殺菌、消炎的藥。

重傷風熱退而咳嗽不好，或痰很多，可服止咳、化痰的藥。西藥可服百欵定、四季糖。中藥可服杏仁三錢、甘草一錢、象貝母三錢、製半夏三錢等。又如小便很少，可加服中藥車前子三錢(包)。

二 胃腸病

胃腸病的種類很多，所用的藥也不一樣，現在把最普通的胃腸病和常用的藥，分述如下：

一 胃炎 因吃東西不小心，以致胃部發炎。病狀是胃痛、噯氣、惡心、嘔吐、舌苔很厚膩、便秘、尿少。往往要發熱。

中藥方：

(一) 薄荷一錢五分 煨石決明三錢(研末) 薄橘紅一錢 炒麥芽三錢 水煎服。助消化，治噯氣。

(二) 製半夏三錢 白茯苓三錢 生姜兩片 水煎服。治惡心、嘔吐。

(三) 炒白朮一錢 黃柏五分 薄橘紅一錢 炒麥芽五錢 萊服子三錢 煨牡蠣粉三錢 水煎服。健胃、助消化。

西藥方：

(一) 小蘇打一·五公分 苦味酞二·〇公分 糖漿一〇·〇公分 混和為一日量，三回分服。

(二) 安胃鋁省 每回二—三〇公分，水調服，一天三回。(新亞出品)

(三) 寶青春或食母生 每回三片至六片，一天數回，食後服，助消化。(新亞、信誼出品)

(四)人丹或神丹 每回五六粒，一天數回。止嘔，助消化。

若是因吃東西太多，有食積而引起胃炎，要先服瀉藥，或灌腸。

二 嘔吐 因胃炎或其他原因而嘔吐不止，可服下記的藥：

中藥方：

(一)製半夏三錢 茯神三錢 生姜三片 煎湯服。

(二)熟附片一錢 製半夏三錢 杏仁三錢 薄荷一錢五分 水煎服。

西藥方：

硫酸鈉五·〇公分 芳香酊三·〇公分 糖漿一五·〇公分 水一八五·〇公分 每小時一茶

匙。

三 腸炎 因食物不衛生，或下腹部受冷而發生。病狀是腹痛、鼓腹、雷鳴、泄

瀉、口渴、尿少。

中藥方：

(一)枳殼導滯丸三錢 水煎，去渣服。

(二)川黃柏三錢 薤白頭三錢 熟附片一錢 厚朴一錢 廣木香一錢 煨肉果一錢 乾

姜五分 水煎服。

(三)炒白朮三錢 枳實一錢五分(炒) 製半夏三錢 薄橘紅一錢 廣木香一錢 建麴三錢

(炒)

大麥芽三錢(炒) 焦查炭三錢 水煎服。

西藥方：

(一)消困定 每回一至二片，每天一、二回 消炎。(丙康藥廠出品)

(二)矽炭銀 每回二片至四片，一天三回。消炎、吸着。

四 便秘 有些人平時大便秘是不爽快，或要隔多少天數纔大便一次，這是一種習慣性的便秘，現在把常用的藥記在下面：

中藥方：

(一)半硫丸 一錢至二錢 頓服。輕瀉。

(二)芒硝三錢 沖服。

西藥方：

(一)加斯加拉流膏三·〇立方厘米 水一〇〇·〇立方厘米 一日量，三回分服。

(二)加斯加拉丸 每回一至三粒，一日三回。

(三)一栗通 每回一片至二片，頓服。(新亞出品)

(三)安樂瀉片 早午各服一片，或臨臥時服一至二片。

一時的便秘，可服下藥：

中藥方：

(一)大黃五分 煎服。

(二)大黃三分 芒硝一錢 煎服。

西藥方：

(一)蓖麻油一匙 冲服。

(二)硫苦(即硫酸鎂)五公分 頓服。

(三)果子鹽五公分 頓服。

五腹瀉 因受寒或飲食不小心而發生。輕症肚子不痛，也不發熱。重症要肚子痛、惡心、發熱。假使有食積，可先服瀉藥：

中藥方：

(一)大黃三分 水煎服。

(二)芒硝三錢 水煎服。

西藥方：

(一)蓖麻油一食匙 冲服。

(二)硫苦五公分 冲服。

在服瀉藥後，可服腸消毒和消炎藥：

中藥方：

(一)川黃柏三錢 薤白頭三錢 厚朴一錢 木香一錢 乾姜五分 水煎服。

(二)炒白朮三錢 枳實一錢五分(炒) 製半夏三錢 木香一錢 建麴三錢(炒)

大麥芽(三錢炒) 焦查炭三錢 水煎服。治水瀉、惡心。

(三)赤石脂三錢(打碎) 車前子三錢 水煎服。治久瀉。

西藥方：

(一)砒炭銀 每回二片至四片，一日三回。腸消毒、消炎。(民生藥廠出品)

(二)消困定 每回一片，一日二回。腸消毒消炎。(丙康藥廠出品)

(三)次硝酸鉍(次硝苔三·〇至四·〇 水一八〇·〇 糖漿二〇·〇 每回一食匙，一日

數回止瀉，消炎。

(四)十滴水(雅片酊) 治水瀉。

三 心臟衰弱

過於勞動或身體虛弱，心臟就要衰弱。症狀是面色灰白、四肢發冷、呼吸短促、脈搏細弱。常用的藥如下：

中藥方：

(一)六神丸 每回五至六粒，每日二回，食後服。強心。(雷允上出品)

(二) 吉林參一錢 煨牡蠣粉二錢(包) 水煎服。強心。

西藥方：

(一) 康福那新(樟腦製劑) 注射，每回二立方厘米。強心。(新亞出品)
(二) 可拉明 每次十滴至二十滴，一日二、三回。強心。

四 發痧

夏天受熱，血行起障礙，就要四肢發冷、面色灰白、惡心、頭眩、呼吸短促、脈搏細弱。這種情形俗稱發痧，或叫做中暑，其實就是血行障礙。治療方法和心臟衰弱差不多。內服的藥如下：

中藥方：

(一) 痧藥(蟾酥丸) 每回五、六粒，一天二回。強心。(雷允上出品)
(二) 行軍散 噴入鼻孔使打噴嚏。興奮神經。
(三) 六神丸 每回五、六粒，一天二回。強心。(雷允上出品)
(四) 人丹或神丹 每回六、七粒，一天二回。助消化，止惡心。

西藥方：

(一) 康福那新 注射，每回二立方厘米。

(二)可拉明 每回十滴至二十滴，一天兩三回。

五 貧血

身體衰弱，營養不良的人，往往面色灰白，毫無血色，這種病症叫做貧血。貧血的人，要服補血藥，現在把常用的藥記述如下：

中藥方：

黃芪三錢(炙) 肉桂三分 吉林參一錢 白朮一錢五分 生地黃五錢 水煎服。

西藥方：

(一)維他可 每回一至二茶匙，一日三回，沖入牛奶內服。(新亞出品)

(二)力弗肝 注射(信誼出品)

六 痧子和瘧疾

痧子一稱麻疹，是小孩最易發生的傳染病。內服的藥如下：

中藥方：

(一)薄荷頭一錢五分(後入) 荊芥穗 桔梗 前胡各一錢 牛蒡子 西河柳 鮮茅根
各三錢(去心) 甘草五分 (發疹期) 水煎服。使痧子透出。

(二) 生地黃 金銀花各三錢 連翹二錢 牛蒡子 元參各三錢 桔梗一錢 杏仁 象貝母各三錢 (落屑期) 水煎服。解毒，止咳。

西藥方 無特效的藥

瘡疾的種類不一，普通的瘡疾，可服下記的藥：

中藥方

銀柴胡一錢 姜製半夏三錢 炒常山 炒淡芩各一錢五分 花檳榔二錢 生姜三片 水

煎服。

西藥方

(一) 金雞納霜一〇 發作前頓服。

(二) 撲瘡母星〇・〇七 每日三回。(隔日瘡及四日熱)

七 蛔蟲

小孩因不講清潔或吃連皮的果實，往往有蛔蟲的寄生。可服下列的藥。

中藥方：

(一) 使君子三錢(打) 煎服或炒食。

(二) 鷓鴣菜一錢五分 大黃三分 甘草一錢 水煎服。

(三)鮮大蒜頭 每天一二顆，搗爛，分數回吃。

西藥方：

(一)滅疳甯(服後須服瀉藥——草麻油一食匙頓服)。

(二)珊篤甯 同前。

又有一種寶塔糖也可以服用，但是服後也要吃瀉藥，把蛔蟲排出。

第二章 口腔和咽喉病的藥

一 齒齦腫

牙肉紅腫而疼痛，叫做齒齦腫。這是因為疲勞或受熱、齧齒而發生的。常用的藥品如下：

中藥方：

(一)紫雪 外搽。

(二)天冬 麥冬 元參 各等分爲末，和蜜做丸藥，如彈子大，每回含一粒。

(三)桔梗一錢 甘草二錢 元參三錢 白菊花三錢 薄荷一錢五分(後入) 水煎服。

(四)冰硼散 外搽。

西藥方：

(一) 碘酊 外塗。

(二) 硼酸五·〇 水二〇〇·〇 含嗽。

二 喉痛和蛾脹

喉痛和蛾脹，是因疲勞或受熱而發生的。可用下列的藥品：

中藥方：

(一) 桔梗一錢 甘草二錢 元參三錢 牛蒡子三錢 薄荷頭一錢五分(後入) 煎服。

(二) 冰硼散 吹入。

西藥方：

(一) 硼酸五·〇 水二〇〇·〇 含嗽。

(二) 金嗓子 每回含一片，每天兩回。(中西藥房出品)

第三章 眼科病的藥

眼科的病，最普通的是紅眼。症狀是眼皮裏面和眼白上都發紅，很刺痛、怕光，在醫學上叫做結膜炎。常用的藥品是：

中藥方

(一) 明礬水 洗滌。

(二) 淡鹽水 洗滌。

西藥方：

(一) 硼酸水 洗滌。

(二) 硫酸鋅 滴入眼內。

(三) 沃古林 點眼。(科發出品)

第四章 外科病的藥

一 皮膚病

皮膚病的種類很多，現在把比較普通的幾種，及常用的藥，分述如下：

(一) 溼疹

小孩的皮肤上，往往發生一種紅色的疹子，有綠豆那樣大小，很痒，逐漸變成水泡或化膿，這叫做溼疹。常用的藥如下：

中藥方 無特效藥

西藥方 塗敷下列的藥，不可用水洗滌。

(一) 鋅白軟膏 塗敷。

(二)柳酸軟膏 塗敷。

(三)綠藥膏 塗敷(新亞出品)。

(四)硼酸軟膏 塗敷。

(二) 癬

中藥方 用乾姜擦，塗油。

西藥方：

(一)柳酸軟膏 塗敷

(二)硼酸軟膏 塗敷。

(三) 疥瘡

疥瘡一稱疥癬，是鄉間傳染最厲害的一種皮膚病。常用的藥如下：

中藥方：

(一)一掃光 只可用少量，否則要中毒。

(二)硫黃華 用少量塗敷，要多洗浴。

西藥方：

(一)滅疥 塗敷，要注意分量，不可過多。

(二)硫黃軟膏 塗敷，量不可多。

(四) 脚癬

脚癬一稱香港脚，就是脚趾間潰爛的病。病因也有微生物的寄生。常用的藥如下：

中藥方 用熟礬塗敷。

西藥方：

(一)阿墨林 滴入趾間。

(二)柳酸軟膏 塗敷。

(三)銨錳氧(即過錳酸鉀)溶液 把脚浸在銨錳氧溶液中五分鐘，每天一次。在浸過後，用硼酸軟膏塗在趾間。

二 創傷和火傷

創傷是皮膚給利器割破，或因跌交而擦破皮膚。這時往往流血，肌肉紅腫。常用的藥如下：

中藥方：

(一)白芨 磨汁，塗敷。止血。

(二)明礬水 止血。