

福建省药品标准

一九七七年版

福建省卫生局

福建省药品标准

一九七七年版

江苏工业学院图书馆
藏书章

福建省卫生局

前 言

为加强药品质量管理工作，促进药品生产，提高药品质量，保证人民用药安全有效，根据卫生部，关于制定地方药品标准的通知精神，我们组织省、地药检所，制药厂等有关单位，对我省原审批的药品标准进行了整理修订，编印成《福建省药品标准》1977年版，作为我省药品生产、供应、使用和检验等部门控制药品质量的依据。过去经我局批准的地方标准规格与本标准有出入者均按此标准执行。

本标准在执行中如有不妥之处，请及时提出意见，以便修正。

福建省卫生局

一九七九年九月

凡 例

1、《福建省药品标准》1977年版,选载我省生产的药品332种,凡属中国药典1977年版、部颁药品标准(1963年)及部颁抗菌素标准(1972年)收载的品种均不再收载。

2、本标准正文收载的各类药品的顺序一律按中文名称笔划次序排列。

3、本标准中所用名词、术语、符号、通则、试药、试液、指示液、当量液、克分子液等,一般均按中国药典1977年版、部颁药品标准(1963年)及部颁抗菌素标准(1972年)的规定。

4、检验方法中所列标准品或对照品,均指卫生部颁发的标准品、对照品,凡卫生部尚未颁发的标准品或对照品系指纯度较高的原料药品(按规定方法测定含量,并按实际含量折算应用)。

5、制剂所用的原料辅料均须符合中国药典1977年版、部颁药品标准(1963年)及本标准的规定;中药制剂处方中原药材需经过炮制者,在药材名称后加括弧注明,未注明者均指生品,部分生用的剧毒药品则药品前另注“生”字。

6、本标准的实施与修改属于福建省卫生局。

目 录

正文

一画

一七〇胃痛水	1
一七〇胃痛片	2

二画

丁香酚	3
十二温经丸	4
十全大补酒	4
十全大补膏	5
十滴水	5
七叶莲片	6
七叶莲酊	7
七味都气丸	7
八宝片仔癍	8
八宝回春丸	8
八宝惊风散	9
九种维生素糖丸	10

三画

三七片	11
三才封髓丸	12
三层茴香丸	12
三黄散	13
三黄膏	13
三磺软膏	14
三磺乳	15
三磷酸腺苷二钠	16
三磷酸腺苷二钠（注射用）	18

下消丸	19
万应甘和茶	19
万应茶饼（药制茶饼）	20
土霉素糖粉	21
大七厘散	22
大补元煎丸	22
大温中丸	23
上清丸	23
女科十珍丸	24
川贝枇杷糖浆	24
小儿止咳糖浆	25
小儿化痰丸	26
小儿回春丸	26
小儿安	27
小儿安片	28
小儿驱蛔灵糖片	30
小儿退热片	31
小儿惊风丸	32
小儿镇惊散（小儿七厘散）	32
小温中丸	33
小膏药	34

四画

五行散	34
五防茶	35
五防茶饼	35
五苓片	36
无味合霉素片	36
不换金正气散	37
牙痛水	37

木香顺气丸	38
止咳冲剂	39
止咳枇杷糖浆	39
止咳糖浆	40
止喘咳糖浆	41
月月红片	42
丹栀逍遥丸（丹栀舒肝丸）	43
丹栀逍遥散	43
风伤止痛膏	44
风油精	45
风湿药酒	45
风湿酒	46
风湿解毒丸	47
风寒感冒冲剂	47
化核膏	48
乌鸡丸	49
“六一”宝塔糖	50
六君子丸	51
六神丸（咽喉丸）	51
六神曲	52
双虎万应茶	52

五画

正气水	53
玉树油	54
平胃丸	54
去氢胆酸片	55
甘和茶	55
甘露	56
田基黄糖浆	57
四时甘和茶	57
四时感冒茶	58
四环素糖粉	59
四制益母丸	59
四物丸	60

四逆散	60
生化丸	61
仙鹤草色素（注射用）	61
仙鹤草色素注射液	62
仙鹤草色素（口服用）	63
仙鹤草色素片	63
仙鹤草色素溶液	64
白油膏	64
归芍六君丸	65
归芍益母丸（益母丸）	65
归肾丸	66
宁血糖浆	66
宁嗽糖浆	67
加减地黄丸	67

六画

百日咳嗽散	68
百部丸	68
亚油酸胶丸	69
地塞米松片	70
老范志万应神曲	71
灰黄霉素药水	71
伤风感冒冲剂	72
伤湿丸	73
全鹿丸	73
竹沥达痰丸	74
多种维生素糖丸	75
多醣蛋白	76
多醣蛋白片	77
当归补血膏	77
当归补血精	78
安胃止痛散	79
安胎丸	79
安痛定注射液	80
妇科白带丸	81

红色拔毒膏·····	81
买麻藤片·····	82
买麻藤冲剂·····	82
买麻藤糖浆·····	83
防风通胜散·····	83

七画

克感敏片·····	84
麦精鱼肝油·····	85
苍芷散·····	86
扶脾散·····	87
抗热牛黄丸（I号）·····	87
肝平片·····	88
肝乐片·····	88
补中益气丸·····	89
补血药·····	90
补肾丸·····	91
补脑汁·····	91
还少丸（还少丹）·····	93
还原固精丸·····	93
驱风油·····	94
驱虫净糖浆·····	94

八画

玫瑰茄冲剂·····	95
非那根止咳糖浆·····	96
武夷清源茶饼·····	97
枇杷止咳糖浆·····	98
拔毒膏·····	98
虎骨木瓜酒·····	99
明目丸·····	99
明目羊肝丸·····	100
固本丸·····	100
周公百岁酒（养血健身酒）·····	101
肥儿散·····	102

肿节风注射液·····	102
败毒散·····	103
鱼腥草注射液·····	103
乳白鱼肝油·····	104
金锁固精丸·····	105
金箍散·····	106
金霉素糖粉·····	106
空心胶囊·····	107
泻痢灵片·····	108
泻痢灵胶囊·····	108
建曲·····	109
参贝陈皮·····	109
参麦六味丸·····	110
参茸卫生丸·····	110
参茸丸·····	111
参桂乌梅丸·····	112

九画

珍珠牛黄散·····	112
封髓丸·····	113
枯痔丁·····	113
枳实消痞丸·····	114
茵胆平肝胶囊·····	115
茯苓丸·····	115
咳可宁·····	116
咳必清糖浆·····	117
咳定糖浆·····	118
咳喘片·····	118
咳嗽枇杷糖浆·····	119
胃可必舒·····	119
胃乐散·····	120
胃得乐片·····	121
胃散·····	122
胃痛粉·····	123
胃膜素·····	124

胆黄素胶囊·····	125
胆酸钠·····	125
胆酸钠片·····	126
脉安冲剂·····	127
顺气消食化痰丸·····	127
香砂平胃丸·····	128
香砂枳术丸·····	128
香砂理中丸·····	128
香莲建曲·····	129
信宁咳·····	130
食母生片·····	131
钙素母片·····	131
急慢惊风丸·····	132
复方五味子糖浆·····	133
复方扑热息痛片·····	134
复方玫瑰茄冲剂·····	135
复方枇杷糖浆·····	136
复方炎得平片·····	136
复方咳必清糖浆·····	137
复方虾须藤冲剂·····	138
复方虾须藤糖浆·····	138
复方首乌糖浆·····	139
复方盐酸黄连素软膏·····	139
复方氯仿酊·····	141
复方满山白冲剂·····	141
复方满山白糖浆·····	142
复合维生素B溶液·····	142
秋水健脾散·····	143
泉州百草曲·····	144
泉州茶饼·····	145
冠心舒·····	146
疮科蛤蟆丸·····	147
神砂·····	148
祛风胜湿酒·····	148
养荣丸·····	149

十画

琥珀惊风散·····	149
桔核丸·····	150
桂附理中丸·····	151
桃花散·····	151
盐酸三氟拉嗪片·····	152
盐酸吗啉胍眼药水·····	152
盐酸黄连素眼药水·····	153
盐薄荷·····	154
莲花峰茶丸·····	155
柴芍六君丸·····	155
胱氨酸·····	156
胱氨酸片·····	157
健身糖浆·····	158
豹潜丸·····	158
调经止带丸·····	159
调经白带丸·····	159
调经补血丸·····	160
调经补血片·····	161
调经种子丸·····	161
调经理气丸·····	162
益寿宁·····	162
海珠喘息定片·····	164
润字丸·····	165
润肠果子糖片·····	166
润肺止咳冲剂·····	167
消化糖片·····	167
消肿化结膏·····	169
消炎生肌膏（玉红膏）·····	170
消炎软膏·····	170
消炎眼药水·····	171
消疯散·····	172
消积散（肚液散）·····	172

十一画

理中丸·····	174
黄芩素片·····	174
黄连上清丸·····	175
黄升丹（三仙丹）·····	176
黄肿丸·····	176
萆薢分清丸·····	177
蛇伤急救散·····	177
蛇伤解毒片·····	178
婴儿脐风丸·····	179
银花感冒丸·····	179
银花感冒片·····	180
银黄片·····	181
惊风丸·····	181
惊风散·····	182
鹿茸精注射液·····	183
羟基脲·····	184
羟基脲胶囊·····	185
羚翘解毒丸·····	185
羚翘解毒片·····	186
清火栀麦片·····	186
清火栀麦胶囊·····	187
清凉防暑冲剂·····	187
清凉油·····	188
清凉润喉片·····	189
添精补肾膏·····	189
维生素丁葡萄糖·····	190
维生素A胶丸·····	191

十二画

琥珀化痰镇惊丸·····	191
硫酸软骨素·····	192
硫酸软骨素片·····	193
硫酸软骨素注射液·····	194

跌打扭伤粉·····	194
跌打损伤丸·····	195
跌打损伤膏·····	195
喉痛消炎丸·····	196
黑归脾丸·····	197
脾肾双补丸·····	198
氯灭酸（抗炎灵、抗风湿灵）·····	198
氯灭酸片（抗风湿灵片）·····	199
鹅根·····	200
舒肺咳糖浆·····	201
猴枣散·····	202
阑尾消炎灵·····	202
温经白带丸·····	203
滋阴补肾丸·····	203

十三画

楂曲平胃丸·····	204
跳骨片·····	204
腹安冲剂·····	205
腹痛止泻丸（普救丸）·····	206
蜂王浆·····	207
蜂乳胶囊·····	208
蜂乳蜜·····	208
感冒丸·····	209
感冒片·····	210
感冒冲剂·····	210
感冒炎咳灵片（炎咳灵片）·····	211
感冒炎咳灵糖浆（炎咳灵糖浆）·····	211
感冒茶·····	212
感冒解毒丸·····	212
感冒解毒片·····	213
感冒解毒冲剂·····	213
愈咳糖浆·····	214
解毒蕲蛇丸·····	215
解热止痛散·····	216

新方建曲·····	217
满山白糖浆·····	218

十四画

嘉禾散·····	219
鼻眼净·····	219
滴耳油·····	220

十五画

醋酸可的松眼膏·····	221
醋酸地塞米松软膏·····	222
醋酸氢化可的松眼膏·····	223
醋酸维生素E 胶丸·····	224
樟香散·····	224
镇惊散·····	225
盗肝醇·····	226
盗肝醇片·····	227

十六画

磺胺二甲嘧啶合剂·····	227
磺胺嘧啶软膏·····	228
磺胺嘧啶混悬剂（大力克）·····	229
磺胺醋酰钠眼药水·····	230
鸕鸕菜糖浆·····	231

十九画

藿香正气片·····	231
癣药水·····	232

附录

中成药质量检查

丸剂·····	233
---------	-----

散剂·····	234
片剂·····	235
胶囊剂·····	236
冲剂·····	237
煎膏剂·····	237
膏药·····	237
软膏剂·····	238
酒剂·····	238
茶剂·····	238
曲剂·····	239
茶饼·····	239
注射剂·····	239
酏剂·····	239

药品分类索引

原料药·····	240
注射剂·····	240
片剂·····	240
散剂（糖粉）·····	241
丸剂·····	241
胶囊剂（胶丸）·····	243
糖浆剂·····	243
煎膏剂·····	243
酏酒剂·····	243
茶曲剂·····	244
冲剂·····	244
液剂（混悬剂）·····	244
滴眼剂·····	244
软膏剂（眼膏）·····	244
膏药·····	245
其他·····	245

一七〇胃痛水

本品含枸橼酸铋 ($C_6H_7O_7(BiO)$) 应为标示量的95.0—105.0%。

【处方】	颠茄酊	75ml
	复方豆蔻酊	50ml
	大黄酊	30ml
	枸橼酸铋	90g
	乙醇	16ml
	氯仿	7.7ml
	氨水	适量
	苋菜红	适量
	水	适量
	全量	1000ml

【制法】 将枸橼酸铋加二倍量的水研磨成糊状物，在水浴上加热，不断地搅拌，缓缓地加入氨水，使枸橼酸铋全部溶解；另取复方豆蔻酊，颠茄酊、大黄酊混合搅匀，将氯仿渐渐加入酊剂混合液中，摇匀。然后把它加入枸橼酸铋的氨溶液中，再加苋菜红搅拌，过滤，加水成1000ml，拌匀即得。

【性状】 本品为橙红色澄明液体，具氨臭。

【鉴别】 (1) 取本品5ml，通硫化氢气体即发生棕黑色沉淀。此沉淀在热硝酸中溶解，但在氢氧化钠试液，稀盐酸或硫化铵试液中均不溶。

(2) 取本品100ml，加氯仿50ml振摇提取，分取氯仿液，蒸去氯仿，残渣作下列试验：

1) 残渣加碱液数滴，呈黄色。

2) 残渣加发烟硝酸5滴后，在水浴上蒸干，即得黄色残渣，放冷，加醇制氢氧化钾试液2—3滴与氢氧化钾一小块即显深紫堇色。

【含量测定】 精密量取本品2ml，加稀硝酸10ml，加热煮沸至淡红色消褪成为淡黄色，然后加水200ml，加0.1%二甲酚橙指示液数滴，用M/20乙二胺四醋酸二钠液滴定至溶液由红色变黄色，即得（每1ml的M/20乙二胺四醋酸二钠液相当于20.81mg的 $C_6H_7O_7(BiO)$ ）。

【作用与用途】 有制酸止痛，顺气作用，用于胃酸过多所引起的胃痛。

【用法与用量】 常用量 口服 一次4ml，一日三次，饭后服，如剧痛时至多可服8ml。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密闭，在凉处保存。

一 七 〇 胃 痛 片

本品含次硝酸铋以氧化铋 (Bi_2O_3) 计算应为标示量的85.5—99.0%，含碳酸镁以氧化镁 (MgO) 计算应为标示量的39.0—45.0%。

【处方】	次硝酸铋	155g
	颠茄流浸膏	6 g
	大黄粉	12g
	复方豆蔻酊	100ml
	碳酸镁	206g
	淀粉	适量
	硬脂酸镁	适量
	制 成	1000片

【制法】 取颠茄流浸膏、复方豆蔻酊、大黄粉等依次加于碳酸镁中，混匀，然后再加淀粉，次硝酸铋充分混匀，加入适量水湿润，制成颗粒，干燥，压片即得。

【性状】 本品为粉红色片剂。

【鉴别】 (1) 取本品粉末，加稀硫酸即有气泡发生。

(2) 取本品的稀硫酸溶液，加碘化钾试液，有暗棕色沉淀生成，并在过量的碘化钾试液中成黄棕色溶液。

(3) 取本品水溶液，加氢氧化钠试液生成白色沉淀。

【检查】 本品除带有微量花斑外，其它应符合中国药典1977年版附录片剂项下有关的规定。

【含量测定】 **次硝酸铋** 取本品20片，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于本品5片），置100ml量瓶中，加硝酸10ml溶解后，加水稀释至刻度，摇匀，用干燥滤纸滤过，弃去初滤液，精密量取续滤液20ml，加水200ml，加0.1%二甲酚橙指示液数滴，用M/20乙二胺四醋酸二钠液滴定至溶液由红色变黄色，即得（每1ml的M/20乙二胺四醋酸二钠液相当于11.65mg的 Bi_2O_3 ）。

碳酸镁 精密量取上述续滤液10ml，加水40ml，滴加氨试液至溶液微出现浑浊，再滴加稀硝酸，使浑浊恰溶，滴加碘化钾试液，随滴加随不断振摇、直至溶液微显黄色，加热水150ml，加热煮沸，浓缩至约为40ml，微冷，加无水醋酸钠2g，滤过，用水洗涤容器，滤液，洗液合并，加氨试液使遇石蕊试纸变兰，然后再加氨—氯化铵缓

冲液15ml（此时如显浑浊或出现沉淀，须滤过除去沉淀）及1%铬黑T指示剂少许，用M/20乙二胺四醋酸二钠液滴定，即得（每1ml的M/20乙二胺四醋酸二钠液相当于2.016mg的MgO）。


【作用与用途】 有制酸止痛，顺气作用，用于胃酸过多而引起的胃痛。

【用法与用量】 常用量 口服 一次2片，一日三次，饭后服，如剧痛时至多可服4片。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密闭，在干燥处保存。

丁香酚 EUGENOL



本品由丁香油或类似丁香油原料分离制得。

【性状】 本品为无色或淡黄色的液体，有丁香的香气，在空气中或久贮色渐变暗，质渐浓稠。

本品在乙醇、乙醚，氯仿中易溶，在水中微溶；本品一容可溶于70%乙醇二容中。

比重 应为1.064—1.070（中国药典1977年版附录）。

沸程 在250—255°馏出量应在95%以上（中国药典1977年版附录）。

折光率 应为1.540—1.542（中国药典1977年版附录）。

【鉴别】 取本品约0.5ml加乙醇约1ml溶解后，加新配制的5%香草醛盐酸溶液5—10滴，即显绿至兰绿色。

【检查】 水溶性酚类 取本品1ml加水20ml振摇后滤过，取滤液5ml加三氯化铁试液1滴，除产生易消失的灰绿色外，不得显兰色或紫色。

烃类 取本品1ml置50ml带塞比色管中，加N/2氢氧化钠液20ml及水18ml，混匀、立即生成澄清溶液，当放置再呈浑浊。

重金属 取本品0.5g经灰化，残渣加盐酸2ml与硝酸0.5ml置水浴上蒸干，加水5ml再蒸干，加稀醋酸2ml与水20ml，温热数分钟，依法（中国药典1977年版附录）检查，含重金属不得过百万分之四十。

【作用与用途】 局部镇痛药。具有镇痛与防腐作用，用于龋齿等。

【贮藏】 置遮光容器内，满装、密封，避热保存。

十二温经丸

【处方】	吴茱萸(盐水洗)90g	当归	60g
	川芎(酒制) 60g	白芍	60g
	阿胶珠 60g	肉桂	60g
	牡丹皮 60g	生姜	15g
	党参 60g	煮半夏	90g
	麦门冬 120g	甘草(蜜炙)	60g

【制法】 以上十二味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100g粉末加炼蜜50g与适量的水泛丸，低温干燥，即得。

【性状】 本品为棕褐色或棕黑色的水蜜丸，味苦，微甜。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 温经，散寒，养血，祛瘀。用于妇女月经不调，小腹冷痛，手心烦热，唇口干燥，久婚不孕。

【用法与用量】 口服，一次6—9g，一日2次。

【贮藏】 密闭，防潮。

十全大补酒

【处方】	党参 60g	白术 60g
	茯苓 60g	甘草 60g
	当归 60g	川芎 60g
	白芍 60g	熟地黄 60g
	肉桂 60g	黄芪 60g

【制法】 以上十味，粉碎成最粗粉，混匀。用白酒9500g渗漉，收集渗漉液8500g。另取白糖（或冰糖）1000g加适量的水，溶解，煮沸，滤过，糖液与渗漉液混匀，静置，取上清液，滤过，即得。

【性状】 本品为棕红色的澄清液体，气香，味甜微苦辛。

【检查】 含乙醇量 应在35%以上。

其它 应符合酒剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 培补气血，用于气血两虚，面色萎黄，四肢无力，久病虚弱，精神倦怠。

【用法与用量】 口服，一次25—50ml，一日2次。

【注意】 感冒忌服。

【贮藏】 密封，置阴凉处。

〔附注〕白酒为蕃薯酒

十 全 大 补 膏

【处方】	党参	83.33 g	熟地黄	125 g
	黄芪（蜜炙）	62.5 g	白术（土炒）	83.33 g
	当归	125 g	白芍（酒炒）	83.33 g
	肉桂	41.67g	川芎（酒炒）	62.5 g
	茯苓	83.33 g	甘草（蜜炙）	41.67 g

【制法】 以上十味，加水煎煮二次，每次2小时，滤过，滤液分别浓缩。在第二次滤液浓缩至适量时加蔗糖667 g溶解，煮沸，滤过，合并浓缩液，收膏，即得。

【性状】 本品为棕褐色的液体流膏，气香，味甜微苦辛。

【检查】 比重 应为1.37—1.38。（按中国药典1977年版附录比重测定法测定）。

其他 应符合煎膏剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 温补气血。用于气血两虚，腰膝无力，久病虚弱，面色萎黄，精神倦怠，妇女失血崩漏，月经不调。

【用法与用量】 口服，一次9 g，一日2次。

【注意】 伤风感冒忌服。

【贮藏】 密封，置于阴凉干燥处。

十 滴 水

【处方】	樟脑粉	25 g
	大黄粉	20 g
	辣椒粉	5 g

桂皮（中粉）	10 g
姜粉	25 g
大茴香（小茴香）	10 g
桉叶油	12.5ml
乙醇（70%）	适量
全 量	1000ml

【制法】 取大黄、辣椒、桂皮、姜、茴香混匀，用70%乙醇按中国药典1977年版附录酊剂渗漉法或浸渍法操作。在滤液中加樟脑细粉及桉叶油，溶解后，再加入适量乙醇补足全量，搅匀，放置，过滤即得。

【性状】 本品为红棕色的澄明液体，味辛辣。

【检查】 比重 应为0.87—0.92（中国药典1977年版附录）。

含乙醇量 应为60—70%（中国药典1977年版附录）。

总固体物 取本品 2 ml置水浴上蒸干，在105°干燥 2 小时，遗留总固体物 应为1.4%以上。

【作用与用途】 用于中暑而引起的头晕、恶心、腹痛、肠胃不适等症。

【用法与用量】 常用量 口服一次10—40滴、儿童用量酌减。

【规格】 （1） 5 ml； （2） 10ml。

【贮藏】 在阴暗处保存。

七 叶 莲 片

【处方】 七叶莲 6000 g

【制法】 取七叶莲叶，粉碎成细粉，过筛。茎枝加水煎煮二次，第一次 3 小时，第二次 2 小时，滤过，合并滤液，浓缩成稠膏，与上述细粉及适量的淀粉，混匀，干燥，粉碎成细粉，过筛。制成颗粒，干燥，压制成1000片，即得。

【性状】 本品为绿褐色的片，味微苦。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 祛风除湿，活血止痛。用于风湿痹痛，胃痛，跌打骨折，外伤出血。

【用法与用量】 口服，痛时 2—4 片，或按医嘱。

【贮藏】 密闭，防潮。

〔附注〕 七叶莲为五加科植物，同七叶莲酊。

七 叶 莲 酊

【处方】 七叶莲 250 g

【制法】 取七叶莲粉碎成最粗粉，用60%乙醇渗漉，收集渗漉液为原生药的一倍半量，滤过，加60%乙醇至1000ml，即得。

【性状】 本品为绿褐色的澄明液体，味苦辛。

【检查】 含乙醇量 应为40—50%（按中国药典1977年版附录乙醇量测定法测定）。

【功能与主治】 祛风除湿，活血止痛。用于风湿痹痛，胃痛，跌打骨折，外伤疼痛。

【用法与用量】 口服，痛时服5—10ml，一日服3—5次或按医嘱。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密闭，置阴凉处。

〔附注〕七叶莲为五加科植物鹅掌藤 *Schefflera arboricola* Hayata和密脉鹅掌柴 *S. Venulosa* Wight et. Arn.的干燥茎叶。

七 味 都 气 丸

【处方】	熟地黄	240 g	山茱萸	120 g
	山药（炒）	120 g	五味子	90 g
	牡丹皮	90 g	茯苓	90 g
	泽泻（盐炒）	90 g		

【制法】 以上七味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100 g粉末加炼蜜30—50 g与适量的水，泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为褐黑色的水蜜丸，味甜而酸。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 滋肾、纳气。用于肾虚气喘，久咳浮肿，失音咽痛。

【用法与用量】 口服，一次9 g，一日2次。

【注意】 伤风感冒忌服。

【贮藏】 密闭，防潮。