

B/98

增訂
驗方新編
下集

家庭百病自療



上海中央書局
印行

學院

訂 增 新 最

編 新 方 驗

冊 下

1985

行 印 店 書 央 中 海 上

民國二十四年八月出版

增訂驗方新編

全二冊

定價大洋二元四角

此書所有
版權
翻印必究

出版者 中央書店

校訂者 儲菊人

印刷者 上海中央書店

發行者 上海中央書店

總發行所 上海中央書店

四馬路
世界

分發行所 上海及各省各大書局

校正
驗方新編 卷六

善化鮑相璈雲韶編輯
合肥張紹棠又堂增訂

癰毒

【癰疽論】 王洪緒曰癰疽二毒

由於心生蓋心主血而行氣氣血凝滯而發毒毒借部位而名藥宗經治而誤患盤而踰徑寸者紅腫稱癰癰發六腑若其形止數分乃言小癰按之陷而不即高頂雖溫而不甚熱者膿尚未成按之隨指而起頂已軟而熱甚者膿已滿足無膿宜消散有膿勿久留醒消一品立能消腫止疼爲療癰之聖藥白陷稱疽疽發五臟故疽根深而癰毒

淺根紅散漫者氣虛不能拘血緊附也紅活光潤者氣血拘毒出外也外紅裏黑者毒滯於內也紫點不明者氣血不充不能化毒成膿也膿色濃厚者氣血旺也膿色清淡者氣血衰也未出膿前癰有腠裏火毒之滯疽有腠裏寒痰之凝即出膿後癰有熱毒未盡宜託疽有寒凝未解宜溫即患寒疽酷暑仍宜溫暖如生熱毒嚴冬尤喜寒涼然陰虛陽實之治迥別閱古書總未詳因立其旨備覽焉諸疽白陷者乃氣血虛寒凝滯所致其

初起毒陷陰分非陽和通腠何能解其寒凝已潰而陰血乾枯非滋陰溫陽何能厚其膿蓋氣以成形血以華色故諸疽平塌不能遂毒者陽和一轉則陰分凝結之毒自能化解血虛不能化毒者尤宜溫補排膿故當潰膿毒氣未盡之時通其腠裏之功仍不可緩一容一縱毒即逗留一解一逐毒即消散開腠裏而不兼溫補氣血虛寒何以成膿猶無米之炊也滋補而不兼開腠僅可補其虛弱則寒凝之毒何能覓路行消且毒盛者

則反受其助猶車粟以助盜糧矣滋補不兼溫煖則血凝氣滯孰作膿之具猶之造酒不暖何以成漿造飯無火何以得熟世人但知一概清火以解毒殊不知毒卽是寒解寒而毒自化清火而毒愈凝然毒之化必由膿膿之來必由氣血氣血之化必由溫也豈可涼乎況清涼之劑僅可施於紅腫癰癤若遇陰寒險穴之疽溫補尙虞不暇安可妄行清解反傷胃氣甚至陽和不振難潰難消毒攻內腑可不畏歟蓋脾胃有關生死故首貴止痛次宜健脾痛止則惡氣自化脾健則肌肉自生陽和轉盛紅潤肌生調和補氣養血之

劑仍以犀角羚羊連翹等性寒之藥始終咸當禁服 癰之與疽截然兩途陽症爲癰陰症爲疽治法迥別世人以癰疽連呼並治貽害無窮古今方書雖有陰陽虛實之分治法難期盡善惟王洪緒先生^{別號林屋山人}所著外科全生一書乃世傳秘本剖析陰陽虛實之理至精且備不施升降不用刀針經歷四十餘年用藥從無一誤開卷瞭於掌指可以不學而能書只前後兩集其價甚廉板存江南省城湖南湖北坊間間亦有賣者各宜購置一部不惟自便亦可濟人留心瘍醫者尙毋忽諸

【癰毒治法】 凡患色紅腫痛根

盤寸餘者是癰毒發三四日尙未作膿以洞天嫩膏貼之內服醒消丸熱陳酒送下三錢卽止其痛夜間得睡次日皮卽起皺再服全消如過四五日將要作膿亦服醒消丸腫消痛止如作膿腫脹未破者用代刀散酒服卽穿外貼洞天膏數日收功如根盤數寸者在背心腦後腰腹肚腋陰囊等險要處用五通丸醒消丸早晚輪服一次^{用敗毒湯送下}皮皺痛息若已穿破用託毒散醒消丸早晚輪服自有奇效如根盤不滿一寸亦紅腫者名癰用蟾酥丸梅花點舌丹卽愈此林屋山人經驗方也

癰毒諸症

【腸癰】 腸癰有生於腸內者腹

內脹急大小便牽痛如淋轉側搖之如水聲潰後則膿從大便出有生腸外者肚臍腫痛作脹或一足彎曲口有臭氣或膿自

臍出甚則腸穿有蟲自臍中出勢難爲計初起宜用牡丹皮散

以消之潰爛則用參芪內託之

臍 牡丹皮散 丹皮五錢 苡仁

一瓜 薤仁去油 桃仁去皮尖研水

煎服此孫真人千金方也 又

方 多服六一散見內外備膿血

從大便出膿盡即愈至神至穩

之方也 又方 皂角刺 一兩

用八 酒煎至七分溫服血膿從

大小便出而愈不飲酒者水煎

亦可 又方 大黃炒朴硝各

錢丹皮 白芥子 桃仁各二

空心煎服小腹堅硬而熱按之

則痛肉色不變成紅赤微腫出

汗畏寒小便亦多脈緊實而有

力服此神效

【肚癰】 肚腹生癰即腸癰也照

上腸癰各方治之

【肺癰】 方見肺部 臍癰 方

見肚腹部 懸癰 方見海底

部 對口 方見頸項部 發

背 搭手 均見背部 魚口

便毒 方見陰疽門橫痃症

【徧身肢節生瘡】 此名疥蝕因

風寒所搏氣血凝滯故也用蠶

繭每繭一個入白礬五分火煨

過之後每礬一兩另加陀僧五

錢白芷一錢研末用蜜調敷

【筋骨疼痛潰爛生瘡】 此因誤

服輕粉及丹石諸藥以致毒凝

筋骨日久不愈查解救諸毒門

輕粉毒方治之

【身上忽然紅腫遊走不定或痛

或癢】 此丹毒也照後遊風

丹毒各方治之

【身上疙瘡如塊如核】 此流注

也與遊風丹毒忽然而發者不

同照陰疽門流注方治之

疔瘡

凡疔瘡好而復發此疔根未出故也若不急治再發則根深難治有拔疔根法見後

【疔瘡發之最速有朝發夕死隨發隨死有三日五日而不死至

一月半月而終死者其毒最烈或發寒熱或發麻木或嘔吐或煩躁或頭暈眼花或舌硬口乾或手足青黑或心腹脹悶或精神沉困或言語顛倒此皆生疔之症其形或大或小或長或圓其色或白或黃或紅或紫或有紅絲名色甚多治法則一倘辨別不清以生黃豆令本人嚼之如無荳腥之味卽是疔瘡】疔瘡多生暗處或痛或不痛或癢或不癢發時人多不覺若不早治最易誤事有發寒熱數日而後生者有當時生者初起如粟米大或大小不一如發寒熱及麻癢嘔吐等症卽於偏身留心尋認凡鬚髮眼耳口鼻肩下

兩腋手足甲縫糞門陰戶等處更宜細看一日須看數次有則照方醫治若前心坎後背心有紅點者卽照後羊毛疔方治之如尋覓不見取甌中氣垢少許納口中必有一處痛甚卽知疔瘡所在須急宜刺出惡血以見好血而止諸瘡及刀鐮疔忌用刀針餘疔忌如毒重者急服護心散見癰毒諸方或菜子油一碗真麻油亦可以免毒氣攻心若服菊

花飲亦可

【蜘蛛拔毒法】

先將疔頭用破片刺破尋活蜘蛛一個越大越好放疔瘡上蜘蛛一見自能奔往吸拔其毒少時蜘蛛不動卽取放冷水中自活如疔未愈可用蜘蛛

蛛再行吸拔或另取蜘蛛用之以毒盡爲止無論疔在何處雖毒重痛極不省人事命在垂危立可回生此急救第一良法凡手指生蛇頭瘡及毒蛇毒蟲咬傷皆可照此拔毒 菊花飲白菊花葉連根搗取自然汁一茶鍾滾酒兌服用酒煮服亦可不如生汁爲妙毒重者宜多服渣敷患處留頭不敷蓋被睡臥出汗其毒自散無論生在何處雖欲氣絕亦可起死回生至穩至便至靈諸方皆不及此不可遲疑自誤無藥用根如無卽用藥店中乾白菊花四兩少甘草四酒煮溫服亦可見癰毒諸方大戟膏敷之卽愈再發再敷無不神效 地丁飲

紫花地丁一白礬 甘草 各三錢

銀花 兩 煎服各疔俱效有人生

紅絲疔已走至乳旁服之立愈

眞神方也 葱礬散 明礬 錢三

細研葱白 七 二味共研爛分作七

塊每塊以熱酒一鍾送下服完

即睡蓋被取汗如無汗再服葱

頭湯一鍾少頃汗出如淋其病

若失此方不但治疔一切惡症

皆治初起未成膿者更妙 烟

油膏 用烟桿中烟油厚敷四

圍留頭不敷少刻疔破出水而

愈奇效如有紅絲者用烟油離

絲三分處敷之絲即不走 又

方 黃色溲雞糞厚敷四圍將

疔頭挑破不敷極效 又方

生黃豆嚼爛敷之極效

【頭面諸疔】 救唇湯 紫花地

丁 金銀花 各一白菓二十桔

梗 生甘草 兩 知母 各三錢 水煎

服至重三劑必愈此方治頭面

口角疔毒俱效唇疔更妙 又

方 一人唇口生疔七個頭腫

如斗心悶神昏百藥不效後有

人云此名七星趕月用蝨蟲搗

爛敷之頃刻瘡口出黃水腫消

神清次日全愈如無蝨蟲以五

穀蟲一錢瓦上焙研末白礬三

分蟾酥三分以燒酒溶化調勻

敷疔上少刻疔亦破流毒水而

愈 又方 凡口唇生疔看大

腿彎中如有紫筋用銀針刺出

血即愈有人不知疔在何處但

唇內癢極須臾半面腫硬痛甚

見腿後起有紫筋刺之立效

又方 雄雞冠血點上其效如

神 又方 大蝦蟆一取肝貼

之立消兼治面上生疔對口疔

等症 又方 生蜆去搗融敷

即效 又方 烏色草魚去鱗

取皮切片貼之隨貼隨乾乾則

另換換至數十次即破口而愈

矣

【紅絲疔】 此疔流走最快生於

足者其紅絲漸長至臍生於手

者紅絲漸長至心生於唇面者

紅絲漸長至喉間則不可救矣

手足兩處可用頭髮離絲一二

寸遠緊緊捆住並將絲頭刺破

或用燈火或用艾火在絲頭燒

之絲即退散而愈不散再燒以

散爲度其效如神或照各前方治之亦可

【刀鏢疔】 疔形如韭菜寬長一二寸肉色紫黑者是忌用針刺用前葱繫散服之並瀝雞糞數之即愈遲則毒歸心腑致命

【羊毛疔】 初起頭痛身發寒熱前心坎後背心有紅點如疹子形先用針挑破取出羊毛再用明雄末二錢青布包紮蘸熱燒酒於前心坎瘡上一二寸外四圍團團擦之漸漸擦入瘡眼其毛即奔至後背心再於背心照前擦之其羊毛俱拔於布上即埋入土中內服菊花飲或葱白飲地丁飲俱見護心散見難毒諸方俱可

【羊毛疔瘡】 此症忽起一泡其形如瘤內有羊毛亦名羊疔初起或頭痛或發寒熱即是用黑豆蕎麥各等分研末挑破敷之毛落即愈內服菊花飲亦可

【疔瘡出血不止】 飲真麻油一大碗即止或飲菜子油更妙

【疔瘡走黃】 凡疔毒腫痛神昏甚至不省人事謂之走黃急用芭蕉根搥汁服之立可回生或照前菊花飲地丁飲服之均妙

【拔疔根法】 疔毒重者好而復發此疔根未出故也若不急治再發則根愈深而難治矣 草蘇子一粒乳香一分共搗爛用飯和爲餅貼之少時疔根自出又方 葱白加蜜搥融將疔

刺破敷之如人行五里其根自出又癰毒諸方門紅膏藥方拔疔最妙

瘡毒

【楊梅瘡】 此瘡最毒治不得法多致纏綿不救且最忌服輕粉服則毒留筋骨難以斷根抑且不能生子如已服者可用解輕粉方見解毒治之 紅棗丸紅棗三斤以杉木作柴煮之煮熟剝皮取核多取燒過杉柴枯灰磨細末和棗肉搗勻爲丸如彈子大每日任意食之不可間斷雖瘡毒滿周身或服過輕粉及一切丹石隱藥致成結毒穿頂穿鼻潰爛不已多年不愈者

服之大有奇效至穩至靈此治楊梅結毒第一方也愈後再服一兩月斷根紅棗能解丹石之毒杉木專祛溼熱之侵是以奏功如反掌也忌醋與辣椒又名青椒及一切發物半年外用蝦蟆散又方土茯苓一木通白薤皮防風各一兩宣木瓜薤仁金銀花錢各二皂角子錢四分水煎服每日服一劑以愈爲度外用蝦蟆散見癰毒方敷之無論久近輕重潰爛穿頂屢試如神百發百中最忌食茶不服藥則不忌並忌醋與辣椒及一切發物半年終身戒食蝦蟆如不服藥即服前紅棗丸外用蝦蟆散敷之亦可又方大黃一穿山甲兩炒

川厚朴 白芷 大楓子仁 花椒 甘草錢各三水煎兌酒服毒氣從大便出七日全愈忌食一切與上同惟不忌茶與蝦蟆無論輕重屢試神驗不可輕視又洗藥方 生甘草 金銀花 蒼朮 白芷 藿香 槐花錢各二共煎水洗輕者內服前方外用此藥洗之即愈

【避楊梅瘡法】凡生楊梅瘡在傍伺候親近之人難免傳染用雄黃川椒錢各五杏仁百粒熟去皮錢研末尖研末燒酒打麵糊爲丸梧子炒大每服十五丸開水下於病人初發時服即可免也

【瞎眼瘡】上高下深顆顆垂垂如瞎眼其中帶青頭上各露一

舌者是也用回陽玉龍膏真君妙貼散見陰疽方敷之必效如仍不愈用蝦蟆散見癰毒方治之或後陰疽方更妙

【貓眼瘡】瘡似貓兒眼有光采無膿血痛癢不常飲食減少名曰寒瘡照上瞎眼瘡治之

【天蛇毒】有人徧身潰爛似癩非癩呼號不已一僧視之曰此天蛇毒非癩也用秦皮又名梓皮又名石櫨又名苦澀又名苦澀餘碗三日全愈又草花間蜘蛛螫人爲露水所濡乃生此瘡者亦名天蛇毒瘡可用此方治之天蛇大如箸而扁長三四尺色黃赤人遭其螫不治必死

【蛇形瘡】一人生瘡如蛇長數

寸外用雄黃麻油調敷內用雄黃沖酒飲即愈

【纏蛇瘡】又名纏腰龍 此丹毒也生腰

下長一二寸或碎如粟或紅腫

堅硬用燈火向兩頭燒五次並

用雄黃外敷內服極效 又方

陳石灰麻油調敷即愈 又

方 舊糞桶箍篾燒灰麻油調

敷其效尤速或照遊風丹毒各

方治之

【魚脊瘡】 多生筋骨之間堅凝

作痛初起白泡漸長狀如魚脊

破流黃水此陰症也初起時無

論已潰未潰宜用隔蒜灸法見

毒諸方門 以通陽氣外用回陽玉龍

散真君妙貼散見陰敷之或用

後陰疽諸方更妙

【魚臍瘡】罕而長腫而黑者是 此因風毒蘊

結或氣血凝滯或誤食人汁所

致用臘猪頭骨燒枯研末生雞

蛋白調搽數日即愈

【蜂窠瘡】不拘何處形如蜂子窠者是 用罐鑿

一小孔納碎布數團火燒取烟

從小孔出向患處薰之二三次

即愈 又方 愈而復發者用

鉛粉硃砂和蜜調敷神效

【蜘蛛瘡】 形如蛛網癢不可忍

用豆腐衣又名豆腐皮 燒枯存性香

油調搽

【蚯蚓毒】 此症鬚眉皆落形似

癩瘋或夜間身上有蚯蚓聲用

食鹽數斤熬湯洗身數次內服

淡鹽水一二碗極效不可誤為

癩瘋如真是癩瘋令病人站立

打銅鐵之風爐火傑望其臉紅者是癩瘋臉綠者非也兩手大二指合攏處

肉平場者亦是

【螞蟥毒】 形如珠顆成片成串

或紅或白破則流水好而復發

用穿山甲瓦上焙枯研末 香油調敷雖

多年不愈者無不神效

【蠼螋瘡】 蠼螋又名搔甲子俗

名偷油婆又名蛄螂其瘡初如

粟米漸大如豆更如火烙漿泡

疼痛至甚者以春茶葉研末麻

油調搽神效 又方 燕子窠

泥和猪膽加酒調搽或照後癰

疽毒各方治之

【葡萄毒】 一小兒年五六歲頰

上忽起一顆紫色光亮形如葡

萄頃刻周身皆有一老醫見之

云此乃葡萄疔毒一見鼻血即死因小兒飲食言笑如故病家不信至夜半忽鼻中血如湧泉而死 又一男子手腕上忽起一粒如紫葡萄半日亦見鼻血而死俱無藥救附錄於此以俟博識者立方施治 又一女子年十四手腕軟處生物如荳半在肉中紅紫色痛甚百方不效後用水銀四兩白紙二張將水銀揉熟擦之三日自落合而觀之前症似可照此施治 再前症即名疔毒又見鼻血其為熱毒內蘊無疑水銀擦之如不見效應急照前癰毒諸方門內菊花飲菜油飲二方治之或可救也並用吳茱末熱醋調敷兩脚

心一日一換此引熱下行至妙法也

【瓜藤瘡】一身十餘箇即是 尖尾芋 茄

子葉 五月艾 葱 薑 共

搗爛醋煮敷擦

【癰疽瘡】 手足肩背纍纍如豆

如米大者如梅如李或赤或黑或白或青初生有痂一屢痂內有核核有深根能爛筋骨毒入臟腑即死此熱毒也先將痂挑破用醋和微溫淘米水洗淨以芙蓉散見癰毒諸方門治之自流毒水內服真菜子油亦可極效 又

方 燕子窩連泥帶糞和初生百日内男孩糞調擦或真菜子油或麻油亦可極效也孫真人千金方也 又方 豬膽汁敷

之流出毒水極效 又方 鱖魚長三四寸者一條亂髮一團如雞大 猪油半斤同煎膏用罐裝好放水中拔其火氣三日後敷之極效 又方 男子尿桶中白霜敷之立刻清涼止痛乾則再敷 又方 鍋黑煙以燒草者佳燒煤炭者不可用 桐油麻油菜油均可 調搽即愈 又方 照遊風丹毒門防風升麻湯菜子油六安州茶葉各方治之至效

【天泡瘡】 形如水泡者是用蓮蓬即蓮房燒枯研末并泥調敷神效或用荷花瓣貼之或照後黃水瘡各方及癰毒諸方門松香散雞腰膏治之更妙 又遍身生瘡破則水流復生內有小石一片方見奇病門

增訂驗方新編 卷六 瘡毒

九

【黃水瘡】

初如粟米癢而兼痛
破流黃水浸淫成片流處卽生
由脾胃溼熱外受風邪相搏而
成發於心下者若不早治難救
宜用青蛤散 蛤粉一兩真青
黛三錢熟石膏二兩輕粉二錢黃柏各五錢
共研細末先用香油調成塊
次用涼水調稀塗之神效並治
鼻中生蟲 又方 蠶豆殼上五
焙枯 加黃丹少許以真菜油調
敷研末麻油亦可乾則再敷三日卽
愈屢試如神 又方 紅棗燒
炭八錢飛黃丹 松香 枯礬各四錢
錢右共爲末麻油調搽立效
又方 輕粉 樟腦各二錢大楓
子去川椒各四十粒杏仁錢一共爲
細末和柏油燭搗勻敷之功效

如神柏油又名捲油又名柏油
卽烏柏子油也或用癰毒門松
蠟散蘆薈散燕泥散雞腰膏均
極神效

【熱瘡】

其色紅而作痛者是用
男子尿桶中白霜敷上立刻清
涼止痛乾則再敷或照上癰疽
瘡各方治之亦可

【漆瘡】

杉木屑煎水洗用 活
螃蟹黃 滑石和蜜調敷甚效
此林屋山人方也有漆之處先
嚼川椒敷鼻孔可免漆瘡 又
方 貫衆焙枯香油調敷或用
韭菜搗汁敷研末或用白羊乳搽之
均效 又方 白菓樹葉煎水
洗立刻消三次全愈或用新荷
葉煎水洗亦極神效 又方

活螃蟹搗汁滴入使毒水流出
自愈如已腫爛取生蟹黃塗之
其爛更甚數日卽愈若再不效
用生大黃三錢枳壳二錢水煎服二
劑腹泄而愈不泄加芒硝二錢以
泄爲度緣漆瘡火盛則重非泄
不能愈也

【癬瘡】

凡癬內有蟲治好復發
非藥不靈蟲未盡也發後再治
無不愈矣頭面生癬如入眼內
卽成大麻瘋矣宜急治之新鮮
皂角刺一二斤搗爛熬至將成
膏時加好醋熬稠將癬剝破敷
之日刺日敷自有毒水流出流
盡再敷十日雖數十年陰頑惡
癬無不斷根此林屋山人屢試
神方 又方 斑蝥五生半夏

末一雞蛋白調搽數次則必愈

錢此方非經醫生指
示用法誠非輕用

再發再搽雖多

年惡癬無不斷根取雞蛋油法

見癰毒諸方

又方

青礬炒成

塊研細末加猪膽汁和融再炒

再研用老薑一塊切開蘸藥擦

之大痛即愈再發再搽雖多年

頑癬亦可除根

又方

大蜂窩一以白礬末填孔內火煨以

礬融化爲度研勻將癬抓破以

牙硝水調搽一二次痛則必愈

再發再搽必能除根

又方

荔枝核磨醋將癬抓破搽之雖

痛不妨數日即愈再發再搽斷

根

又方

用新棉花扯成如

紙薄一層量癬寬大將棉花鋪

貼用火向花上一點頃刻燃盡

當即止癢而且並不焦痛不須

用藥極簡易極效驗只須一次

全愈倘次年再發照治一回斷

根

又方

珠蘭花葉時時擦

之半月斷根

【小兒乳癬】小兒初生症類疥

癬先起手足次遍腹背纏綿不

已先用殭蠶不拘多少去嘴研

末煎湯浴之或一日一次或一

日二次毒出再用

真青黛

黃柏 枯礬 雄黃百藥煎硫

黃各等分研末溼則乾搽乾則香

油調搽以愈爲度名換形散

【皮挂】

杏仁

去皮尖
黑炒

研如醬搽

上即愈或照癬瘡各方治之

【疥瘡】

亦有五種乾疥溼疥蟲

疥灰疥膿俗名膿泡瘡
又名黃膿泡疥是也由

各經蘊毒日久生火兼受風溼

而成數日延及遍身最易傳染

或癢或痛癢者內必有蟲不獨

蟲疥然也治法雖多有效有不

效者後列各方五種疥瘡皆治

古方有燻藥一法瘡雖易愈然

毒盡歸腹定成鼓脹危症切宜

戒之如已成鼓脹查癰毒諸雜

門本方治之

黃香散 硫黃

川椒各五錢共研末加葱薑頭

各五錢和生猪板油搗融用布

包好烘熱時時擦之其效甚速

又方 整塊川厚樸以真香

油磨濃如醬加枯礬少許搽之

數日退盡此膿窠疥瘡神方也

合掌散 硫黃一鐵鏽一紅

砒六共研極細如灰葱汁調敷
大碗內分周圍敷勻以碗覆瓦上取
艾放碗下燒薰薰至藥乾敲之
如空碗聲爲度取藥再研細每
藥一錢可敷數次臨用以右手
中指粘滿香油再粘藥搽入左
手心合掌摩擦止有藥氣不見
藥形然後以兩手擦瘡每日早
晚二次三日掃光再擦三四日
卽不發矣屢試如神並治陰囊
溼癢 二美散 吳茱萸 硫
黃 各等分研細如麵粉照上
合掌散法摩擦每日二次愈後
再擦三四日專治膿疥神效此
方與上合掌散均林屋山人經
驗方也 又方 油胡桃 又名
紅棗肉 各一水銀五冰片 核桃
兩分 不拘多少

真小磨麻油 猪肉各用共
搗熔用綢包裹擦之擦過卽能
止癢止痛時向鼻中間之數日
卽愈屢試神驗 又方 田螺
煮熟酒炒食可除一身疥瘡
又方 松香三枯礬 五倍子
各一以上共研末加頭髮三錢
猪板油五錢用青布包好向燈火
上燒之有油用碗接住候冷用
針挑破疥瘡將膿擠出用茶洗
淨勿沾生水候乾取油搽抹不
過三日全愈永不再發 又方
硫黃塊放銅器內燒燃存性
倒在地上候冷搥碎忌鐵器加水
銀麻油拌勻用布包好烘熱時
時擦之二日卽愈簡便而極效
驗 又方 核桃仁 連皮用一兩
又名胡桃

大楓子仁五水銀三共搥極融
爛先用此藥一二錢錢不可多放在
手心中擦勻將左手心在肚臍
眼上順著摩擦不可倒擦擦至
手心發熱卽止再用此藥一二
錢放右手心中擦勻在肚臍眼
上照前摩擦擦至肚腹滾熱卽
止每日一次瘡上不擦輕者二
日卽愈至重三日斷根有人遍
身膿疥時發時愈纏延三載百
藥不效用此三日而愈從此斷
根此治五種疥瘡第一神方一
切溼熱瘡疾皆治珍之寶之愈
後宜食愈瘡見後難以補脾
土或另服健脾之藥亦可如恐
水銀入腹爲害病愈體壯之後
每早用真川椒要開口七粒滾水

空心吞服連服三日其水銀自入椒內由大便而出或用真川椒研末鋪牀上蓋被睡臥水銀即由毛孔而入椒內矣此法最妙

【凍瘡】

橄欖核燒灰存性研末加輕粉少許香油調搽神效

又方 以蜡子殼煨研極細以麻油調搽溼則乾搽數月全愈

此秘方也蜡子殼即瓦楞子 又方 陽和解凝膏見陰疽門貼一夜即愈潰爛者貼三張收功此林屋山人方也

又方 白芨磨敷即愈

又方 馬糞煮水泡之半日即愈

又方 蘿蔔菜橘皮煎湯先洗用蟹殼燒灰研麻油調敷

又方 暑伏時搗大蒜爲泥敷在上年生過凍瘡之處過

一日一夜洗去遲三四日再敷一次若連日敷之則肉上起泡破皮矣本年冬雖極寒亦不再生凍瘡凡小兒手足各處雖未凍過亦敷兩次可以耐寒此法可傳船夫脚夫亦一德也

大癩瘋

此症各方凡殺蛇治愈者務戒殺放生方能全

【癩瘋者身上必有麻木之處針之不通然後發現於外若不麻木則非癩瘋偏身雖麻木數月即發現於外雖重易治若年久病深壞形變貌鼻塌肉崩手指脫落足底穿爛則難治矣江西蕭曉亭著有麻門全書二本專治癩瘋所論病源最爲透徹其

治法亦極神妙板存廣東省城雙門底刻字店】癩瘋諺云

正報似非妄談若自信罪愆難逃果能矢志爲善人力可以回天即自信並無過惡亦當力行善事所謂善事者守禮守法常存善念見善必爲尤宜謹戒殺生並須放生果能如此不但病易愈且爲後嗣種福所益多矣

【曾克廣五服方】 昔在萬安縣百嘉地方遇一良醫善治癩瘋惡疾活人甚衆余甚奇之具金百餘求得此方歸家後適鄉鄰有患此症者依方用之數月而愈頻年以來遠近用此方者十愈八九屢試屢驗真神妙方也

初服方 羌活 蒼朮 荆

芥 防風 銀柴胡 元參
 赤芍 黃芩 白蘇皮 枳壳
 銀花 甘草水煎服四劑
 次服方 羌活 細辛 白芷
 生地 防風 知母 黃芩
 川芎 甘草水煎服二劑
 三服方 大黃 朴硝 銀花
 桃仁 枳壳 黃連 黃柏
 黃芩 元參水煎服三劑
 四服方 荊芥 防風 川烏
實便浸後白附子薑汁天麻
蠶米汁煮 薤藜 水提過 獨活 元
蒸 火麻仁 洗去 苦參 赤芍
 黃柏 銀花 甘草 枳壳
 大楓子水煎服十劑 以上
 依次空心服俱不加引 五服
 九 元參 枳壳 白芷 錢各二

赤芍 銀花 各一 火麻仁 薤
 藜 大楓子 各一 獨活 二 製川
斤 烏一 北防風 十以上共研細末
錢 斷蛇 十二 去頭尾用熱酒浸二
兩 三日 秋冬浸五六日浸鬆後去
 骨蒸熟焙乾研末和前藥蜜爲
 丸每日早午晚三次各服四錢
 茶送下
 【皂刺散】 一人得麻瘋惡疾雙
 目風盲眉髮俱落鼻梁倒塌遇
 異人傳方用皂角刺二燒枯蒸
 一時久曬乾爲末每日飯後服
 二大黃煎濃湯調下半月後眉
 錢 髮再生目明肌潤
 【白花蛇丸】 丹陽上舍得麻瘋
 疾一僧療之而愈以數百金求
 方不肯傳館賓袁生窺藏衲衣

領中因醉而竊錄焉用者多效
 白花蛇一鳥梢蛇一條並去防
錢 風 蟬蛻 去泥 生地 川芎
土 苦參 枸杞 槐花 銀花 以上
兩 各二 白蕪荑 全蝎 醋浸一日細
兩 辛 蔓荊子 威靈仙 何首
 烏 胡麻仁 炒 金毛狗脊 川
 牛膝 烏藥 香 天花粉 川連
 黃芩 梔子 黃柏 連翹
 牛蒡子 以上各 漏蘆 半斤去苗
一兩 荊芥穗 一兩 上頭面者加白芷
五錢 一兩 肌膚潰爛者加大皂角一
 兩共研末米糊爲丸桐子大每
 服五六十丸茶送下午後臨臥
 各一服
 【白鹿洞方】 治大癩瘋眉毛脫
 落手足拳攣皮骨潰爛唇翻眼