

毛主席语录

农业方面,除粮、菜外,饲养猪
羊,解决肉食,也是很要紧的。



介绍二十二种防治家畜 疾病的中草药



农业技术资料

第 46 号

上海人民出版社

目 录

雪见草	1
荔枝草	5
积雪草	8
连钱草	11
菟丝子	14
无根藤	17
灯芯草	20
龙须草	23
杏香兔耳风	26
毛大丁草	29
石蟾蜍	32

头花千金藤.....	36
十大功劳.....	39
枸骨.....	43
薜荔.....	46
络石.....	49
硃砂根.....	52
百两金.....	55
女贞.....	58
冬青.....	61
梅叶冬青.....	65
毛冬青.....	68

编后

雪 见 草

别名 关公须、根下红、红头绳、伏地肖、红灯芯。

形态 一年生草本。主根短，有多数须根，红色。茎四棱，高5寸至2尺许。基生叶铺地，有长柄；叶片狭卵形，长达2~3寸；茎生叶对生，有短柄或无柄，叶片卵形，边缘有钝锯齿，两面有柔毛。春季开花；轮伞花序，有多数花轮集成总状，顶生或腋生；花淡紫色。小坚果黑褐色。

采收 生于山地、疏林等处。全年可采，根或全草供药用。

药理 本品10%的水溶液，对伤寒杆菌有较强抗菌作用，对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、大肠杆菌、福氏痢疾杆菌也有抑制作用。

性能 味苦、辛，性凉。清热凉血，活血消



雪见草(唇形科)

Salvia plebeia R. Br.

肿,止血。

应用

1. 猪丹毒: 雪见草1两,玄参、小槐花根各5钱,柳叶白前8钱,水煎喂服。

2. 急性乳腺炎(初起): 雪见草,大家畜半斤,水煎喂服;另用鲜全草加蛋白捣烂,敷患处。

3. 家畜吐血、衄血、尿血、便血: 全草单味,或加旱莲草,水煎服。

制剂

1. 雪见草注射液: 雪见草干根,水煎,用酒精去沉淀法提取,使每毫升含生药1克。猪每次5~15毫升,肌肉注射,日2次。用于感冒发热、咽喉炎、痈疖初起、外伤感染、湿疹;并可试用于猪丹毒。

2. 康畜多注射液: 雪见草、瓜子金、柳叶白前、白英、雷公藤根皮、一枝黄花各等量,水煎成含生药50~100%的煎出液,纱布棉花过滤两次,加0.5%石炭酸,瓶装,高压消毒。静置2~3天后,用胶管吸出上清液,再瓶装高压消毒。如此反复3~4次,至无沉淀为止。猪每次

5~15 毫升，肌肉注射，日 2 次。用治猪肺疫、猪丹毒、小猪肺炎、猪痘、外伤感染等病。

【注】 属于这一学名的植物有二个类型，其形态、性能有所差异，为避免在医疗应用上混淆，本书按习惯分作“雪见草”、“荔枝草”两种来写。

荔枝草

别名 雪里青、皱皮草、癞蛤蟆草、麻婆子草、野芥菜、天芥菜。

形态 二年生草本，高1~2尺。全株被短柔毛。侧根多数，黄白色。茎方形，有棱，多分枝。根出叶丛生，长圆形或披针形，先端钝或急尖，基部圆形或广楔形，边缘有圆锯齿，叶面有显著皱缩，背有金黄色腺点。春季叶腋及枝顶开紫色唇形小花，成轮状排列。小坚果4个，倒卵圆形，褐色。

采收 多生于田塍、田沟边、河岸低湿处。早春采全草入药。

药理 本品10%的水溶液对金色葡萄球菌呈中度敏感，对绿脓杆菌、福氏痢疾杆菌、伤寒杆菌呈低度敏感。

性能 味辛，性凉。清热解毒，利尿消肿。



荔枝草(唇形科)

Salvia plebeia R. Br.

应用

1. 猪丹毒：荔枝草、灯笼草、牡蒿、马鞭草各6~8钱，水煎喂服。

2. 家畜咽喉炎：大家畜取鲜草0.5~1斤，中家畜2~3两，捣汁，慢慢喂服。

3. 肾炎水肿、小便不畅、热淋：荔枝草、车前草、鸭跖草、六月雪，前三药大家畜各用半斤，中家畜1~2两，六月雪药量均加倍，水煎喂服。

4. 牛中暑发痧：鲜荔枝草半斤~1斤，淡竹叶半斤，石菖蒲2两，水煎服。

制剂 荔菊注射液：荔枝草、野菊各等量，以蒸馏法提取。据实验本制剂对柠檬色葡萄球菌、白色葡萄球菌、绿脓杆菌、肺炎杆菌、枯草杆菌等有抗菌作用。可治支气管炎、肺炎、小猪红皮症、脓肿、外伤感染等病症。猪每用10~20毫升，肌肉注射，日2次。

【注】 本品与雪见草主要不同处是：根不红，叶麻皱厉害，叶柄较短，多生长在低湿处。

积 雪 草

别名 落得打(通称)、大金钱、野苣菜、马蹄草、崩大碗、崩口碗。

形态 为多年生小草本。茎细长匍匐，节节生根。叶集生，叶柄长，叶片圆形或肾形，基部心脏形，边缘具钝齿。夏季开花，花淡红紫色，伞形花序头状，2~3个生于叶腋，每花序上有3~6朵小花。果小，扁圆形。


采收 多生于村旁、路边、水边等阴湿处。夏、秋季采收，全草供药用。

性能 味苦、辛，性微寒。清热解毒，利尿除湿，活血散瘀。

应用

1. 牛中暑：鲜积雪草、鲜连钱草各4两至半斤，加食盐2两，捣烂冲开水喂服。

2. 猪发热：鲜积雪草、鲜天胡荽各4两至半斤，共同捣烂，加白糖4两冲服。



积雪草(伞形科)

Centella asiatica (L.) Urban

1. 全株 2. 花序 3. 花 4. 总苞 5. 雄蕊 6. 果实

3. 牛翻胃吐草：干积雪草、干牡荆叶各 3 两，黄毛耳草 6 两，石菖蒲 2 两，加积壳 4 两水煎服。

4. 牛血尿：鲜积雪草 1 斤，金樱根 6 两，水煎加入白糖 4 两喂服。

【注】 本品和唇形科连钱草，均有金钱草之称，形态亦较相似，唯后者茎方形(积雪草圆形)，叶对生(积雪草 3~4 片簇生)，可加区别。

连 钱 草

别名 活血丹(通称)、金钱草、大叶金钱草、十八缺、透骨消、遍地香、长管活血丹。

形态 为多年生匍伏草本。茎高0.5~1尺，全株有香气，茎方。叶对生，有长柄，肾圆形，上面有细毛，反面常带紫色，边缘有圆齿；花枝上的叶顶端较狭长。春季开花，1~3朵腋生，花冠唇形，淡红紫色，长6~8分，花冠筒细狭，伸出于萼筒外方。夏初果熟，果长圆形，种子褐色。

采收 多生于路边、田野、树下和房屋附近等阴湿处。春、夏采全草。

成份 茎叶含挥发油，其中含醛及酮类化合物。此外并含鞣质、苦味质及胆硷等。

性能 味苦微甘，性寒。清热利湿，利尿通淋。



连钱草(唇形科)

Glechoma longituba (Nakai) Kurz

1. 营养枝 2. 花枝 3. 花 4. 花冠剖开,
示雄蕊 5. 花萼剖开, 示雌蕊

应用

1. 耕牛流涎：鲜连钱草 2~4 两，洗净捣烂，用烧酒 4 两冲服。

2. 牛瘤胃胀气：鲜连钱草 4 两~半斤，加食盐 2 两，共同捣烂喂服。

3. 猪牛尿闭：连钱草、海金砂藤各 4 两至半斤，加白糖 4 两水煎冷服。

4. 母畜乳房炎：连钱草、天胡荽、半边莲、犁头草各一握，加食盐 1 钱捣烂外敷。

【注】与本种相近的，另有一种短管活血丹 (*Glechoma breviflora* Kupr.)，主要区别：花冠长 4~5 分，花筒部不伸出萼外。功效同本种。

菟 丝 子

别名 无根藤、没爷藤、金丝藤、无叶藤、麻棱丝、金丝草(藤的中药名)。

形态 一年生草质藤本。茎柔细,线状,多分枝,黄色,随处生吸器附着寄生,茎上无叶,叶退化。夏秋季开花;花小,黄白色,花冠钟状,先端弯裂;花多数,簇生为球形。蒴果扁球形,黄褐色,光滑无毛。种子2~4粒,细小。

采收 常寄生于豆类、蒿属等植物上。夏、秋采全茎供药用;或于8~9月间种子成熟时,割下全草,晒干,打下种子,供药用。

成份 含有“菟丝子脂甙”。

性能 味辛、甘,性平微温。补肝益肾,壮阳益精。

应用

1. 种公畜性欲不强: 菟丝子,大家畜3两(藤用量加倍)水煎,黄酒冲服。