

【】

中草藥資料汇编

处 方 选

1

湖南医药工业研究所

毛主席语录

政治是统帅，是灵魂。

政治工作是一切经济工作的生命线。

备战、备荒、为人民。

提高警惕，保卫祖国。

毛主席语录

中国医药学是一个伟大的宝库，
应当努力发掘，加以提高。

应当积极地预防和医治人民的疾病，
推广人民的医药卫生事业。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

目 录

止血药·····	(1)
镇痛、麻醉药·····	(11)
骨折、跌打损伤用药·····	(16)
烫伤用药·····	(23)
蛇 药·····	(26)
抗破伤风药·····	(31)
抗菌消炎药·····	(33)
解热、止喘药·····	(41)
治痢疾、消化不良药·····	(50)
治肝炎、胆囊炎药·····	(53)
治胃、十二指肠溃疡病药·····	(61)
抗肿瘤药·····	(66)
抗结核药·····	(72)
抗风湿药·····	(76)

计划生育用药.....	(80)
治阑尾炎药.....	(83)
治血吸虫病药.....	(86)
传染病用药.....	(89)
妇科用药.....	(96)
五官科用药.....	(100)
其他药物.....	(102)

中 草 药 处 方 选

止 血 药

【处方】 牛西西。学名巴天酸模，蓼科。针剂：每2毫升相当于生药4克，片剂；水剂。

【主治】 各种出血性疾病。

【用法】 遵医嘱。

【疗效】 共收治出血性疾病110例，包括肺结核或支气管扩张咳血18例，溃疡病呕血、便血10例，肝硬化食道静脉曲张呕血1例，肠道出血（阿米巴）1例，痔出血10例，月经过多42例，人工流产后出血3例，宫颈癌（晚期）3例，泌尿系出血2例，鼻衄9例，牙龈出血2例，外伤出血1例，再生障碍性贫血5例，血小板减少性紫癜3例。疗效显著69例（62.7%），良好39例（35.5%），无效2例（1.8%）。

【来源】 天津碱厂医院新疗法组：中草药“牛西西”治疗出血性疾病，1970年7月11日。

【处方】 705止血水：了哥王根皮4斤，韭菜（全草）2斤，均为生药。

【主治】 止血。

【用法】 将了哥王根皮及韭菜充分洗净，去尽泥污及杂质，并切成碎片。盛于瓦质容器内加水至药面约五公分，武火煎三小时，倒出药液存放，再加水至药面2公分，武火2.5小时，倒

出药液存放，药渣再次加水至药面2公分，武火煎2个小时，倒出药液，并把三次药液混合。

用棉花或尼龙网过滤煎出之药液，盛入瓦质或玻璃容器内加热浓缩至流浸膏状。装并封存，经煮沸30分钟消毒或高压消毒即可使用。

【疗效】 作猪的肝出血止血试验28次，其中一分钟止血的有3次，一分半的8次，二分钟的17次。5—7天内未见出血。又作狗动脉止血试验39次，其中二分钟止血的5次，二分半的9次，三分的25次。5—7天内未见出血。并且还作了数例临床观察。

【来源】 广东省博罗县长宁公社新村大队合作医疗站：“705止血水”动物实验和临床使用总结，1970年5月29日。

【处方】 70—2号止血粉：兰衣树（皮）。系榆科榆属榆树。

【主治】 止血。

【用法】 采兰衣树真皮切成小块洗净，用蒸馏水或过滤开水浸泡24—48小时，取其浸出液过滤后，置于干燥箱蒸发，将粉块研细，高压消毒备用。

【疗效】 经动物止血试验及临床试用，证实疗效显著。李××，男，成年，1970年1月23日下午被碾末机皮带铁钉挂伤，致左尺骨上三分之一开放性骨折，入院时伤口出血不止，即行做手术，发现骨髓腔及软组织出血，用兰衣树止血粉填压出血点，三分钟即止。手术后未再出血。

【来源】 昆明部队138野战医院。转摘昆明部队中草药展览会。

【处方】 土茵陈叶止血粉：土茵陈1—2斤。

【主治】 止血。

【用法】 晒干研成细末，即可应用。

【疗效】 猪肝止血试验二分钟止血有12次，一分半钟止血有17次，一分钟止血5次。狗的股动脉止血四分钟有36次，五分钟止血有12次。

【来源】 广东省惠阳专区博罗县长宁公社新村大队医疗站：“十味止血粉”实验小结，1970年2月。

【处方】 山橡皮草（别名肿节连）。爵床科。

【主治】 止血。

【用法】 遵医嘱。

【疗效】 六次用于狗的股动脉或颈动脉切断止血试验，1—3分钟即止血。

肌注一例上消化道出血，效果良好。

【来源】 江西省婺源县医药卫生院。

【备注】 用蒸馏法和酒精脱蛋白清可制成注射液。

【处方】 001止血粉：罗兰参（又名兰花参）根。

【主治】 止血。

【用法】 研细末，撒布伤口，出血多时加压。

【疗效】 家兔在静脉麻醉下，暴露后肢股动脉，直径1—2毫米。完全切断，血液喷出，用001粉撒于切口，加压一分钟止血。

【来源】 云南省曲靖专区。转摘云南省卫生局：中草药展

览资料选编，1970年5月。

【处方】 “八号”止血药粉：百步还原1份，类藤仲1份，三条筋1份，贯仲1.5份。

【主治】 止血。

【用法】 研细粉末备用。

【疗效】 经过四百五十一次动物止血试验，终于制成“八号”止血药粉。还分别用人血、动物血（狗血）进行了离体试验。结果证明，一般动脉出血，在四十秒钟到二分钟内，最短在二十五秒钟内即可止住；肝脾出血（动物试验三十二次）十至十五秒钟即可止住；皮下软组织微血管出血，敷上药粉，立即见效。

【来源】 昆明军区后勤卫生部：为打仗，勇于实践创新方——0283部队卫生队应用中草药接骨、止血试验初步获得成功，1970年5月。

【处方】 外用止血粉：赤石脂八份、五倍子六份、松香六份。

【主治】 止血。

【用法】 撒布创面。

【疗效】 离断狗股动静脉，将药粉撒布创面20—40秒钟止血，五分钟后经较强烈运动仍无出血。狗肝刺破实验，刺破长5cm，二十秒钟止血，切除组织3×5cm，二十秒钟止血。

【来源】 昆明军区〇二七七部队。转摘昆明部队中草药展览会，1970年5月。

【处方】 小白药：止血接骨藤（接骨丹）。

【主治】 止血。

【用法】 中层根皮晒干碾粉备用，将药粉撒布出血创面。

【疗效】 作了六次动物实验（羊颈动脉、狗肠系膜动脉、兔股动脉），止血时间2—3分钟。应用门诊50多例外伤出血，效果良好。

【来源】 昆明军区三五一部队卫生所。转摘昆明部队中草药展览会，1970年5月。

【处方】 铁马尾。别名脆骨莲。

【主治】 外伤出血。

【用法】 内服，或撒于伤口外敷。

【疗效】 用于3例创伤出血，治疗效果良好。又内服治疗肺咯血2例，有效。动物试验，全切断狗右侧股动脉，用此药口嚼烂外敷伤口，30—40秒钟止血，包扎后该狗能自由行走，四天后伤口愈合。

【来源】 广东省从化县良口公社达溪大队卫生站。

【处方】 止血驳骨散：石射香晒干研末。

【主治】 外伤出血。

【用法】 取药粉撒于伤口，包扎即可。

【疗效】 刀伤70余例，均获良效。

【来源】 广东省惠东县人民卫生服务站。

【处方】 保康止血粉：土龙骨（干燥研末）。

【主治】 止血。

【用法】 外敷。

【疗效】 狗股动脉切开2分钟止血。

【来源】 湖北省保康县。转摘湖北省中草药展览会，1970年6月。

【处方】 恩施二号：生半夏100克，明胶10克。

【主治】 止血。

【用法】 外敷。

【疗效】 狗股动脉切开3分钟止血。

【来源】 湖北省恩施县。转摘湖北省中草药展览会，1970年6月。

【处方】 宜昌止血粉：胡麻仁、血砂莲各等份。晒干研末。

【主治】 止血。

【用法】 外敷。

【疗效】 兔腹主动脉切开，36秒止血，肝叶部份切除16—28秒止血。

【来源】 湖北省宜昌市。转摘湖北省中草药展览会，1970年6月。

【处方】 稀归止血粉：老虎台衣花。晒干研末。

【主治】 止血。

【用法】 外敷。

【疗效】 兔腹主动脉切开11秒止血，肝叶22—26秒止血。

【来源】 湖北省秭归县。转摘湖北省中草药展览会，1970年6月。

【处方】 利川止血粉：半截烂，仙鹤草，生龙骨，见血飞，皮血屯，蒲黄，白三七，陈石灰。金毛狗脊各等分研末。

【主治】 止血。

【用法】 外敷。

【疗效】 狗股动脉切开2分钟止血。

【来源】 湖北省利川县。转摘湖北省中草药展览会，1970年6月。

【处方】 八角茴、臭椿树皮（研末）。

【主治】 止血。

【用法】 外敷。

【疗效】 山羊股动脉切开2分钟止血。

【来源】 湖北省郧阳县。转摘湖北省中草药展览会，1970年6月。

【处方】 白芨1两，研细末。

【主治】 适用于各种内出血，如呼吸道、消化道出血，妇女崩漏，外伤，尿血等。

【用法】 每次1—2钱，温水冲服。外伤以粉压迫包扎，鼻

衄以粉吹入鼻腔用棉花塞鼻孔。

【疗效】 经中医药研究小组介绍，止血疗效显著。

【来源】 安徽省革委会生产指挥组卫生小组中医药研究小组：中草药方选编，1969年8月。

【处方】 生白附子二两，白芷一两，天麻一两，南星一两，防风一两，羌活一两。

【主治】 用于治疗各种外伤出血，并能治疗各种内伤及防治破伤风。

【用法】 共研细末，外敷压迫，用纱布包扎止血，结痂时除去。内伤疼痛者用温开水冲服，每日二次，每次5分—1钱。

【疗效】 经中医药研究小组介绍，疗效好，常用方。

【来源】 安徽省革委会生产指挥组卫生小组中医药研究小组：中草药方选编，1969年8月。

【处方】 吐血莲。

【主治】 内出血。

【用法】 吐血莲一株晒干研粉，开水冲服。

【疗效】 本品用于各种内出血13例均在一天内止血。

【来源】 湖北省麻城县。转摘湖北省中草药展览会。1970年6月。

【处方】 活血莲三至八片叶。

【主治】 内出血。

【用法】 同瘦肉炖，吃肉汤。

【疗效】 对各种内出血立即见效。

【来源】 湖北省通城县。转摘湖北省中草药展览会，1970年6月。

【处方】 刘寄奴。煎成水剂。

【主治】 止血。

【用法】 外敷。

【疗效】 狗股动脉出血，用棉球蘸药水按之，4分半钟止血。

【来源】 武汉医学院附一医院，1970年2月。

【处方】 玉珍散。

【主治】 止血。

【用法】 外敷。

【疗效】 狗股动脉出血，用药粉按之，3分钟止血。止血后用酒精擦去粉末，亦未出血。

【来源】 武汉医学院附一医院，1970年2月。

【处方】 马勃粉。

【主治】 再生障碍性贫血之鼻出血，宫颈癌出血，及一般出血。

【用法】 外用。

【疗效】 为民间常用方，经有关医院试用疗效良好。

【来源】 安徽医学院小分队，1970年4月。

【处方】 鲜马兰根二两。

【主治】 鼻衄。

【用法】 每日煎服二两，当茶饮之。

【疗效】 连服20日，可以根治，不易复发。

【来源】 安徽省立医院：临床验方汇编，1970年3月。

中 草 药 处 方 选

镇 痛、麻 醉 药

【处方】 七叶莲。系百合科, Paris Polyphylla Sm. 又名七叶一支花等。

【主治】 止痛。癌症疼痛, 或手术后疼痛等。

【用法】 煎服, 或注射。

【疗效】 广西壮族自治区人民医院应用七叶莲治疗六十多种疾病或手术引起的疼痛, 共治疗271例, 其中疗效显著的220例, 占81%, 疗效良好的38例, 占14%, 无效的13例, 占5%。许多癌症病人本来需注射杜冷丁止痛, 服用七叶莲之后, 疼痛减轻, 能入睡了。

【来源】 广西壮族自治区人民医院: 中草药“七叶莲”临床试用小结。1970年。

【处方】 鸭脚莲。又名土牛藤、假荔枝。系木通科野木瓜属藤本植物。

【主治】 各种疾病引起的疼痛。如肿瘤, 腰酸痛, 骨折, 溃疡病, 胆石症, 风湿性关节炎, 胸膜炎等。

【用法】 痛时服用, 用量如下:

煎 剂: 干草药一至三钱。

干糖浆: 0.3克至3克 (1克相当草药一钱)

片 剂: 3—4片 (每片0.3克, 相当草药0.3钱)。

胶囊：与片剂同。

【疗效】 用于101例各种痛症，显著51例(50.5%)，良好42例(41.5%)，无效8例(8.0%)。有三例癌症病人过去每天要注射杜冷丁或吗啡止痛，改为服用鸭脚莲后，就能安静入睡。

【来源】 广州市第一人民医院：鸭脚莲及其制剂对101例临床镇痛疗效观察，1970年3月。

【处方】 701注射液。

【主治】 止痛。如对癌症疼痛，胃痛，肠绞痛，头痛，胆道蛔虫、风湿痛等。

【用法】 痛时注射2毫升。

【疗效】 有强烈止痛作用，生效快(5—15分钟)，持续时间长(4—7小时)。用于82例，各种疾病之疼痛，有效率为90%，且效果赛过杜冷丁，无毒性和副作用，不成瘾。

【来源】 广州市从化县良口卫生院，从化县卫生战线革委会：利用中草药“701”提制癌肿止痛针剂，1970年6月。

【处方】 两面针。系芸香科花椒属(*Zanthoxylum nitidum* (Roxb) DC.) 别名入地金牛、山椒，野花椒。制成了三种剂型：表面麻醉一号，表面麻醉二号，表面麻醉三号。

【主治】 在口腔科用作表面麻醉剂，代替氯化烷。

【用法】 用小棉球蘸药液少许，放于需要进行手术的牙龈的周围或脓肿的表面上，由病人自咬棉球一、二分钟后进行手术。

【疗效】 用一、二、三号两面针制剂作为表面麻醉剂拔牙