

国家执业药师资格考试指导用书

药学综合知识与技能

YAOXUEZONGHEZHISHIYUJINENG

考前冲刺试卷及解析

KAOQIANCHONGCISHIYUANJIIJIEXI

韩英华 刘雪英 王庆伟 主编

紧扣最新大纲

详析解题思路

预测命题趋势



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

国家执业药师资格考试指导用书

药学专业知识（一）考前冲刺试卷及解析

药学专业知识（二）考前冲刺试卷及解析

药学综合知识与技能考前冲刺试卷及解析

药事管理与法规考前冲刺试卷及解析

对于本套丛书存在的不足或错误，请将您的意见发送到info@pmmp.com.cn

策划编辑 郭伟疆
封面设计 金蜗牛工作室

销售分类 医药类考试用书

ISBN 978-7-5091-0519-1



9 787509 105191 >

定价：28.00元

国家执业药师资格考试指导用书

药学综合知识与技能

YAOXUE ZONGHE ZHISHI YU JINENG

考前冲刺试卷及解析

KAOQIAN CHONGCI SHIJUAN JI JIEXI

主 编	韩英华	刘雪英	王庆伟
副主编	王巧峰	胡玉珍	孙岩君



人 民 军 医 出 版 社

People's Military Medical Press

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

药学综合知识与技能考前冲刺试卷及解析/韩英华, 刘雪英, 王庆伟主编. —北京: 人民军医出版社, 2007. 6

国家执业药师资格考试指导用书

ISBN 978-7-5091-0519-1

I. 药... II. ①韩... ②刘... ③王... III. 药理学-药剂人员-资格考核-解题 IV. R9-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 054732 号

策划编辑: 郭伟疆

文字编辑: 于海平 石立勇

责任审读: 余满松

出版人: 齐学进

出版发行: 人民军医出版社

经销: 新华书店

通信地址: 北京市 100036 信箱 188 分箱

邮编: 100036

电话: (010) 66882586 (发行部)、51927290 (总编室)

传真: (010) 68222916 (发行部)、66882583 (办公室)

网址: www.pmmp.com.cn

印刷: 北京国马印刷厂

装订: 京兰装订有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 12 字数: 271 千字

版、印次: 2007 年 6 月第 1 版第 2 次印刷

印数: 9001~11000

定价: 28.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书, 凡有缺、倒、脱页者, 本社负责调换

电话: (010) 66882585、51927252

2007 年执业药师资格考试大纲最新变化分析

为加强执业药师职业资格准入控制,适应执业药师由过去以药物为中心转向以病人为中心,以提供药品为主逐渐转向以提供药学保健服务为主的工作重点转变,国家食品药品监督管理局组织有关方面的权威专家、学者和资深执业药师,遵照以用定考的原则,依据执业药师岗位职责实际需要的知识、技术和能力,制定了 2007 年版《考试大纲》。

2007 年版《考试大纲》的考试科目较前版没有变动。但其在体例以及内容、要求方面都做了不同程度的变动。比较突出的变化有:

一、调整了编写体例,采用表格式。具体列出了考试内容细目与要点反映考试标准、考核范围与要求,使考生更明确考试内容的层次和重点。

二、取消了掌握、熟悉、了解的程度要求。2007 年版《考试大纲》所列考试内容都是要求掌握并属于考试命题的范围。

三、强调了考试科目实用性知识与技能的要求,增加了与执业药师执业活动关系密切、实用性强的内容。如临床常见病症的药物治疗和中药常见病辨证论治的内容;中药合理应用及药物制剂的配伍变化、性状或药名相似易混常用中药材和中药饮片的对比鉴别等内容。

四、更注重理论与实践的结合,增加必要的医药基本理论、基本知识的内容。如与药物治疗有关的一些医学基础知识、临床常用辅助检查和用药安全知识的内容;药学服务的内涵和服务规范等内容。

五、注意了学科之间的协调与衔接。如药理学和药物化学在药物的分类及品种的选择上采取了相对统一的编排次序;药剂学和药物分析都增加了生物制品的有关内容;药事管理与法规科目明确了管理知识与法规之间考试要点的衔接,突出了执业药师依法执业的要求。

六、删除了与执业药师执业活动关系不密切的内容。如涉及学科含义、性质、任务、意义、发展历程及一些制剂生产设备、不常用的分析方法等内容。

七、解决了同一科目中考点或不同科目之间考点的交叉与重复。

总之,2007 年版《考试大纲》在内容上更注重了理论与实践的结合,强调了实用性。在形式上调整了编写体例和程度要求,采用表格反映考试的内容,使考试内容的层次更清晰,考试要点更突出。因此考试大纲规范、严谨、清晰、实用,对考生更具有指导作用。

前言

QIAN YAN

本套丛书依据 2007 年 4 月公布的最新考试大纲和国家食品药品监督管理局执业药师资格认证中心的《应试指南》编写的,适用于申请执业药师(西药)资格考试的考生复习应试。

本套丛书包括《药事管理与法规考前冲刺试卷及解析》、《药专业知识(一)考前冲刺试卷及解析》、《药专业知识(二)考前冲刺试卷及解析》和《药综合知识与技能考前冲刺试卷及解析》共 4 本,每本书按国家执业药师资格考试真题试卷的结构、全新题型、赋分标准和难度设计了 10 套模拟试卷,并附有参考答案及详细的解析。试题内容严格按 2007 年考试大纲的范围和深度编写,并将考点内容融入答案解析中,保持了复习的系统性和完整性。针对性强、重点突出,使考生有的放矢地进行考前自测训练,熟悉大纲要求的全部知识点和题型,在有限的时间内,提高复习效率,帮助考生顺利通过执业药师资格考试。

国家执业药师资格考试试卷设有 A、B、X 三种题型共 140 道题:A 型题即最佳选择题,有 5 个备选答案,其中只有一个最佳答案;B 型题即配伍选择题,共用一组备选答案(共 5 个),备选答案在前,试题在后,每题只有一个正确答案,每个备选答案可重复选用,也可不被选用;X 型题即多项选择题,五个备选答案中有两个或两个以上的正确答案。

本套丛书作者为资深考试辅导专家组成的编写团队,作者凭借其对执业药师资格考试的多年研究,总结教学和考试辅导经验,为考生提供了全新高效的针对性极强的复习备考方案。

本书的编写,参考了近年来出版的有关图书,在此表示衷心的感谢!

本书难免存在不足和疏漏,敬请广大读者批评指正,以便进一步修改和完善。

本书编写组

2007 年 6 月

目 录

MU LU

前 言

考前冲刺试卷(一)	1
答案与解析	13
考前冲刺试卷(二)	20
答案与解析	32
考前冲刺试卷(三)	39
答案与解析	51
考前冲刺试卷(四)	57
答案与解析	69
考前冲刺试卷(五)	76
答案与解析	88
考前冲刺试卷(六)	95
答案与解析	107
考前冲刺试卷(七)	114
答案与解析	126
考前冲刺试卷(八)	132
答案与解析	144
考前冲刺试卷(九)	150
答案与解析	162
考前冲刺试卷(十)	168
答案与解析	180

考前冲刺试卷(一)

一、A 型题(最佳选择题)共 40 题,每题 1 分。每题的备选答案中只有一个最佳答案。

1. 全球药师共同追求的目标是
 - A. 以患者为中心的药学服务
 - B. 实施全程化的药学服务
 - C. 及时保障药品的临床供给
 - D. 提高药师在医疗体系中的地位
 - E. 参与临床用药实践,促进合理用药
2. 处方具有的意义是
 - A. 具有法律性、技术性和经济性
 - B. 具有法律性和技术性
 - C. 技术性和经济性
 - D. 社会性和经济性
 - E. 社会性和技术性
3. 若某药的成人剂量是每次 500mg,那么一个体重 35kg 的儿童按体表面积计算每次服用剂量为
 - A. 350mg
 - B. 250mg
 - C. 200mg
 - D. 400mg
 - E. 150mg
4. 药师在审查处方过程中发现处方中有不利于患者用药之处时,则
 - A. 可直接配发药品
 - B. 应由处方医师重新修改后配发
 - C. 应由发药药师修改商品名后配发
 - D. 应由执业药师修改商品名后配发
 - E. 应由主任医师修改商品名后配发
5. 处方调配的顺序是
 - A. 收方→划价→收费→调配→发药
 - B. 收方→审方→收费→调配→发药
 - C. 收方→划价→调配→核查→发药
 - D. 划价→收费→审方→调配→发药
 - E. 划价→收费→审方→调配→审方→发药
6. 以下比较适宜餐前服用的是
 - A. 胃复安
 - B. 二甲双胍
 - C. 吡罗昔康
 - D. 液体石蜡
 - E. 乙胺丁醇
7. 下列哪种药小儿的用量可相对偏大
 - A. 苯巴比妥
 - B. 安钠咖
 - C. 氨茶碱
 - D. 哌替啶
 - E. 吗啡
8. 具备何种条件方可从事处方调剂工作
 - A. 经过药学历学专业技术培训并取得合格证者
 - B. 执业药师资格并经注册
 - C. 取得药学历学专业技术资格者
 - D. 药师以上职称者
 - E. 具有药学历学本科以上学历者



9. 艾滋病的临床分期为
- A. 二期
B. 三期
C. 四期
D. 五期
E. 七期
10. 下列哪项不属于药物经济学研究要收集的效果资料
- A. 特定时间段的就诊、急诊或就医次数
B. 各种生物学检品的检验结果
C. 心理、健康咨询费
D. 每年病情发作或恶化次数
E. 存活时间
11. 2 型肥胖型糖尿病患者, 经饮食和运动治疗未达标者, 首选
- A. 格列喹酮
B. 吡格列酮
C. 二甲双胍
D. 瑞格列奈
E. 阿卡波糖
12. 宜睡前服用的药物是
- A. 沙丁醇胺
B. 维生素 B₂
C. 肾上腺皮质激素
D. 氢氯噻嗪
E. 吡哌美辛
13. 一般新生儿不宜采用的给药方法是
- A. 口服给药
B. 肌肉或皮下注射给药
C. 静脉注射
D. 静脉滴注
E. 静脉恒速滴注
14. 以下引起小儿“灰婴综合征”的药物是
- A. 卡那霉素
B. 氯霉素
C. 磺胺嘧啶
D. 庆大霉素
E. 新生霉素
15. 可导致老年人肠道菌群失调或真菌感染等严重并发症的是
- A. 大量长期应用降糖药
B. 大量长期应用抗胆碱药
C. 大量长期应用利尿药
D. 大量长期应用广谱抗生素
E. 大量长期应用抗心律失常药
16. 老年人长期应用可以引起抑郁症的是
- A. 安定
B. 维生素 C
C. 青霉素
D. 吡哌美辛
E. 甲氟米胍
17. 新生儿应用维生素 K 可以导致
- A. 核黄疸
B. 高胆红素血症
C. 医源性高糖血症
D. 新生儿溶血
E. 灰婴综合征
18. 发热退热时用的处方药是
- A. 对乙酰氨基酚
B. 20% 安乃近溶液



- C. 布洛芬
E. 贝诺酯
19. 医师处方中表示右眼的缩写字母是
A. ED
C. O. I.
E MFD
- D. 阿司匹林
B. LD
D. O. D.
20. 蛔虫病适宜选用的非处方药是
A. 硫酸铝
C. 喘定
E. 左旋咪唑
- B. 甲苯达唑
D. 硝酸咪康唑
21. 与口服避孕药合用,可以导致避孕失败的药物是
A. 苯妥英钠
C. 氯霉素
E. 咪唑类抗真菌药
- B. 西咪替丁
D. 异烟肼
22. 解热药、抗感冒药的非处方药多含有对乙酰氨基酚,应慎用于
A. 3 岁以下儿童
C. 14 岁以下儿童
E. 18 岁以下
- B. 12 岁以下儿童
D. 16 岁以下
23. IV 期临床试验的样本数常见病应不少于
A. 300 例
C. 100 例
E. 10 000 例
- B. 20~30 例
D. 2 000 例
24. 因具有心血管不良作用而撤出市场的药物是
A. 欣弗
C. 己烯雌酚
E. 罗非昔布
- B. 沙利度胺
D. 西立伐他汀
25. 以下属于药品在上市后的临床应用过程中开发的新适应证有
A. 异丙嗪用于抗组胺
C. 金刚烷胺用于抗帕金森病
E. 三环类抗抑郁药用于镇静
- B. 普萘洛尔用于抗心律失常
D. 阿司匹林用于解热镇痛
26. 可以评价药物临床地位的指标是
A. 限定日剂量
C. 限定日剂量和药物利用指数
E. 药物警戒
- B. 药物利用指数
D. 用药频度分析
27. 可致孕妇所生女婴成年后发生阴道腺癌的药物是
A. 沙利度胺
C. 氮芥
E. 甲氨蝶呤
- B. 己烯雌酚
D. 吗啡



28. 用于严重感染和各种休克时,糖皮质激素采用
 - A. 大剂量突击疗法
 - B. 一般剂量长期疗法
 - C. 小剂量替代疗法
 - D. 隔日疗法
 - E. 小剂量长期疗法
29. 非肥胖型糖尿病患者应首选
 - A. 二甲双胍
 - B. 阿卡波糖
 - C. 格列奇特
 - D. 罗格列酮
 - E. 那格列奈
30. 下列不属于口服抑酸药的是
 - A. 法莫替丁
 - B. 硫糖铝
 - C. 奥美拉唑
 - D. 哌仑西平
 - E. 丙谷胺
31. 下列说法正确的是
 - A. 糖尿病共有 2 种类型,即 1 型糖尿病和 2 型糖尿病
 - B. 老年糖尿病人大多数为 1 型糖尿病
 - C. 2 型糖尿病是因胰岛 β 细胞受损而引起的胰岛素缺乏或分泌不足
 - D. 2 型糖尿病是非胰岛素依赖型,可以分为肥胖和非肥胖型
 - E. 1 型糖尿病人的血液中检测不到自身的抗休
32. 影响血液药物浓度的生理因素是
 - A. 年龄、性别、生物因素
 - B. 年龄、性别、肥胖、其他
 - C. 年龄、性别、生活环境、其他
 - D. 遗传、年龄、肥胖、其他
 - E. 年龄、性别、遗传、肥胖和其他
33. 两药联用可以影响药物分布的是
 - A. 酮康唑与辛伐他汀联用
 - B. 阿司匹林与磺酰脲类降糖药合用
 - C. 青蒿素与乙胺嘧啶联用
 - D. 普萘洛尔与阿托品联用
 - E. 丙磺舒与青霉素联用
34. 下面属于药酶抑制药的是
 - A. 苯巴比妥
 - B. 利福平
 - C. 大环内酯类抗生素
 - D. 苯妥英钠
 - E. 乙醇
35. 可能与华法林相互作用的植物药不包括
 - A. 银杏
 - B. 人参
 - C. 育亨宾
 - D. 丹参
 - E. 当归
36. 中毒药物进入体内应洗胃的时间是
 - A. 12h 内
 - B. 24h 内
 - C. 4~6h
 - D. 48h 内
 - E. 4~10h



37. 主要用于吗啡、哌替啶急性中毒的解毒剂是
 A. 青霉胺 B. 亚甲蓝
 C. 双复磷 D. 纳洛芬
 E. 亚硝酸钠
38. 以下哪种药品易受温度的影响而变质
 A. 肝素 B. 氨茶碱
 C. 维生素 C 泡腾片 D. 诺氟沙星
 E. 甘油栓
39. 药物经济学中的成本是指在实施某一药物治疗方案或其他治疗方案的这个过程中所投入的
 A. 全部财力资源 B. 全部人力资源
 C. 全部物质资源 D. 全部财力和物质资源
 E. 全部财力、物质和人力资源
40. 电子血压计允许脉搏数的误差是
 A. 1% B. 2%
 C. 5% D. 8%
 E. 10%

二、B型题(配伍选择题)共 80 题,每题 0.5 分。备选答案在前,试题在后。每组若干题,每组题均对应同一组备选答案,每题只有一个正确答案。每个备选答案可重复选用,也可不选用。

[41~45]

- A. 信息沟通能力 B. 书写药历
 C. 投诉应对能力 D. 药历
 E. 关注特殊人群
41. 是药师进行规范化药学服务的具体体现
 42. 是客观记录患者用药史和药师为保证患者用药安全、有效、经济所采取的措施
 43. 是与患者沟通应掌握的一种技巧
 44. 是开展药学服务工作的关键,可使患者获得有关用药的指导,减少药疗事故的发生
 45. 是开展药学服务的更高能力要求,可代替药师的服务,增进患者对药师的信任

[46~47]

- A. 3 日量 B. 7 日量
 C. 2 周 D. 1 个月
 E. 3 个月
46. 急诊处方应开
 47. 一般门诊处方应开

[48~52]

- A. ARC B. HIV
 C. AIDS D. COCKTAIL THERAPY



E. HARRT

48. 高活性抗逆转录酶病毒联合疗法

49. 艾滋病相关综合征者

50. 获得性免疫缺陷综合征

51. 人类免疫缺陷病毒

52. 鸡尾酒疗法

[53~57]

下列检查结果可见于

A. 白细胞减少

B. 白细胞生理性增多

C. 白细胞病理性增多

D. 嗜酸性粒细胞增多

E. 嗜碱性粒细胞增多

53. 风疹、肝炎等病毒感染时

54. 荨麻疹

55. 哺乳期妇女

56. 脾切除术后

57. 催眠药急性中毒

[58~60]

A. 青霉素与氨基糖苷类抗生素合用

B. 异烟肼与维生素 B₆ 合用

C. 利福平与乙胺丁醇合用

D. 依那普利与二甲双胍的联合应用

E. 普萘洛尔与氨酰心安合用治疗高血压

58. 属于增强疗效的是

59. 属于降低毒性和减少副作用的联合用药

60. 属于延缓耐药性发生的

[61~65]

A. 高钙血症

B. 牙釉质发育不良

C. 雷耶综合征

D. 核黄疸

E. 医源性高血糖

61. 儿童病毒性感冒使用阿司匹林退热可引起

62. 新生儿使用吡哆美辛易出现

63. 治疗儿童佝偻病时长期大量使用鱼肝油丸可引起

64. 新生儿长期大量输注葡萄糖可引起

65. 儿童使用四环素可引起

[66~67]

A. 雄激素

B. 四环素

C. 喹诺酮类药物

D. 麦角胺

E. 利尿药

66. 长期应用使骨骼闭合过早,影响小儿生长和发育的药物是

67. 可以引起子宫强直性收缩,胎盘娩出之前应用可引起胎儿窒息死亡的药物是



[68~72]

- | | |
|----------|----------|
| A. 细菌性感染 | B. 病毒性感染 |
| C. 化脓性感染 | D. 肺炎 |
| E. 伤寒 | |

68. 血常规检查白细胞计数高于正常值,可能有

69. 血常规检查白细胞计数低于正常值,可能有

70. 持续高热、伴寒战、胸痛、咳嗽、吐铁锈痰,可能为

71. 起病缓、稽留热、无寒战、玫瑰疹、肝脾大,可能为

72. 有间歇发作的寒战、高热、可能是

[73~75]

- | | |
|---------|---------|
| A. 异丙嗪 | B. 阿司匹林 |
| C. 甲苯达唑 | D. 硼酸 |
| E. 异烟肼 | |

73. 对血友病或血小板减少症患者禁用,否则有可能导致严重出血等不良反应的药物是

74. 新生儿外用可能引起中毒而须慎用的药物是

75. 用于蛔虫病、蛲虫病,孕妇及未满2岁的幼儿禁用的药物是

[76~78]

- | | |
|------------|-----------|
| A. 阿苯片 | B. 氯美扎酮 |
| C. 甲苯达唑 | D. 盐酸氯丙那林 |
| E. 苯甲酸复方制剂 | |

76. 用于手足癣、体股癣、手足皲裂的是

77. 用于镇静催眠的是

78. 主要用于小儿退热、预防发热所致痉挛的是

[79~81]

- | | |
|---------|-----------|
| A. 阿司匹林 | B. 对乙酰氨基酚 |
| C. 咪康唑 | D. 环孢素 |
| E. 抗酸药 | |

79. 与四环素合用,可致吸收减少,导致治疗失败的是

80. 与普伐他汀合用,可以增加普伐他汀血药浓度的是

81. 与西沙必利合用,可能增加心脏毒性的是

[82~85]

下列情况可出现于

- | | |
|-----------|-----------|
| A. 尿酸碱度增高 | B. 尿酸碱度减少 |
| C. 尿比重增高 | D. 尿比重降低 |
| E. 假性蛋白尿 | |

82. 失钾性代谢性碱中毒时

83. 代谢性或呼吸性碱中毒

84. 泌尿系统感染时



85. 急性肾小球肾炎

[86~90]

A. 匹维溴铵

B. 洛哌丁胺

C. 庆大霉素

D. 黄连素

E. 阿昔洛韦

86. 以腹泻为主要症状的 IBS, 可选用

87. 对痢疾、大肠杆菌感染的轻度急性腹泻首选

88. 对细菌感染的急性腹泻首选

89. 急慢性功能性腹泻首选

90. 病毒性腹泻应选用

[91~93]

A. 组胺 H_2 受体拮抗药

B. 质子泵抑制药

C. 胃黏膜保护药

D. 抗酸药

E. 胃泌素受体阻断药

91. 丙谷胺

92. 兰索拉唑

93. 米索前列醇

[94~97]

A. 磺胺药

B. 别嘌呤醇

C. 氯霉素

D. 噻嗪类利尿药

E. 氯贝丁酯

94. 与氯磺丙脲竞争排泄而增强其降糖作用的药物是

95. 与磺酰脲类口服降糖药竞争代谢酶而增加降糖作用的药物是

96. 能抑制肝药酶而增强磺酰脲类口服降糖药降糖作用的药物是

97. 可减少胰岛分泌, 促进糖原分解而减弱磺酰脲类口服降糖药作用的药物是

[98~102]

A. $t_{1/2}$ —药物半衰期

B. K_a —吸收速率常数

C. K_e —消除速率常数

D. V_d —表观分布容积

E. F —生物利用度

98. 衡量药物吸收快慢的药动学参数

99. 与吸收速率常数呈反方向变化的药动学参数

100. 表示体内药量按血药浓度分布所需要的时间

101. 表示体内药量按血药浓度分布所需要的体液容积

102. 表示进入血循环的药物与所给剂量的比值

[103~106]

A. 敏感化现象

B. 促进肌体利用

C. 增加毒性

D. 延缓或降低耐药性

E. 非竞争性拮抗作用



103. 排钾利尿药与强心苷配伍,易产生
 104. 左旋多巴与苄丝肼或卡比多巴合用,可以
 105. 磷霉素与氟喹诺酮类药物合用,可以
 106. 甲氧氯普胺与吩噻嗪类抗精神病药合用可引起

[107~109]

- | | |
|------------|----------------------|
| A. 影响药物的吸收 | B. 影响药物的排泄 |
| C. 影响药物的代谢 | D. 作用于同一作用部位或受体的拮抗作用 |
| E. 敏感化现象 | |

107. 纳洛酮用于吗啡中毒的解救
 108. 口服活性炭用于解毒
 109. 丙磺舒口服可使青霉素药效增强

[110~114]

- | | |
|-----------------------|--------|
| A. 氟马西尼 | B. 亚甲蓝 |
| C. 维生素 K ₁ | D. 阿托品 |
| E. 氯磷定 | |

110. 用于有机磷中毒的解毒剂是
 111. 抢救有机磷酸酯中毒首选使用的药物是
 112. 敌稗、除草佳中毒时,因有发绀现象,特效解毒剂
 113. 苯二氮草类镇静催眠药的特异性治疗药物是
 114. 香豆素类杀鼠药中毒,特效解毒剂是

[115~117]

- | | |
|-----------|---------|
| A. 阿托品 | B. 毒扁豆碱 |
| C. 毛花苷丙 | D. 利多卡因 |
| E. 盐酸烯丙吗啡 | |

115. 苯妥英钠严重中毒者出现呼吸抑制时应静注
 116. 三环类抗抑郁药中毒发生心律失常时可用
 117. 阿托品中毒时忌用

[118~120]

- | | |
|---------|--------|
| A. 胃蛋白酶 | B. 明矾 |
| C. 肾上腺素 | D. 青霉素 |
| E. 苦味胺 | |

118. 易风化的药品
 119. 易引湿的药品
 120. 易水解的药品

三、X 型题(多项选择题)共 20 题,每题 1 分。每题的备选答案中有 2 个或 2 个以上正确答案。少选或多选均不得分。

121. 下列说法正确的是

- A. 药学服务最基本的要素是“与药物有关”的“服务”



- B. 药学服务所涉及的患者包括住院患者、门诊患者及社区患者
C. 药学服务的社会属性主要表现在其服务于治疗性用药、预防性用药及保健性用药
D. 人类疾病谱的变化以及人们对提高生命质量的期望是实施药学服务的前提
E. 以患者为中心的药学服务是全球药师共同追求的目标
122. 药学服务的具体工作内容包括
A. 处方调剂
B. 治疗药物监测
C. 参与健康教育
D. 提供药学信息服务
E. 药品不良反应监测及报告
123. 嗜酸性粒细胞增多可见于
A. 过敏性疾病患者
B. 皮肤病与寄生虫病患者
C. 慢性粒细胞性白血病
D. 长期应用肾上腺皮质激素者
E. 严重烧伤患者
124. 肝功能不全的病人服用时, 药理活性降低的药物是
A. 阿司匹林
B. 可待因
C. 普萘洛尔
D. 依那普利
E. 环磷酰胺
125. 葡萄糖注射液的作用有
A. 营养作用
B. 利尿作用
C. 补充电解质作用
D. 强心作用
E. 解毒作用
126. 下列哪些情况可引起红细胞沉降率增快
A. 风湿病
B. 心肌梗死
C. 良性肿瘤
D. 恶性肿瘤
E. 系统性红斑狼疮
127. 以下有关解热镇痛药, 说法正确的是
A. 两次用药应间隔 4~6 小时
B. 解热时, 应大量饮水和及时补充电解质
C. 此类药物中大多数彼此之间有交叉过敏反应
D. 不宜同时应用两种以上的解热镇痛药
E. 解热镇痛药用于镇痛不超过 3 天, 用于解热不超过 5 天, 高热持续不退时, 应即就诊
128. 与腺酶同服, 可使腺酶疗效增加的是
A. 稀盐酸
B. 碳酸氢钠
C. 西咪替丁
D. 活性炭
E. 抗菌药
129. 以下说法正确的是
A. 足癣可分为间擦型、水疱型、鳞屑型、角化型 4 种类型
B. 足癣可分为间擦型、水疱型、鳞屑型、角化型、体癣型 5 种类型
C. 对有化脓感染的足癣者, 应使用抗菌药物控制感染后再治疗足癣