


农作物种质资源技术规范丛书

青麻种质资源 描述规范和数据标准



Descriptors and Data Standard for Velvetleaf
(*Abutilon avicennae* Gaertner)

栗建光 戴志刚 等 编著

 中国农业出版社

国家自然资源资源共享平台项目资助.....

农作物种质资源技术规范丛书 (3-7)

青麻种质资源描述规范和数据标准

Descriptors and Data Standard for Velvetleaf

(*Abutilon avicennae* Gaertner)

栗建光 戴志刚 等 编著

中 国 农 业 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

青麻种质资源描述规范和数据标准/栗建光等编著.
北京: 中国农业出版社, 2007. 9
(农作物种质资源技术规范丛书)
ISBN 978-7-109-11735-8

I. 青… II. 栗… III. ①青麻一种质资源—描写—规范
②青麻一种质资源—数据—标准 IV. S563.602.4-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 108932 号

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)
(邮政编码 100026)
责任编辑 徐建华

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm×1092mm 1/18 印张: 5
字数: 95 千字 印数: 1~1 000 册
定价: 29.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

《农作物种质资源技术规范》

总 编 辑 委 员 会

主 任 董玉琛 刘 旭

副主任 (以姓氏笔画为序)

万建民 王述民 王宗礼 卢新雄 江用文

李立会 李锡香 杨亚军 高卫东

曹永生 (常务)

委 员 (以姓氏笔画为序)

万建民 马双武 马晓岗 王力荣 王天宇

王克晶 王志德 王述民 王玉富 王宗礼

王佩芝 王坤坡 王星玉 王晓鸣 云锦凤

方智远 方嘉禾 石云素 卢新雄 叶志华

白建军 成 浩 伍晓明 朱志华 朱德蔚

刘 旭 刘凤之 刘庆忠 刘威生 刘崇怀

刘喜才 江 东 江用文 许秀淡 孙日飞

李立会 李向华 李秀全 李志勇 李登科

李锡香 杜雄明 杜永臣 严兴初 吴新宏

杨 勇 杨亚军 杨庆文 杨欣明 沈 镛

沈育杰 邱丽娟 陆 平 张 京 张 林

张大海 张冰冰 张 辉 张允刚 张运涛

张秀荣 张宗文 张燕卿 陈 亮 陈成斌

宗绪晓	郑殿升	房伯平	范源洪	欧良喜
周传生	赵来喜	赵密珍	俞明亮	郭小丁
姜全	姜慧芳	柯卫东	胡红菊	胡忠荣
娄希祉	高卫东	高洪文	袁清	唐君
曹永生	曹卫东	曹玉芬	黄华孙	黄秉智
龚友才	崔平	揭雨成	程须珍	董玉琛
董永平	粟建光	韩龙植	蔡青	熊兴平
黎裕	潘一乐	潘大建	魏兴华	魏利青
总审校 娄希祉	曹永生	刘旭		

《青麻种质资源描述规范和数据标准》

编写委员会

主 编 栗建光

副主编 戴志刚

执笔人 栗建光 戴志刚 龚友才 陈基权 白占兵
谢晓美

绘 图 徐建斌

审稿人 (以姓氏笔画为序)

王玉富 邓丽卿 孙家曾 祁建民 李德芳

李爱青 李初英 杨 龙 肖瑞芝 宋小南

陈壬生 周立人 周瑞阳 郁崇文 金关荣

洪建基 黄培坤 程 舟 薛召东

审校人 邓丽卿 郑殿升 曹永生

《农作物种质资源技术规范》

前 言

农作物种质资源是人类生存和发展最有价值的宝贵财富，是国家重要的战略性资源，是作物育种、生物科学研究和农业生产的物质基础，是实现粮食安全、生态安全与农业可持续发展的重要保障。中国农作物种质资源种类多、数量大，以其丰富性和独特性在国际上占有重要地位。经过广大农业科技工作者多年的努力，目前已收集保存了 38 万份种质资源，积累了大量科学数据和技术资料，为制定农作物种质资源技术规范奠定了良好的基础。

农作物种质资源技术规范的制定是实现中国农作物种质资源工作标准化、信息化和现代化，促进农作物种质资源事业跨越式发展的一项重要任务，是农作物种质资源研究的迫切需要。其主要作用是：①规范农作物种质资源的收集、整理、保存、鉴定、评价和利用；②度量农作物种质资源的遗传多样性和丰富度；③确保农作物种质资源的遗传完整性，拓宽利用价值，提高使用时效；④提高农作物种质资源整合的效率，实现种质资源的充分共享和高效利用。

《农作物种质资源技术规范》是国内首次出版的农作物种质资源基础工具书，是农作物种质资源考察收集、整理鉴定、保存利用的技术手册，其主要特点：①植物分类、生态、形态，农艺、生理生化、植物保护，计算机等多学科交叉集成，具有创新性；②综合运用国内外有关标准规范和技术方法的最新研究成果，具有先进性；③由实践经验丰富和理论水平高的科学家编审，科学性、系统性和实用性强，具有权威性；④资料翔实、结构严谨、形式新颖、图文并茂，具有可操作性；⑤规定了粮食作物、经济作物、蔬菜、果树、牧草绿肥等五大类 100 多种作物种质资源的描述规范、数据标准和数据质量控制规范，以及收集、整理、保存技术规程，内容丰富，具有完整性。

《农作物种质资源技术规范》是在农作物种质资源 50 多年科研工作的基础上，参照国内外相关技术标准和先进方法，组织全国 40 多个科研单位，500 多名科技人员进行编撰，并在全国范围内征求了 2 000 多位专家的意见，召开了近百次专家咨询会议，经反复修改后形成的。《农作物种质资源技术规范》按不同作物分册出版，共计 100 余册，便于查阅使用。

《农作物种质资源技术规范》的编撰出版，是国家自然资源资源共享平台建设的重要任务之一。国家自然资源资源共享平台项目由科技部和财政部共同立项，各资源领域主管部门积极参与，科技部农村与社会发展司精心组织实施，农业部科技教育司具体指导，并得到中国农业科学院的全力支持及全国有关科研单位、高等院校及生产部门的大力协助，在此谨致诚挚的谢意。由于时间紧、任务重、缺乏经验，书中难免有疏漏之处，恳请读者批评指正，以便修订。

总编辑委员会

前 言

青麻 (Velvetleaf) 是锦葵科 (Malvaceae) 芙蓉属 (*Abutilon* Miller) 一年生草本植物, 重要的韧皮纤维作物, 学名 *Abutilon avicennae* Gaertner, 别名苘麻、白麻、苘麻、芙蓉麻等。青麻生长周期短, 生长快, 植株高大, 耐环境胁迫和抗病虫力强, 生态适应性广。青麻纤维强力较大、吸湿性好、散水快, 耐腐蚀、耐磨损; 种子可作饲料和入药, 具有清热利湿、消肿等功效。纤维主要用于纺织、民用绳索及建材等, 应用领域较广。

青麻起源于中国和印度西北部, 其野生及近缘植物资源十分丰富, 主要分布于热带及亚热带地区。分布在我国的主要有 *Abutilon avicennae* Gaertner (青麻)、*Abutilon polyandrum* Schlechtendal、*Abutilon indicum* (L.) Sweet、*Abutilon crispum* (L.) Medik、*Abutilon paniculatum* Handel-Mazzetti、*Abutilon gebauerianum* Handel-Mazzetti、*Abutilon sinense* Oliver、*Abutilon asiaticum* Don、*Abutilon roseum* Handel-Mazzetti 等 9 个种。

青麻世界各地都有分布, 主要栽培国家有中国、前苏联、蒙古、日本、埃及和美国。青麻在我国栽培历史悠久, 最早记载见于《诗经》、《周礼》, 距今已有 2 600 多年历史。青麻在 20 世纪以前, 多属农民自种自用, 栽培分散而零碎。到 20 世纪 30~40 年代, 青麻种植才进入商品生产, 1936 年栽培面积达 8 万公顷, 总产纤维 5.3 万吨。1954 年面积达 10 万公顷, 纤维总产 6.4 万多吨, 创历史最高。但是, 由于青麻纤维粗硬且脆, 单产不高, 加之红麻替代其种植, 所以青麻面积、总产逐年下降, 1978 年约 5 万公顷, 总产 2 万吨。目前国内青麻几乎没有商品麻生产, 只有零星的分布, 估计面积约 0.2 万公顷。青麻在我国主要分布在黄河流域及其以北地区, 以辽宁、河北、安徽、山东和河南为主产省, 吉林、黑龙江、江苏、湖北等省次之, 四川、贵州亦有少量栽培。

青麻种质资源是新品种选育、遗传理论研究、生物技术研究 and 农业生产的重要物质基础。我国十分重视青麻种质资源的收集、保存和研究工作。目前,我国已收集青麻种质资源 300 多份,大部分是国内地方品种。经过多年的研究,已安全保存青麻种质资源 120 份,并对其农艺性状进行了初步鉴定,还对部分种质进行了抗病性和品质鉴定评价,筛选出一批丰产、优质、抗病的优良种质。

规范标准是国家自然科技资源平台建设的基础,青麻种质资源描述规范和数据标准的制定是国家农作物种质资源平台建设的重要内容。制定统一的青麻种质资源规范标准,有利于整合全国青麻种质资源,规范青麻种质资源的收集、整理和保存等基础性工作,创造良好的资源和信息共享环境和条件;有利于保护和利用青麻种质资源,充分挖掘其潜在的经济、社会和生态价值,促进全国青麻种质资源研究的有序和高效发展。

青麻种质资源描述规范规定了青麻种质资源的描述符及其分级标准,以便对青麻种质资源进行标准化整理和数字化表达。青麻种质资源数据标准规定了青麻种质资源各描述符的字段名称、类型、长度、小数位、代码等,以便建立统一、规范的青麻种质资源数据库。青麻种质资源数据质量控制规范规定了青麻种质资源数据采集全过程中的质量控制内容和质量控制方法,以保证数据的系统性、可比性和可靠性。

《青麻种质资源描述规范和数据标准》由中国农业科学院麻类研究所主持编写,并得到了全国青麻科研、教学和生产单位的大力支持。在编写过程中,参考了国内外相关文献,由于篇幅所限,书中仅列主要参考文献,在此一并致谢。由于编者水平有限,错误和疏漏之处在所难免,恳请批评指正。

编 著 者

二〇〇七年二月

目 录

前言

一 青麻种质资源描述规范和数据标准制定的原则和方法	1
二 青麻种质资源描述简表	3
三 青麻种质资源描述规范	8
四 青麻种质资源数据标准	26
五 青麻种质资源数据质量控制规范	40
六 青麻种质资源数据采集表	69
七 青麻种质资源利用情况报告格式	72
八 青麻种质资源利用情况登记表	73
主要参考文献	74

一 青麻种质资源描述规范和数据标准制定的原则和方法

1 青麻种质资源描述规范制定的原则和方法

1.1 原则

- 1.1.1 优先采用现有数据库中的描述符和描述标准。
- 1.1.2 以种质资源研究和育种需求为主, 兼顾生产与市场需要。
- 1.1.3 立足中国现有基础, 考虑将来发展, 尽量与国际接轨。

1.2 方法和要求

1.2.1 描述符类别分为6类。

- 1 基本信息
- 2 形态特征和生物学特性
- 3 品质特性
- 4 抗逆性
- 5 抗病虫性
- 6 其他特征特性

1.2.2 描述符代号由描述符类别加两位顺序号组成。如“111”、“207”、“502”等。

1.2.3 描述符性质分为3类。

- M 必选描述符(所有种质都必须鉴定评价的描述符)
- O 可选描述符(可选择鉴定评价的描述符)
- C 条件描述符(只对特定种质进行鉴定评价的描述符)

1.2.4 描述符的代码应是有序的。如数量性状从细到粗、从低到高、从小到大、从少到多排列, 颜色从浅到深, 抗性从强到弱等。

1.2.5 每个描述符应有一个基本的定义或说明。数量性状应指明单位, 质量性状应有评价标准和等级划分。

1.2.6 植物学形态描述符应附模式图。

1.2.7 重要数量性状应以数值表示。

2 青麻种质资源数据标准制定的原则和方法

2.1 原则

2.1.1 数据标准中的描述符应与描述规范相一致。

2.1.2 数据标准应优先考虑现有数据库中的数据标准。

2.2 方法和要求

2.2.1 数据标准中的代号应与描述规范中的代号一致。

2.2.2 字段名最长 12 位。

2.2.3 字段类型分字符型 (C)、数值型 (N) 和日期型 (D)。日期型的格式为 YYYYMMDD。

2.2.4 经度的类型为 N, 格式为 DDDFF; 纬度的类型为 N, 格式为 DDFF, 其中 D 为度, F 为分; 东经以正数表示, 西经以负数表示; 北纬以正数表示, 南纬以负数表示。如 “12136”, “3921”。

3 青麻种质资源数据质量控制规范制定的原则和方法

3.1 原则

3.1.1 采集的数据应具有系统性、可比性和可靠性。

3.1.2 数据质量控制以过程控制为主, 兼顾结果控制。

3.1.3 数据质量控制方法应具有可操作性。

3.2 方法和要求

3.2.1 鉴定评价方法以现行国家标准和行业标准为首选依据; 如无国家标准和行业标准, 则以国际标准或国内比较公认的先进方法为依据。

3.2.2 每个描述符的质量控制包括田间设计, 样本数或群体大小, 时间或时期, 取样数和取样方法, 计量单位、精度和允许误差, 采用的鉴定评价规范和标准, 采用的仪器设备, 性状的观测和等级划分, 数据校验和数据分析。

二 青麻种质资源描述简表

序号	代号	描述符	描述符性质	单位或代码
1	101	全国统一编号	M	
2	102	种质库编号	M	
3	103	引种号	C/国外种质	
4	104	采集号	C/野生资源 和地方品种	
5	105	种质名称	M	
6	106	种质外文名	M	
7	107	科名	M	
8	108	属名	M	
9	109	学名	M	
10	110	原产国	M	
11	111	原产省	M	
12	112	原产地	M	
13	113	海拔	C/野生资源 和地方品种	m
14	114	经度	C/野生资源 和地方品种	
15	115	纬度	C/野生资源 和地方品种	
16	116	来源地	M	
17	117	保存单位	M	
18	118	保存单位编号	M	
19	119	系谱	C/选育品种 或品系	
20	120	选育单位	C/选育品种 或品系	
21	121	育成年份	C/选育品种 或品系	

(续)

序号	代号	描述符	描述符性质	单位或代码
22	122	选育方法	C/选育品种 或品系	
23	123	种质类型	M	1: 野生资源 2: 地方品种 3: 选育品种 4: 品系 5: 遗传材料 6: 其他
24	124	图像	O	
25	125	观测地点	M	
26	201	播种期	M	
27	202	出苗期	M	
28	203	着蕾期	M	
29	204	开花期	M	
30	205	结果期	M	
31	206	工艺成熟期	M	
32	207	种子成熟期	M	
33	208	出苗日数	M	d
34	209	着蕾日数	M	d
35	210	开花日数	M	d
36	211	生长日数	M	d
37	212	生育日数	M	d
38	213	生育类型	M	1: 极早熟 2: 早熟 3: 中熟 4: 晚熟
39	214	子叶形状	M	1: 卵圆 2: 椭圆 3: 长椭圆
40	215	子叶色	M	1: 浅绿 2: 黄绿 3: 绿 4: 深绿
41	216	下胚轴色	O	1: 绿 2: 浅紫 3: 紫
42	217	叶形	M	1: 心脏形 2: 圆形
43	218	叶色	M	1: 浅绿 2: 绿 3: 深绿 4: 浅红
44	219	叶脉色	O	1: 白 2: 绿
45	220	叶毛	O	0: 无 1: 稀少 2: 中等 3: 浓密
46	221	叶片长度	M	cm
47	222	叶片宽度	M	cm

(续)

序号	代号	描述符	描述符性质	单位或代码
48	223	叶面积	M	cm ²
49	224	叶姿	O	1: 直立 2: 水平 3: 下垂
50	225	叶柄色	M	1: 绿 2: 浅紫 3: 紫
51	226	叶柄茸毛	O	1: 稀少 2: 中等 3: 浓密
52	227	叶柄基紫斑	M	0: 无 1: 有
53	228	叶柄长度	M	cm
54	229	托叶	M	0: 无 1: 有
55	230	托叶色	O	1: 绿 2: 红
56	231	叶缘形状	O	1: 钝锯齿 2: 锯齿 3: 波状
57	232	茎毛	M	1: 稀少 2: 中等 3: 浓密
58	233	苗期茎色	M	1: 绿 2: 浅紫 3: 紫
59	234	中期茎色	M	1: 绿 2: 浅紫 3: 紫
60	235	后期茎色	M	1: 绿 2: 紫
61	236	萼片色	M	1: 绿 2: 浅紫
62	237	苞片数	O	个
63	238	花瓣数	M	个
64	239	花冠色	M	1: 橙黄 2: 黄
65	240	柱头色	M	1: 浅绿 2: 绿 3: 黄
66	241	花药色	O	1: 橙黄 2: 黄
67	242	始果位	M	
68	243	蒴果色	M	1: 黄 2: 金黄 3: 黄褐 4: 灰黑 5: 黑
69	244	果片数	O	个
70	245	果毛	O	1: 稀少 2: 中等 3: 浓密
71	246	蒴果开裂	M	1: 开裂 2: 闭合
72	247	种子形状	M	1: 肾形 2: 亚肾形
73	248	种皮色	M	1: 浅灰 2: 灰 3: 灰黑 4: 黑
74	249	种子表面	M	1: 光滑 2: 有毛
75	250	种子硬实	O	0: 无 1: 有

(续)

序号	代号	描述符	描述符性质	单位或代码
76	251	种子千粒重	M	g
77	252	籽粒类型	M	1: 小粒 2: 大粒
78	253	种子发芽率	M	%
79	254	第一分枝节位	O	
80	255	节数	O	个
81	256	节间长度	M	cm
82	257	分枝习性	O	0: 无 1: 弱 2: 中 3: 强
83	258	分枝数	O	个
84	259	分枝高	O	cm
85	260	形态一致性	M	1: 一致 2: 连续变异 3: 非连续变异
86	261	株高	M	cm
87	262	茎粗	M	cm
88	263	鲜皮厚	M	mm
89	264	单株鲜茎重	M	g
90	265	单株鲜皮重	M	g
91	266	单株干皮重	M	g
92	267	单株纤维重	M	g
93	268	鲜茎干皮率	M	%
94	269	干茎出麻率	M	%
95	270	鲜茎出麻率	M	%
96	271	干皮产量	M	kg/hm ²
97	272	纤维产量	M	kg/hm ²
98	301	束纤维支数	M	m/g
99	302	束纤维强力	M	N/g
100	303	纤维柔软度	O	捻/100 mm
101	304	纤维颜色	O	1: 黄白 2: 灰白 3: 青白 4: 银白 5: 黄褐
102	305	纤维光泽	O	1: 富有光泽 2: 有光泽 3: 光泽稍差 4: 光泽暗淡