


中专升大专护理专业备考精要系列

基础护理备考精要
外科护理备考精要
妇产科护理备考精要
儿科护理备考精要

内

内科护理备考精要

丛书主编 李 丹
本书主编 李 丹 张锦辉



辽宁科学技术出版社

中专升大专护理专业备考精要系列

内科护理 备考精要

丛书主编 李 丹

本书主编 李 丹 张锦辉

辽宁科学技术出版社

沈 阳

图书在版编目(CIP)数据

内科护理备考精要 / 李丹, 张锦辉主编. — 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2008.1

(中专升大专护理专业备考精要系列)

ISBN 978-7-5381-5218-0

I.内… II.①李… ②张… III.内科学: 护理学 - 专业学校 - 升学参考资料 IV.R473.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 201471 号

出 版 者: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 29 号 邮编: 110003)

印 刷 者: 沈阳市北陵印刷厂

经 销 者: 各地新华书店

幅面尺寸: 184mm × 260mm

印 张: 10.5

字 数: 160 千字

印 数: 1~4000

出版时间: 2008 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2008 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 伊 雪

封面设计: 刘 枫

版式设计: 于 浪

责任校对: 刘 庶

书 号: ISBN 978-7-5381-5218-0

定 价: 20.00 元

联系电话: 024-23284370

邮购热线: 024-23284502

E-mail: dlgs@mail.lnpgc.com.cn

<http://www.lnkj.com.cn>

中专升大专护理专业备考精要系列 编写委员会

屈年贺 中国医科大学高职学院院长
田 静 辽宁中医药大学护理学院院长
郭 宏 沈阳医学院护理学院院长
林梅英 本溪市卫生学校校长
张新宇 大连医科大学护理学院主任
张锦辉 辽东学院医学院副院长
郭 明 大连医科大学高职学院院长
宋大为 铁岭市卫生学校校长

丛 书 主 编 李 丹

丛书副主编 (以姓氏笔画为序)

丁艳萍 刘 伟 张锦辉
林 敏 屈年贺 满 力

本 书 主 编 李 丹 张锦辉

本书副主编 谭 燕 刘静茹

编 写 人 员 (以姓氏笔画为序)

丁艳丽 辽宁省金秋医院
孙 茜 辽宁中医药大学护理学院
吕 娟 中国医科大学附属口腔医院
刘静茹 辽宁中医药大学护理学院
李 丹 中国医科大学高等职业技术学院
李 霞 中国医科大学附属第一医院
张 翠 辽宁医学院护理学院
张锦辉 辽东学院医学院
郭 宏 沈阳医学院护理学院
谭 燕 辽东学院医学院
潘静坤 沈阳医学院护理学院
穆晓云 中国医科大学高等职业技术学院

前 言

为了满足护理专业中专学生升入大专考试的需要和要求,帮助护生理解、掌握和学会内科各系统疾病病人的护理,我们编写了《内科护理备考精要》。本书可作为护理专业中专升大专考试的辅导用书,也可作为参加国家护士执业资格考试用书,以及在校学生学习的辅助用书和护理教师教学的参考用书。

本书按照中专护理专业《内科护理》教学大纲和国家护士执业资格考试大纲的要求编写,共分为8章,即呼吸系统疾病病人的护理、循环系统疾病病人的护理、消化系统疾病病人的护理、泌尿系统疾病病人的护理、血液系统疾病病人的护理、内分泌代谢疾病病人的护理、风湿性疾病病人的护理和神经系统疾病病人的护理。每章内容包括考试重点、练习题和答案精讲。考试重点主要阐述了内科各系统疾病的重点和难点,是学生必须掌握的内容;练习题共有5种题型,即概念题、填空题、单项选择题、简答题和论述题;答案精讲较为详细地解答了练习题的答案,特别是简答题和论述题,每道题都标注了给分点。此外还附有3套综合模拟试题及答案精讲。全书内容实用、精炼,便于学生对所学知识的理解、记忆和掌握。

我衷心希望本书能为广大护生和护理教师提供帮助和借鉴,同时我也诚挚地感谢本书各位编者积极的工作态度和出色的工作成果;感谢专家委员会的专家们、出版社的编辑们在本书编写过程中给予的具体指导以及为本书提供的建议和帮助。由于水平和时间所限,本书中的不妥、错误及遗漏之处在所难免,恳请使用本书的教师们和同学们批评指正。

李 丹

2007年12月

目 录

第一章	呼吸系统疾病病人的护理	
	一、考试重点	1
	二、练习题	3
	三、答案精讲	17
第二章	循环系统疾病病人的护理	
	一、考试重点	24
	二、练习题	26
	三、答案精讲	42
第三章	消化系统疾病病人的护理	
	一、考试重点	49
	二、练习题	50
	三、答案精讲	61
第四章	泌尿系统疾病病人的护理	
	一、考试重点	67
	二、练习题	68
	三、答案精讲	76
第五章	血液系统疾病病人的护理	
	一、考试重点	80
	二、练习题	81
	三、答案精讲	88
第六章	内分泌代谢疾病病人的护理	
	一、考试重点	93
	二、练习题	94
	三、答案精讲	103

第七章 风湿性疾病病人的护理

一、考试重点	110
二、练习题	110
三、答案精讲	114

第八章 神经系统疾病病人的护理

一、考试重点	117
二、练习题	118
三、答案精讲	127
综合模拟试题 1	132
综合模拟试题 2	139
综合模拟试题 3	146

附 录 内科护理教学大纲

第一章

呼吸系统疾病病人的护理

一、考试重点

1. 呼吸系统由鼻、咽、喉、气管、支气管、肺泡、胸膜、胸廓及膈组成。呼吸系统的主要功能是进行气体交换，并具有防御功能、免疫功能和内分泌、代谢功能。呼吸系统疾病常见的病因是感染、大气污染、吸烟、变态反应、创伤、肿瘤等。呼吸系统疾病常见的症状有咳嗽、咳痰、咯血、呼吸困难和胸痛。

2. 病人咳嗽的性质、程度、音色、发生的时间、与体位的关系、伴随症状等；观察痰液的性状、量及气味等。促进有效排痰的方法为：指导病人有效咳嗽、咳痰；湿化呼吸道；胸部叩击与胸壁震荡；体位引流及机械吸痰。

3. 引起咯血的呼吸系统常见的疾病有肺结核、支气管扩张、肺癌等。根据咯血量的不同，分为痰中带血、少量咯血、中等量咯血、大量咯血。大量咯血可致窒息，若不及时抢救，将危及病人生命。

4. 大量咯血的护理要点包括绝对卧床休息、消除恐惧感、咯血时不能屏气、取患侧卧位或平卧位头偏向一侧、暂禁食、遵医嘱应用药物止血、密切观察病情、备急救物品配合抢救。

5. 肺源性呼吸困难分为三种类型：①吸气性呼吸困难。②呼气性呼吸困难。③混合性呼吸困难。并有不同的代表疾病、不同呼吸困难病人的吸氧原则和依据不同。

6. 对胸痛病人应采取有效的护理措施，如采用患侧卧位；在咳嗽、深呼吸或活动时用手按压疼痛的部位制动；学会放松技术、局部按摩等使病人胸痛减轻。

7. 支气管哮喘是由多种细胞（如嗜酸性粒细胞、肥大细胞、T淋巴细胞等）和细胞组分参与的气道慢性炎症性疾病。以反复发作带哮鸣音的呼气性呼吸困难为主要临床表现，其病因与吸烟、空气污染、感染、过敏因素有关。有效地应用支气管扩张剂缓解病人的呼吸困难非常重要。预防哮喘发作以及发作时采取休息、半卧位、吸氧等护理措施是护理的关键。

8. 慢性支气管炎是指气管、支气管黏膜及其周围组织的慢性非特异性炎症。反复、长期感染是慢性支气管炎发生和发展的重要因素。临床以慢性咳嗽、咳痰或伴有喘息及反复发作作为主要特征。

9. 慢性支气管炎的治疗原则为控制感染及对症治疗（祛痰、镇咳、平喘）。

慢性支气管炎反复发作、久病可导致阻塞性肺气肿，甚至可发生慢性肺源性心脏病等并发症。预防感染、戒烟是重要的护理内容。

10. 慢性阻塞性肺气肿主要由慢性支气管炎发展而来，主要症状是进行性加重的呼吸困难，有典型的肺气肿体征。指导病人做呼吸功能训练非常重要，如缩唇呼吸或腹式呼吸。促进休息、保持呼吸道通畅、给予低流量低浓度持续吸氧、采取半卧位、限制钠水摄入是护理的重要内容。

11. 慢性肺源性心脏病主要是由慢性阻塞性肺气肿发展而来，主要表现为呼吸衰竭、肺性脑病，或伴有右心衰竭，以及酸碱失衡及电解质紊乱等并发症。其处理原则是积极控制感染；通畅呼吸道，改善呼吸困难，纠正缺氧和二氧化碳潴留；控制呼吸衰竭和心力衰竭。

12. 支气管扩张主要特点为慢性咳嗽、大量脓痰、反复咯血和继发肺部感染。治疗原则是控制呼吸道感染，保持呼吸道引流通畅。体位引流应根据病变部位，抬高病变部位的位置，引流支气管开口向下，有利于分泌物随重力排出体外，减少继发感染和全身中毒症状。

13. 肺炎球菌肺炎的临床表现是起病急骤、寒战、高热、呈稽留热型。咳嗽、咳痰，典型者咳铁锈色痰，伴有患侧胸痛。重者有呼吸困难、发绀及肺实变体征等；严重感染时，可出现感染性休克。肺炎球菌肺炎的治疗首选青霉素。病情观察、保持呼吸道通畅、吸氧、遵医嘱用药、降温是护理的重要内容。

14. 肺癌的临床表现是呼吸系统症状及肿瘤局部扩展、肺外转移引起的症状等。治疗采取以手术治疗为主，以放疗、化疗、免疫疗法为辅的综合措施。应加强对放疗病人的护理。

15. 胸膜腔内液体的形成与吸收处于平衡状态，任何原因使胸液形成过多或吸收过少时，均可导致胸液异常积聚，称为胸腔积液。主要表现为呼吸困难、胸痛和其他伴随症状。护理上应注意给氧、减少氧耗及促进呼吸功能。

16. 肺结核主要表现为午后低热、盗汗、乏力、食欲减退、体重减轻，女性病人可有月经失调和闭经以及呼吸道症状。肺结核临床分五型。结核菌素试验可测定人体是否受过结核菌感染。合理应用抗结核药物治疗非常重要，坚持早期、联合、适量、规律和全程的用药原则。做好消毒隔离是护理工作的重要内容。

17. 呼吸衰竭是由多种原因引起的肺通气和（或）换气功能严重障碍、不能进行有效的气体交换，导致缺氧伴或不伴二氧化碳潴留所引起的一系列生理功能和代谢紊乱的临床综合征。按动脉血气分析分Ⅰ型呼吸衰竭，缺氧而无二氧化碳潴留；Ⅱ型呼吸衰竭，缺氧伴二氧化碳潴留。按病程分急性呼吸衰竭和慢性呼吸衰竭。

18. 呼吸衰竭主要表现为呼吸困难、发绀、精神神经症状等全身各系统症状。其治疗原则是建立通畅的气道，合理给氧，控制感染，纠正酸碱平衡失调和电解质紊乱，预防肺性脑病等并发症。合理用氧是呼吸衰竭病人主要的护理措施。

二、练习题

(一) 概念题

1. 咳嗽 2. 咯血 3. 窒息 4. 肺源性呼吸困难 5. 胸痛 6. 体位引流
7. 肺气肿 8. 慢性肺源性心脏病 9. 中毒性肺炎 10. 原发综合征 11. 结核球
12. 上腔静脉阻塞综合征 13. 霍纳 (Horner) 综合征 14. 呼吸衰竭 15. 肺性脑病

(二) 填空题

1. 呼吸系统疾病引起的呼吸困难按发病机制和临床表现不同, 可分为____、____和____三种类型。
2. 化脓性炎症典型的痰液为_____。
3. _____性呼吸困难病人会出现“三凹征”, 表现为____、____和____凹陷。
4. 呼气性呼吸困难的特点是____时间延长且费力, 常伴有哮鸣音, 常见于____和____等。
5. 一次咯血量____mL 为小量咯血, _____mL 为中等量咯血, _____mL 或 24h 咯血量超过____mL 为大量咯血。
6. 咯血窒息急救时病人的体位是_____。
7. 胸膜炎胸痛病人宜采取_____侧卧位。
8. 哮喘病人每日补液量应为_____mL。
9. 支气管哮喘长期发作可并发_____。
10. 慢性支气管炎的临床表现可以概括为____、____、____和_____。
11. 慢性支气管炎临床分型为____和____。前者表现为____, 后者表现为_____。
12. 慢性支气管炎临床上以____、____或伴有____及反复发作的慢性过程为特征; 病情若缓慢进展, 并发症为_____。
13. 慢性迁延期的慢性支气管炎病人表现为不同程度的咳、痰、喘迁延以上。
14. 肺心病是由于支气管、肺、胸廓或肺动脉血管慢性病变所致____压力增高, 使____负荷增加、____肥大, 甚至发生____衰竭的心脏病。
15. 慢性肺源性心脏病的主要病因为_____。
16. 利尿剂的应用原则为____、____和_____。
17. 支气管扩张的病因是____和____, 两者互为因果。
18. 支气管扩张临床主要表现为____、____、____和_____。
19. 支气管扩张病人痰液静置后可分三层, 上层为____, 中层为____,

下层为_____。

20. 支气管扩张病人体位引流时，原则上应使病变部位处于_____，引流支气管开口_____，借重力使痰液排出。

21. 肺炎按解剖分类分为_____肺炎、_____肺炎和_____肺炎。

22. 肺炎的病因最常见为_____感染。

23. 细菌性肺炎最常见的病原菌是_____。

24. 肺结核是_____引起的慢性呼吸道传染病，该病原体具有_____特性。

25. 肺结核主要的传播途径是_____传播。

26. 肺结核呼吸系统症状有_____、_____、_____和_____。

27. 肺结核的临床类型分为_____、_____、_____、_____和_____五种。

28. 3岁以下婴幼儿无症状，但结核菌素试验强阳性的临床意义是_____。

29. 肺结核病人化疗必须遵循的原则是_____、_____、_____、_____和_____。

30. 肺结核化疗通常分为两个阶段，第一阶段为_____治疗，第二阶段为_____治疗或称_____治疗。

31. 肺结核病人胸片见_____、_____和_____，三者统称原发综合征。

32. 大量胸腔积液病人_____侧呼吸运动受限，肋间隙饱满，可伴有气管、纵隔向_____侧移位。

33. 大量胸腔积液首次抽液不超过_____mL，以后每次抽液不应超过_____mL。

34. 按照胸腔积液的部位采取适当体位，一般取_____卧位或_____卧位，以减少胸水对健侧肺的压迫。

35. 一般情况下，当胸腔积液的量超过_____mL时，病人可出现胸闷和呼吸困难。

36. 肺癌的治疗采取以_____治疗为主，_____、_____和_____为辅的综合措施。

37. 呼吸衰竭的诊断标准为静息条件下呼吸大气压空气时，动脉血氧分压小于_____和（或）动脉血二氧化碳分压大于_____。

38. 呼吸衰竭除原发病症状外，主要是_____和_____引起的多脏器功能紊乱。

（三）单项选择题

1. 下列哪项不是呼吸系统疾病最常见的症状（ ）

A. 咳嗽 B. 呼吸困难 C. 发热 D. 胸痛 E. 咯血

2. 引起呼吸系统疾病最常见的病因是（ ）

A. 肿瘤 B. 感染 C. 吸烟 D. 变态反应 E. 理化因素

3. 肺化脓性炎症性疾病典型的痰液呈 ()
- A. 粉红色泡沫样痰 B. 铁锈色痰 C. 黄色黏痰
D. 透明黏痰 E. 果酱样痰
4. 咳粉红色泡沫痰常提示 ()
- A. 肺结核 B. 支气管扩张 C. 肺炎
D. 急性肺水肿 E. 肺脓肿
5. 咳脓臭痰常提示 ()
- A. 病毒感染 B. 霉菌感染 C. 化脓菌感染
D. 厌氧菌感染 E. 绿脓杆菌感染
6. 应指导大咯血病人咯血时不宜 ()
- A. 咳嗽 B. 屏气 C. 绝对卧床
D. 少交谈 E. 禁食水
7. 下列哪项不是肺结核大咯血病人的护理措施 ()
- A. 安慰病人, 鼓励其尽量将血轻轻咯出
B. 可根据医嘱适当给予镇静剂
C. 静滴垂体后叶素, 速度需缓慢
D. 病人宜取健侧卧位
E. 咯血停止后, 可给予温或凉的流质饮食
8. 大咯血时最危险的并发症是 ()
- A. 休克 B. 贫血 C. 肺不张 D. 肺部感染 E. 窒息
9. 咯血窒息急救时病人的体位为 ()
- A. 平卧位 B. 患侧卧位 C. 端坐卧位 D. 半卧位 E. 头低足高位
10. 对大咯血病人最重要的病情观察内容是 ()
- A. 体温 B. 脉搏 C. 血压 D. 神志 E. 窒息先兆
11. 咯血病人突然出现表情恐怖、张口瞪目、两手乱抓等窒息表现, 首先应该 ()
- A. 准备抢救用品 B. 行人工呼吸
C. 使用呼吸中枢兴奋剂 D. 使用镇咳药
E. 立即置病人头低脚高位
12. 大咯血病人一旦发生窒息, 首要的抢救措施为 ()
- A. 吸出血块、保持呼吸道通畅 B. 立即气管插管
C. 加压吸氧 D. 应用呼吸兴奋剂
E. 取平卧位头偏一侧
13. 咯血病人正确的护理措施是 ()
- A. 可给予吗啡镇咳 B. 给予健侧卧位
C. 指导病人咯血时应屏气 D. 咯血量小时减少翻动

- E. 多与病人交谈安慰病人
14. 24h 咯血量超过多少称为大量咯血 ()
A. 100mL B. 200mL C. 300mL D. 400mL E. 600mL
15. 大咯血病人首选的止血药为 ()
A. 止血敏 B. 垂体后叶素 C. 安咯血
D. 维生素 K E. 抗血纤溶芳酸
16. 下列哪种不属于吸气性呼吸困难 ()
A. 大支气管炎症 B. 气管异物 C. 喉头水肿
D. 肺气肿 E. 喉癌
17. 呼气性呼吸困难常见于 ()
A. 支气管哮喘 B. 大叶性肺炎 C. 支气管异物
D. 胸腔积液 E. 急性喉炎
18. 病人走路时走走停停, 时有气短, 为哪种呼吸困难 ()
A. 轻度 B. 中度 C. 重度 D. 极重度 E. 以上都不是
19. 观察呼吸困难病人时见到下列哪种情况提示病情垂危 ()
A. 呼吸频率加快 B. 呼吸频率减慢
C. 深而长的呼吸 D. 浅快呼吸 E. 潮式呼吸
20. 下列哪项不是呼吸困难的护理措施 ()
A. 取半卧位或坐位 B. 保持呼吸道通畅
C. 保持口鼻腔清洁 D. 尽量减少活动
E. 给高流量吸氧
21. 下列哪项不是胸痛性质的正确陈述 ()
A. 心绞痛呈压榨样疼痛
B. 肋间神经痛呈刀割样或灼痛
C. 肺癌早期可有胸部隐痛或闷痛
D. 胸膜炎疼痛常在深呼气时加重
E. 自发性气胸可在剧咳时突然发生胸痛
22. 支气管哮喘发作时应调整病人体位为 ()
A. 平卧位 B. 头低足高位 C. 半卧位或坐位
D. 患侧卧位 E. 中凹卧位
23. 支气管哮喘属于 ()
A. 感染性疾病 B. 变态反应性疾病 C. 心理疾病
D. 理化刺激所致疾病 E. 遗传性疾病
24. 支气管哮喘病人 PaCO_2 增高时表示 ()
A. 没有临床意义 B. 病情好转 C. 发作早期
D. 病情严重 E. 呼吸性碱中毒

25. 支气管哮喘的主要表现为 ()
- A. 反复发作的带有哮鸣音的吸气性呼吸困难
 - B. 反复发作的带有哮鸣音的呼气性呼吸困难
 - C. 反复发作的带有哮鸣音的混合性呼吸困难
 - D. 突然发作的夜间阵发性呼吸困难
 - E. 逐渐加重的咳嗽、咳痰与呼吸困难
26. 下列哪种病室环境不适合支气管哮喘病人 ()
- A. 病室相对湿度在 50% ~ 70%
 - B. 病室温度在 18 ~ 22℃
 - C. 室内放些花草以使空气新鲜
 - D. 定期给空气加湿
 - E. 不使用羽毛制品
27. 重症哮喘 (哮喘持续状态) 是指严重哮喘持续多长时间 ()
- A. 6h
 - B. 10h
 - C. 24h
 - D. 48h
 - E. 12h
28. 下列哪项不是重症哮喘病人的护理措施 ()
- A. 专人护理
 - B. 禁用吗啡
 - C. 病人取半卧位或坐位
 - D. 用超声雾化湿化气道
 - E. 给病人吸氧
29. 支气管哮喘发作缓解后不宜进食 ()
- A. 水果类
 - B. 蔬菜类
 - C. 鱼虾蛋类
 - D. 饮料
 - E. 豆制品类
30. 支气管哮喘反复长期发作后可出现 ()
- A. 急性肺部感染
 - B. 支气管扩张
 - C. 肺气肿
 - D. 恶性变
 - E. 继发肺结核
31. 慢性支气管炎加重和复发的基本原因是 ()
- A. 呼吸道感染
 - B. 大气污染
 - C. 吸烟
 - D. 植物神经功能失调
 - E. 气候变化
32. 慢性支气管炎最突出的症状是 ()
- A. 长期反复咳嗽
 - B. 时有喘息
 - C. 反复发热
 - D. 少量咯血
 - E. 大量咯血
33. 慢性支气管炎最主要的并发症是 ()
- A. 肺出血
 - B. 支气管扩张
 - C. 小叶性肺炎
 - D. 肺栓塞
 - E. 慢性阻塞性肺气肿
34. 慢性支气管炎急性发作期最主要的治疗措施是 ()
- A. 补液
 - B. 祛痰
 - C. 平喘
 - D. 菌苗注射
 - E. 控制感染
35. 慢性阻塞性肺气肿除原发病症状外, 主要表现为 ()
- A. 感染发热
 - B. 咳多量脓痰
 - C. 逐渐加重的呼吸困难
 - D. 发绀
 - E. 剧烈咳嗽
36. 肺气肿病人胸廓呈 ()
- A. 扁平胸
 - B. 鸡胸
 - C. 桶状胸

- C. 利尿减轻心脏负荷 D. 给洋地黄制剂 E. 控制心律失常
47. 心电图可见“肺性 P 波”见于哪种疾病 ()
- A. 肺性脑病 B. 阻塞性肺气肿 C. 呼吸衰竭
D. 支气管哮喘 E. 慢性肺心病
48. 慢性肺心病病人出现呼吸过缓、意识障碍加重应考虑 ()
- A. 痰液阻塞 B. 气道痉挛 C. 呼吸衰竭
D. 二氧化碳潴留 E. 气管异物
49. 慢性肺心病病人不妥的护理措施是 ()
- A. 改善肺泡通气 B. 持续低流量吸氧
C. 有水肿限制水、盐摄入 D. 改善营养状况
E. 烦躁不安使用镇静剂
50. 肺心病心力衰竭时可出现下列常见症状和体征, 下列哪项除外 ()
- A. 颈静脉怒张 B. 水肿 C. 肝肿大和压痛
D. 尿少 E. 咳粉红色泡沫样痰
51. 下列哪项不是支气管扩张的临床表现 ()
- A. 发热乏力 B. 慢性咳嗽 C. 大量脓痰
D. 反复咯血 E. 吸气性呼吸困难
52. 支气管扩张病人伴厌氧菌感染的痰液特征是 ()
- A. 痰量与体位改变有关 B. 每日痰量可达数百毫升
C. 痰呈黄绿色 D. 痰有恶臭
E. 痰放置后可分三层
53. 下列哪项检查能确定支气管扩张病人的支气管阻塞原因和部位 ()
- A. 纤维支气管镜 B. 胸片检查 C. 支气管造影
D. 痰涂片检查 E. 肺 CT 检查
54. 支气管扩张病人的首要护理措施是 ()
- A. 促进排痰 B. 预防咯血后窒息
C. 超声雾化吸入 D. 使用抗菌药物
E. 使用支气管舒张药
55. 下列哪项不是支气管扩张病人的护理措施 ()
- A. 进温热饮食 B. 体位引流后应漱口
C. 咯血严重时不可洗热水澡 D. 避免受凉, 戒烟
E. 咯血时不可屏气
56. 支气管扩张病人病变部位在下叶背部, 体位引流采取的体位是 ()
- A. 平卧位 B. 俯卧位, 腰部抬高
C. 仰卧位, 腰臀部抬高 D. 左侧卧位, 腰部抬高
E. 右侧卧位, 腰部抬高

57. 支气管扩张病人体位引流的时间宜选择在 ()
A. 饭前 B. 饭后 C. 夜间 D. 早上 E. 中午
58. 各种病原体引起肺炎的最常见原因为 ()
A. 病毒 B. 细菌 C. 支原体 D. 真菌 E. 过敏
59. 肺炎球菌性肺炎病人痰液的特点为 ()
A. 大量脓痰 B. 透明黏痰 C. 红棕色胶冻样痰
D. 粉红色泡沫样痰 E. 铁锈色痰
60. 肺炎球菌肺炎常见于 ()
A. 婴幼儿 B. 青壮年 C. 儿童 D. 老年人 E. 少年
61. 肺炎球菌肺炎最具有特征性的表现是 ()
A. 呼吸困难 B. 咳铁锈色痰 C. 语颤增强
D. 咳嗽、胸痛 E. 发热、寒战
62. 肺炎球菌肺炎病人的热型常为 ()
A. 稽留热 B. 间歇热 C. 弛张热 D. 波状热 E. 不规则热
63. 肺炎球菌肺炎的抗菌治疗首选 ()
A. 青霉素 B. 卡那霉素 C. 红霉素 D. 庆大霉素 E. 链霉素
64. 肺炎病人下列哪项护理措施不妥 ()
A. 烦躁、谵妄时可给地西泮 B. 呼吸困难取半卧位
C. 胸痛取健侧卧位 D. 腹胀可用肛管排气
E. 密切观察生命体征、神志、尿量等
65. 普通型肺炎和休克型肺炎最主要的鉴别点是 ()
A. 起病的缓急 B. 发热的程度
C. 白细胞总数的多少 D. 有无末梢循环衰竭
E. 胸痛、呼吸困难的程度
66. 休克型肺炎最突出的表现是 ()
A. 血压降低 B. 高热 C. 意识障碍
D. 少尿 E. 四肢厥冷
67. 下列哪项不是休克性肺炎病情观察的内容 ()
A. 生命体征 B. 皮肤颜色及温湿度 C. 瞳孔
D. 出血倾向 E. 尿量
68. 休克型肺炎病人宜采取的体位是 ()
A. 头低足高位 B. 半卧位 C. 平卧位
D. 侧卧位 E. 中凹卧位
69. 休克型肺炎病人病情观察措施下列哪项是错误的 ()
A. 脉搏细弱不规则, 不易触及提示病情危重
B. 后期呼吸不规则提示呼吸衰竭