

人机对话版

RENJIDUIHUABAN

2008

卫生专业职称考试冲关捷径

WEISHENGZHUANYEZHICHENGGKAOSHI
CHONGGUANJIEJING

儿科学 全真模拟试卷

卫生专业技术资格考试专家委员会 / 策划编写

紧扣大纲 题库权威

模拟实考 过关必备

 人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

卫生专业职称考试冲关捷径

儿科学全真模拟试卷

ERKEXUE QUANZHEN MONI SHIJUAN

主 编 蒋小云 莫 樱

秘 书 吴 伟 李 明

编 者 (以姓氏笔画为序)

马广伟	马华梅	孙良忠	麦文英
李 明	李晓瑜	吴 伟	余慕雪
沈振宇	张巧玲	陈国桢	岳智慧
柯志勇	莫 樱	唐 雯	黄柳一
韩志东	蒋小云	曾爱红	

 人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目(CIP)数据

儿科学全真模拟试卷/蒋小云,莫 樱主编. —北京:人民军医出版社,2008.1

(卫生专业职称考试冲关捷径)

ISBN 978-7-5091-1419-3

I. 儿… II. ①蒋…②莫… III. 儿科学—医药卫生人员—资格考核—习题 IV. R72-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 183919 号

策划编辑:郭伟疆 王 琳 崔玲和 张利峰 文字编辑:崔玲和 责任审读:张之生

出 版 人:齐学进

出版发行:人民军医出版社

经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱

邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927270;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927300-8139

网址:[www. pmmp. com. cn](http://www.pmmp.com.cn)

印刷:京南印刷厂 装订:桃园装订有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:17.5 字数:565 千字

版、印次:2008 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印数:0001~4500

定价:49.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

前 言

为了满足卫生专业技术人员晋升中级资格应试的需要,人民军医出版社组织具有丰富试题编写经验的各学科专家以全真模拟试卷的形式编写了《卫生专业职称考试冲关捷径》丛书。本试卷的特点是紧密围绕指导用书、考试大纲和临床实践需要,目的是使应试者提高业务能力和应试成绩,顺利通过中级职称考试。我们相信,只要应试者认真复习、掌握试卷所涉及的内容,踏踏实实做模拟试卷,就一定能够顺利通过考试。

本丛书依照最新考试大纲,以全真模拟试题形式将考纲中所有知识点与各学科的系统知识结合起来,经过精心编排,模拟真实的考试环境。为考生提供了将考纲重点、知识难点、解题要点、正确答案相结合的高效率复习模式。力争通过试题将考点融会贯通,为准备晋升的医师提供复习、应试的捷径。特别提醒:复习和做模拟题时,千万不要把主要精力放在背记试题和答案上。

在编写本模拟试卷的过程中,编者得到了多方的支持与帮助,在此表示诚挚的谢意。由于参与编写的人员较多,编写时间仓促,难免有错误或疏漏之处,殷切希望广大读者批评指正,以便及时纠正和改进。

对于本套丛书存在的不足和错误,请将您的意见发送到读者反馈信箱 info@pmmp.com.cn,以便在修订时改正。最后,衷心祝愿大家顺利通过考试!

编 者
2008年1月

目 录

全真模拟试卷一	(1)	全真模拟试卷五	(137)
基础知识	(1)	基础知识	(137)
相关专业知识	(8)	相关专业知识	(143)
专业知识	(15)	专业知识	(151)
专业实践能力	(24)	专业实践能力	(159)
答案	(33)	答案	(169)
全真模拟试卷二	(35)	全真模拟试卷六	(171)
基础知识	(35)	基础知识	(171)
相关专业知识	(41)	相关专业知识	(177)
专业知识	(49)	专业知识	(185)
专业实践能力	(58)	专业实践能力	(193)
答案	(67)	答案	(203)
全真模拟试卷三	(69)	全真模拟试卷七	(205)
基础知识	(69)	基础知识	(205)
相关专业知识	(75)	相关专业知识	(212)
专业知识	(83)	专业知识	(219)
专业实践能力	(91)	专业实践能力	(227)
答案	(101)	答案	(237)
全真模拟试卷四	(103)	全真模拟试卷八	(239)
基础知识	(103)	基础知识	(239)
相关专业知识	(109)	相关专业知识	(245)
专业知识	(117)	专业知识	(253)
专业实践能力	(125)	专业实践能力	(262)
答案	(135)	答案	(271)

全真模拟试卷一

基础知识

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 2 岁后小儿平均每年身高增加
A. 3~5cm
B. 4~5cm
C. 5~7cm
D. 6~7cm
E. 7~9cm
- 正常小儿脊柱弯曲出现的时间是
第 1 弯曲 第 2 弯曲 第 3 弯曲
A. 2 个月 3 个月 6 个月
B. 3 个月 6 个月 12 个月
C. 3 个月 9 个月 12 个月
D. 4 个月 6 个月 12 个月
E. 6 个月 9 个月 12 个月
- 判断小儿体格发育的主要指标为
A. 身高和体重
B. 语言的发育程度
C. 智力发育水平
D. 对外界的反应能力
E. 运动功能的发育
- 麻疹疫苗初种时间是
A. 5 个月
B. 6 个月
C. 7 个月
D. 8 个月
E. 9 个月
- 2:1 含钠液的组成是
A. 1 份生理盐水,2 份 5% 碳酸氢钠
B. 2 份 5% 葡萄糖,1 份 1.4% 碳酸氢钠
C. 2 份生理盐水,1 份 11.2% 乳酸钠
D. 2 份生理盐水,1 份 5% 碳酸氢钠
E. 2 份生理盐水,1 份 1.4% 碳酸氢钠
- 全脂奶粉稀释成全脂奶的标准配制方法为
按重量 按容积
A. 1:8 1:4
B. 1:6 1:4
C. 1:8 1:6
D. 1:4 1:8
E. 1:4 1:6
- 小儿肾小球滤过率接近成人的年龄为
A. 出生后 1~2 周
B. 出生后 3~6 个月
C. 出生后 6~12 个月
D. 1~2 岁
E. 3 岁以后
- 下列哪项属于风湿热增生性改变
A. 关节肿大
B. 皮肤环形红斑
C. 心包炎
D. 风湿小体形成
E. 心内膜纤维索性渗出
- 风湿热持续性损害的器官是
A. 关节
B. 皮肤
C. 虹膜睫状体
D. 心脏
E. 丘脑下核
- 反映肾小球滤过功能受损的早期指标是
A. 血尿素氮
B. 血肌酐
C. 内生肌酐清除率
D. 尿量
E. 尿比重
- 选择性蛋白尿是指
A. 以大分子量的尿蛋白为主
B. 以中分子量的尿蛋白为主
C. 以小分子量的尿蛋白为主
D. 以小、中分子量的尿蛋白为主
E. 各种分子量的尿蛋白均增多
- 血中钙离子浓度在下列哪种情况下降低
A. 代谢性酸中毒

- B. 代谢性碱中毒
C. 血浆蛋白浓度低
D. 血镁降低
E. 血磷降低
13. 属于水溶性维生素的是
A. 维生素 A
B. 维生素 D
C. 维生素 C
D. 维生素 K
E. 维生素 E
14. III 度咯血失血量为有效循环血量的
A. 2%~5%
B. 5%~8%
C. 8%~10%
D. 10%~15%
E. >15%
15. 高铁血红蛋白含量超过血红蛋白总量的多少时会出现青紫
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
E. 25%
16. 幼儿急疹的主要病原体是
A. 人类疱疹病毒 6 型
B. 腺病毒
C. 副流感病毒
D. 埃可病毒
E. 柯萨奇病毒
17. 化脓性脑膜炎发病过程中细菌入侵的主要途径为
A. 头外伤后病菌直接侵入
B. 由邻近组织的感染向颅内扩展
C. 经先天畸形部位进入蛛网膜下隙
D. 血行传播
E. 经消化道侵入
18. 关于衣原体的描述,下列哪项不正确
A. 是一类专一细胞内寄生微生物
B. 是迄今为止最小的细菌,体积大于病毒
C. 无细胞壁
D. 经分裂繁殖
E. 抵抗力弱
19. 母亲 HBsAg(+) 的新生儿应在何时肌注乙肝高效免疫球蛋白
A. 生后 10 小时内
B. 生后 12 小时内
C. 生后 24 小时内
D. 生后 36 小时内
E. 生后 72 小时内
20. 引起小儿化脓性脑膜炎最常见的 3 种致病菌是
A. 脑膜炎双球菌、肺炎链球菌和大肠杆菌
B. 脑膜炎双球菌、葡萄球菌和大肠杆菌
C. 流感嗜血杆菌、肺炎链球菌和大肠杆菌
D. 流感杆菌、肺炎球菌和脑膜炎双球菌
E. 葡萄球菌、草绿色链球菌和流感嗜血杆菌
21. 下列能引起排血性大便的细菌为
A. 侵袭性大肠杆菌、变形杆菌
B. 肠出血性大肠杆菌、金黄色葡萄球菌
C. 肠出血性大肠杆菌、副溶血性弧菌
D. 沙门菌、金黄色葡萄球菌
E. 产毒性大肠杆菌、副溶血性弧菌
22. 肺炎支原体感染的潜伏期是
A. 1~2 周
B. 2~3 周
C. 3~4 周
D. 4~5 周
E. 5~6 周
23. 小儿出生后体格发育速度最快的时期是
A. 青春期
B. 婴儿期
C. 幼儿期
D. 学龄前期
E. 学龄期
24. 下列关于小儿的描述错误的是
A. 生长迅速,对蛋白质和水的需要量比成人多
B. 易患先天性、遗传性和感染性疾病
C. 起病急、来势凶、变化多、后遗症多见
D. 治疗主要疾病的同时,要处理主要并发症和并存症
E. 加强预防是降低发病率和死亡率的重要环节
25. 咽扁桃体在何时开始增大
A. 3 个月
B. 6 个月
C. 9 个月
D. 1 岁末
E. 3 岁末
26. Crohn 病病变部位主要累及
A. 回肠末段
B. 降结肠
C. 结肠
D. 空回肠

- E. 胃及十二指肠
27. 换气功能反映的是
- 肺泡和血液的气体交换
 - 肺泡和肺泡间的气体交换
 - 肺和外界气体的交换
 - 气道是否阻塞
 - 换气的能力和效率
28. 了解垂体的形态大小,最好的影像学检查方法是
- 头颅 X 线片
 - 头颅磁共振
 - 头颅 CT 扫描
 - 脑超声波
 - 头颅血管造影
29. 神经系统发育过程中,半岁左右才逐渐出现的反射为
- 角膜反射
 - 咽反射
 - 腹壁反射
 - 吸吮反射
 - 拥抱反射
30. 卵圆孔瓣膜在解剖上闭合大多发生在生后
- 4~6 个月
 - 5~7 个月
 - 8~9 个月
 - 9~10 个月
 - 10~12 个月
31. 新生儿硬肿症发病的内因是
- 体内热量不足,皮下脂肪中饱和脂肪酸含量多
 - 体内热量不足,皮下脂肪中不饱和脂肪酸含量多
 - 体内含棕色脂肪较多
 - 早产
 - 感染和窒息
32. 新生儿脊髓末端约在
- 第 4、5 腰椎下缘,故腰椎穿刺应在第 5、6 腰椎间隙进针
 - 第 3、4 腰椎下缘,故腰椎穿刺应在第 4、5 腰椎间隙进针
 - 第 2、3 腰椎下缘,故腰椎穿刺应在第 3、4 腰椎间隙进针
 - 第 5、6 腰椎下缘,故腰椎穿刺应在第 6、7 腰椎间隙进针
 - 第 1、2 腰椎下缘,故腰椎穿刺应在第 2、3 腰椎间隙进针
33. 新生儿坏死性小肠结肠炎发病的高危因素是
- 窒息
 - 出生体重极低
 - 红细胞增多症
 - 肺动脉高压
 - 以上均是
34. 3 岁正常小儿的心左界在
- 左乳线外 2cm
 - 左乳线外 1cm
 - 左乳线上
 - 左乳线内 0.5cm
 - 左乳线内 1cm
35. 以下何种情况是由于红细胞膜的缺陷导致的溶血性贫血
- 遗传性椭圆形细胞增多症
 - 异常血红蛋白病
 - 地中海贫血
 - 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)缺乏症
 - 丙酮酸激酶缺乏症
36. 能通过胎盘的免疫球蛋白是
- IgA
 - IgM
 - IgG
 - IgD
 - IgE
37. 正常小儿脑脊液的蛋白含量是
- 0.2~0.4g/L
 - 0.4~0.8g/L
 - 0.2~0.6g/L
 - 0~0.2g/L
 - 0.2~1.0g/L
38. 1 岁小儿惊厥,下列体征中可以视为正常的是
- 颈抵抗
 - Kernig 征阳性
 - Babinski 征阳性
 - 握持反射阳性
 - 拥抱反射阳性
39. 智力发育的关键期是
- 1 岁以前
 - 1~3 岁
 - 4~5 岁前
 - 6 岁前

- E. 18岁前
40. 有关围生期正确的是
- 指胎龄满28周至生后7天
 - 指脐带结扎至生后7天
 - 指胎龄满28周至生后28天
 - 指脐带结扎至生后28天
 - 指胎龄满28周至脐带结扎
41. 关于小儿发育的说法中,不正确的是
- 6岁以下小儿肝脏可在肋缘下2~3cm处扪及
 - 3个月以内的小儿在肋缘下可扪及脾脏
 - 小儿膀胱充盈时可在耻骨上摸到
 - 2岁以上小儿 Babinski 征一侧阳性一侧阴性有病理意义
 - 生后3~6个月才能建立有效的抗胃食管反流的屏障
42. 男,4个月,下列说法哪项不妥
- 陌生人抱起时会啼哭
 - 会笑出声
 - 尚未出牙
 - 骨缝已闭合
 - 能抬头与挺胸
43. 男,能叫出物品名,对人及事物有喜憎之分,能弯腰拾东西,出牙8个,脊柱有3个弯曲,其月龄可能是
- 8个月
 - 9个月
 - 10个月
 - 11个月
 - 12个月
44. 男,5个月,因母乳不足需辅以羊乳,为保证婴儿健康成长还应给该儿添加
- 维生素C及维生素B₁
 - 维生素B₁及铁剂
 - 维生素B₁₂及叶酸
 - 维生素B₁₂及铁剂
 - 钙和锌
45. 男,6个月,阵发性哭闹4个小时,呕吐,排黏液血便,右上腹可扪及腊肠样包块,下列哪项检查最重要
- 空气灌肠
 - 粪便常规
 - 腹部B超
 - 钡剂灌肠
 - 腹部CT
46. 男,2岁,身高62cm,体重10kg,智力发育良好,为了解其健康情况,首选以下哪项检查
- 测量皮下脂肪厚度
 - 头颅正侧位片
 - 头围、胸围比例
 - 上、下部量比例
 - 腕部X线片
47. 男,5岁,眼睑水肿8天。尿蛋白(+++),定量2.5g/24h,血浆清蛋白18g/L,血胆固醇10.3mmol/L,口服泼尼松40mg/d,1周后尿蛋白(-)。此患儿最可能的肾脏病理改变为
- 微小病变
 - 膜增生性肾小球肾炎
 - 系膜增生性肾小球肾炎
 - 膜性肾病
 - 局灶节段性肾小球硬化
48. 女,11岁,指间关节痛伴面部红斑3个月, C₃ 0.25g/L,拟诊系统性红斑狼疮。以下哪项检查最有助于诊断
- 血沉
 - C反应蛋白
 - 类风湿因子
 - 抗核抗体和抗dsDNA抗体
 - 血常规
49. 男,营养发育良好,能坐,见陌生人即哭,头围41cm,前囟大小2cm×2cm,身长65cm,腕部X线片可见2个骨化中心。该男婴最可能的年龄是
- 4~5个月
 - 5~6个月
 - 7~8个月
 - 8~9个月
 - 10~12个月
50. 女,12岁,由于期末考试成绩下滑被老师和家长责骂,近1个月逐渐出现动作、言语减少,思维迟钝,每天早晨去学校时情绪最低落。该患儿最可能的诊断是
- 精神分裂症
 - 多动症
 - 孤独症
 - 抑郁症
 - 焦虑症

二、以下提供若干个案例,每个案例下设若干个考题。请根据答案所提供的信息,在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(51~54 题共用题干)

女,3 个月,体重为 5kg,用牛奶人工喂养。

51. 该小儿每天需要的总能量应为
- A. 450kcal
 - B. 500kcal
 - C. 550kcal
 - D. 600kcal
 - E. 660kcal
52. 如采用 8% 的糖牛奶,每天应给多少毫升
- A. 500ml
 - B. 550ml
 - C. 600ml
 - D. 660ml
 - E. 700ml
53. 除牛奶外,每天还应给予多少毫升水
- A. 200ml
 - B. 240ml
 - C. 280ml
 - D. 300ml
 - E. 350ml
54. 该小儿已可添加下列哪种辅食
- A. 蛋黄
 - B. 鱼肝油
 - C. 米粉
 - D. 肉末
 - E. 苹果泥

(55~57 题共用题干)

男,10 个月,经常出现夜惊,近 1 周加重,多汗,哭闹。该患儿母乳加牛乳混合喂养,尚未添加辅食。

55. 该患儿体格检查最易发现的阳性体征是
- A. 皮肤弹性差
 - B. 皮下脂肪明显减少
 - C. 体检正常
 - D. 方颅,前凶大,乳牙未萌出
 - E. X 形腿,O 形腿
56. 该患儿最可能的诊断是
- A. 维生素 D 缺乏病
 - B. 营养不良

- C. 正常儿
- D. 上呼吸道感染
- E. 消化不良

57. 有关该病发生的病因,下列哪项不正确
- A. 日光照射不足
 - B. 维生素 D 摄入不足
 - C. 维生素 D 的需要量增加
 - D. 食物中钙磷含量过低或比例不当
 - E. 甲状旁腺功能不足

(58~65 题共用题干)

男,1 岁 1 个月,体重 7.5kg,身高 73cm,母乳喂养至 9 个月开始添加稀粥,每日 3 顿,夜晚母乳喂养 1~2 次。

58. 该婴儿每日能量供给应为
- A. 70kcal/(kg·d)
 - B. 80kcal/(kg·d)
 - C. 90kcal/(kg·d)
 - D. 100kcal/(kg·d)
 - E. 110kcal/(kg·d)
59. 每日蛋白质供给大约应为
- A. 10g
 - B. 15g
 - C. 20g
 - D. 25g
 - E. 30g
60. 每日铁量供给应是
- A. 6mg
 - B. 8mg
 - C. 10mg
 - D. 12mg
 - E. 14mg
61. 每日维生素 D 需要量是
- A. 200U
 - B. 400U
 - C. 600U
 - D. 800U
 - E. 1 000U
62. 对该男孩进行生长发育评估时,应首选
- A. 丹佛发育筛查试验
 - B. 头颅 B 超
 - C. 生长激素激发试验
 - D. 生长水平判断
 - E. 甲状腺功能检测
63. 评价该男孩营养状态的指标之一是以体重

小子

- A. 中位数
- B. 中位数-1SD
- C. 中位数-2SD
- D. 均数
- E. P_{10}

64. 评价此男孩的体格测量标准应是

- A. 皮下脂肪减少
- B. 体重降低
- C. 胸围<头围
- D. 身高<中位数-2SD
- E. 体重、身高、体重/身高<中位数-2SD

65. 该男孩体重小于第3百分位、身高在第5~90百分位之间,最可能的诊断是

- A. 正常儿童
- B. 营养不良
- C. 唐氏综合征(21-三体综合征)
- D. 生长激素缺乏
- E. 软骨发育不良

(66~70 题共用题干)

女,6岁,体重21kg,身高120cm,体检时发现在胸骨左缘第2肋间可闻及Ⅱ级柔和的收缩期杂音,传导局限,心电图检查窦性心律,胸部X线片心肺未见异常。

66. 该小儿心脏杂音应考虑为

- A. 先天性心脏病
- B. 风湿性心脏病
- C. 心肌炎
- D. 心律失常
- E. 生理性杂音

67. 该小儿心尖搏动的位置应在

- A. 第5肋间左锁骨中线外1cm
- B. 第5肋间左锁骨中线上
- C. 第5肋间左锁骨中线外2cm
- D. 第5肋间左锁骨中线内1cm
- E. 第5肋间左锁骨中线内2cm

68. 该小儿上肢血压应为

- A. 80/50mmHg
- B. 90/60mmHg
- C. 90/50mmHg
- D. 100/60mmHg
- E. 120/80mmHg

69. 该小儿正常的脉搏次数为

- A. 120~140次/分

B. 110~130次/分

C. 100~120次/分

D. 80~100次/分

E. 70~90次/分

70. 对该小儿进行智力测试,以下哪项最合适

- A. 丹佛发育筛查测验
- B. Bayley 婴儿发育量表
- C. 绘人测验
- D. Wechsler 学前及初小儿童智力量表
- E. Gesell 发育量表

三、以下提供若干组考题,每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(71~75 题共用备选答案)

- A. 1~2个月
- B. 2~3个月
- C. 4~6个月
- D. 7~9个月
- E. 10~12个月

71. 开始添加蛋黄的年龄

72. 开始添加菜泥的年龄

73. 开始添加肉末的年龄

74. 开始添加带馅食品的年龄

75. 开始添加饼干的年龄

(76~77 题共用备选答案)

- A. 丝氨酸蛋白酶-3
- B. 髓过氧化物酶
- C. 乳铁蛋白
- D. 组蛋白酶
- E. 白细胞弹力蛋白酶

76. c-ANCA 的抗原成分是

77. p-ANCA 的抗原成分是

(78~82 题共用备选答案)

- A. 环形淡红色皮疹,边缘稍隆起,多分布于躯干和四肢屈侧,时隐时现,消退后不留痕迹
- B. 非固定的红斑样皮疹,多分布于躯干,发热时出现,热退后消散
- C. 皮疹位于面颊部,两侧对称,红色,光照明显加重

- D. 紫红色斑丘疹,压不退色,多见于下肢,对称分布,分批出现
 - E. 弥漫充血性斑丘疹,多形性红斑或猩红热样皮疹,多见于躯干;常在病程第一周出现,可伴手掌、足底和肛周皮肤潮红
78. 系统性红斑狼疮皮疹表现为
79. 风湿热皮疹表现为
80. 过敏性紫癜皮疹表现为
81. 类风湿关节炎皮疹表现为
82. 川崎病皮疹表现为

(83~86 题共用备选答案)

- A. 肝在锁骨中线肋缘下 2cm
 - B. 肝在锁骨中线肋缘下 3cm 以内
 - C. 肝在肋下 3cm 以上至脐水平之间
 - D. 肝超过脐水平
 - E. 肝脏大多已入骨盆并横过中线
83. 肝脏轻度大
84. 肝脏中度大
85. 肝脏重度大
86. 肝脏极重度大

(87~90 题共用备选答案)

- A. 血清免疫球蛋白显著低下或测不出
 - B. 中性粒细胞明显降低
 - C. 外周血 CD₃ 细胞低下
 - D. T 细胞受体共同 γ -(γ -C) 链缺陷
 - E. T 细胞 CD₄₀ 配体缺陷
87. X-连锁高 IgM 血症
88. X-连锁无丙种球蛋白血症
89. X-连锁严重联合免疫缺陷病
90. T 细胞缺陷病

(91~93 题共用备选答案)

- A. 不对称性迟缓性瘫痪,有感觉障碍
 - B. 不对称性迟缓性瘫痪,无感觉障碍
 - C. 对称性迟缓性瘫痪,有感觉障碍
 - D. 对称性迟缓性瘫痪,无感觉障碍
 - E. 痉挛性瘫痪
91. 感染性多发性神经根炎,主要表现为
92. 脊髓灰质炎,主要表现为
93. 脑性瘫痪,主要表现为

(94~95 题共用备选答案)

- A. 胎龄 > 37 周
 - B. 37 周 ≤ 胎龄 < 42 周
 - C. 胎龄 > 40 周
 - D. 胎龄 > 42 周
 - E. 胎龄 ≥ 42 周
94. 足月儿指
95. 过期产儿指

四、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从备选答案中选择所有正确答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

96. 新生儿期保健的主要内容是

- A. 出生时的护理
 - B. 居家保健
 - C. 喂养
 - D. 皮肤护理
 - E. 预防接种
97. 影响血尿素氮的因素有
- A. 性别
 - B. 年龄
 - C. 肾功能
 - D. 饮食蛋白
 - E. 感染

98. 稽留热多见于

- A. 伤寒
- B. 幼年类风湿关节炎(全身型)
- C. 大叶性肺炎
- D. 结核病
- E. 化脓性感染

99. 嗜酸细胞计数升高考虑

- A. EB 病毒感染
- B. 寄生虫病
- C. 白血病
- D. 过敏性疾病
- E. 败血症

100. 婴儿期的特点包括

- A. 生长发育速度最快
- B. 对疾病抵抗力低,易发生各种传染病
- C. 需要摄入的热量和营养尤其是蛋白质特别高
- D. 消化功能发育不完善,故易患营养及消化系统疾病
- E. 对生活缺乏经验,易发生中毒或创伤等意外

相关专业知识

一、每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 新生儿病理性黄疸的特征中,下列哪一项是错误的
A. 黄疸在生后 48~72 小时出现
B. 早产儿血清胆红素可超过 $257\mu\text{mol/L}$
C. 黄疸持续时间长(足月儿 >2 周,早产儿 >4 周)
D. 黄疸退而复现,或进行性加重
E. 血清直接胆红素超过 $34\mu\text{mol/L}$
2. 肾功能不全失代偿期肌酐清除率为
A. $60\sim 80\text{ml}/(\text{min}\cdot 1.73\text{m}^2)$
B. $50\sim 60\text{ml}/(\text{min}\cdot 1.73\text{m}^2)$
C. $30\sim 50\text{ml}/(\text{min}\cdot 1.73\text{m}^2)$
D. $10\sim 30\text{ml}/(\text{min}\cdot 1.73\text{m}^2)$
E. $<10\text{ml}/(\text{min}\cdot 1.73\text{m}^2)$
3. 急性肾炎的水肿多为非凹陷性的,原因是
A. 一般水肿不重
B. 皮肤张力高
C. 皮下脂肪多
D. 间质液含较高的蛋白质
E. 间质液含钠较多
4. 肾病综合征的特征中,以下列哪项为主
A. 大量蛋白尿
B. 低蛋白血症
C. 血胆固醇增高
D. 水肿
E. 血沉明显增快
5. 急性肾衰竭多见下列哪项降低
A. 血磷
B. 血钾
C. 血尿素氮
D. 血浆 HCO_3^-
E. 血胆固醇
6. 年长儿慢性肾衰竭最常见的病因是
A. 慢性肾炎
B. 肾囊性病
C. Alport 综合征
D. 泌尿系解剖异常
E. 慢性肾盂肾炎
7. 早产儿容易发生维生素 D 缺乏病,主要是因为
A. 钙磷储存少
B. 维生素 D 储存少
C. 生长发育快,需要钙、磷、维生素 D 相对较多
D. 胃肠道对维生素 D、钙、磷的吸收不良
E. 以上均是
8. 流感病毒传染性最强的时间是
A. 发病初期出现症状时
B. 发病中期病重时
C. 发病末期病将好时
D. 病愈,病症刚消失时
E. 恢复期
9. 关于小儿尿路感染,下列哪项是错误的
A. 最多见上行感染
B. 血行感染多发生在年长儿
C. 少数可经淋巴管扩散而感染
D. 可由临近器官或组织扩散导致感染
E. 尿路器械引流和检查易引起感染
10. 当血钙低于多少时即可引起手足抽搐发作
A. $1.5\sim 1.63\text{mmol/L}$
B. $1.63\sim 1.75\text{mmol/L}$
C. $1.75\sim 1.88\text{mmol/L}$
D. $1.88\sim 2.0\text{mmol/L}$
E. $2.0\sim 2.13\text{mmol/L}$
11. 急进性肾炎 B 超常见的是
A. 双肾有分叶
B. 双肾增大
C. 双肾缩小
D. 双肾大小不等
E. 双肾轮廓不清
12. 营养性维生素 D 缺乏病最主要的病因是
A. 维生素 D 摄入过少
B. 生长快,需要量大
C. 肝肾疾病的影响
D. 日光照射不足
E. 遗传因素
13. 以下哪种病原体引起的肺炎肺部体征不明显时即可出现 X 线改变
A. 肺炎链球菌
B. 金黄色葡萄球菌
C. 腺病毒

- D. 大肠杆菌
E. 绿脓杆菌
14. 哪一种激素分泌不足可引起尿崩症
A. 肾上腺素
B. 肾上腺皮质激素
C. 促肾上腺皮质激素
D. 血管升压素
E. 醛固酮
15. 先天性甲状腺功能减低症不应有
A. 体温低下、反应迟钝
B. 动作发育迟缓,智能低下,表情淡漠、呆滞
C. 生长发育迟缓,身材矮小,骨龄延迟
D. 染色体核型分析显示畸变
E. 喂养困难,哭声嘶哑、腹胀、便秘
16. 湿疹的病理改变主要位于哪个部位
A. 表皮
B. 真皮
C. 皮下组织
D. 皮肤附件
E. 以上均有
17. 青霉素可引起哪些类型的超敏反应
A. I、II型超敏反应
B. I、II、III型超敏反应
C. II、IV型超敏反应
D. I、II、III、IV型超敏反应
E. I、II、IV型超敏反应
18. 感染性心内膜炎最常见的病原菌为
A. 草绿色链球菌
B. 金黄色葡萄球菌
C. 草绿色链球菌+金黄色葡萄球菌
D. 表皮葡萄球菌
E. 棒状杆菌
19. 重症肌无力的发病机制不包括
A. 自身免疫反应
B. 在病毒的直接作用下引起
C. 乙酰胆碱受体参与发病
D. 神经兴奋传递障碍
E. 肌肉收缩无力
20. 急性脊髓炎最易受累的节段是
A. 颈段
B. 上胸段
C. 下胸段
D. 腰段
E. 尾段
21. 小儿急性偏瘫,脑脊液检查可见
A. 细胞数升高
B. 蛋白升高
C. 糖降低
D. 蛋白细胞同时升高
E. 没有特异性改变
22. 某些 G-6-PD 缺乏症病人可合并慢性自发性溶血,主要见于
A. 香港型
B. 台湾型
C. 广州型
D. 女性患者
E. 以上均不是
23. 染色体异位检测对判断白血病患儿的预后有意义,其中 t(4;11)见于
A. 急性淋巴细胞白血病
B. 急性早幼粒细胞白血病
C. 急性粒单细胞白血病
D. 红白血病
E. 急性巨核细胞白血病
24. 新生儿缺氧缺血性脑病的病因为
A. 呼吸暂停
B. 胎儿宫内窘迫
C. 心力衰竭
D. 严重肺炎
E. 以上均是
25. 下列哪种疾病常表现为稽留热
A. 肺结核
B. 疟疾
C. 大叶性肺炎
D. 胸膜炎
E. 回归热
26. 女,10岁,近3周来无明显诱因出现肢体不自主的运动,并常挤眉弄眼,双手持物不稳,伴情绪波动,有时烦躁不安,入睡后上述症状消失。查体除了无意识动作增多外,无其他阳性体征。ASO 1:320,ESR 15mm/h。该患儿最可能的诊断是
A. 肝豆状核变性
B. 癫痫
C. 病毒性脑炎
D. 风湿性舞蹈病
E. 神经官能症
27. 男,9岁,上呼吸道感染2周后出现心前区不适,胸闷、心悸,心电图检查示各导联 ST-T 压低,T波低平和频发室性期前收缩(早搏),诊断为病毒性心肌炎。现突然

- 烦躁不安、面色苍白、四肢湿冷及末端发绀,现该患儿最可能的并发症为
- 心源性休克
 - 充血性心力衰竭
 - Ⅱ度房室传导阻滞
 - 阵发性室性心动过速伴心肌劳损
 - 频发室性期前收缩
28. 男,5岁,诊断为川崎病伴心脏损害,可能性较小的心电图改变是
- ST段抬高
 - 低电压
 - T波倒置
 - P波高尖
 - 异常Q波
29. 女,4个月,反复双目凝视伴四肢发硬2天入院,共发作7~8次,每次发作仅数秒钟,无发热。生后一直配方奶喂养。查体:体温 36.7°C ,精神萎靡,前囟饱满,颈无明显抵抗,Kernig征阴性,Babinski征阴性。为明确诊断,对该患儿最重要的检查是
- 血培养
 - 血清钙测定
 - 腰穿脑脊液检查
 - 脑电图检查
 - 血清镁测定
30. 女,1岁4个月,发热2天,双眼结膜充血,咽痛。体查:咽充血,双眼结膜充血,心肺正常。该患儿最可能感染的病原体是
- 腺病毒
 - 柯萨奇病毒
 - EB病毒
 - 流感病毒
 - 单纯疱疹病毒
31. 男,7岁,反复干咳4~5个月,偶有血丝痰。查体:双肺底少许捻发音,疑诊“特发性肺纤维化”。确诊需行下列哪项检查
- 胸部X线
 - 肺功能测定
 - 支气管镜镜检查
 - 胸部CT
 - 肺活检
32. 男,2岁,发热2天,体温 38.5°C 左右,呕吐3次,大便每日7~8次,呈水样,尿量较平日略少。查体:精神状态好,前囟平,哭时有泪,口唇略干,皮肤弹性尚可,四肢末梢
- 暖,心音有力,律齐,肺部无啰音。若要与重型腹泻鉴别,需注意观察的是
- 发热、呕吐是否加重
 - 大便次数大于10次/d
 - 有无水电解质紊乱
 - 大便中出现黏液、脓血
 - 大便镜检有大量脂肪滴
33. 男,8个月,低热,消瘦,食欲减退1个月,有结核密切接触史。血沉 35mm/h 。为明确诊断做PPD皮试检查,PPD应注射
- 1U
 - 2U
 - 5U
 - 10U
 - 12U
34. 男,2岁,生后4个月逐渐出现智力低下,毛发颜色变浅,皮肤白皙,抽搐。该患儿可能的病因为
- 酪氨酸羟化酶缺乏
 - 二氢蝶啶还原酶缺乏
 - 苯丙氨酸羟化酶缺乏
 - 过氧化酶缺乏
 - 碘化酶缺乏
35. 男,13岁,上腹痛1天,排柏油样便半天,其上消化道出血量应超过
- 50ml
 - 50~60ml
 - 60ml
 - 60~70ml
 - 70ml
36. 男,7个月,生后少哭,少动,进食少,便秘。查体:体温 36°C ,头发稀疏、枯黄,发际较低,双眼睑水肿,心率100次/分,腹膨隆,有脐疝。血红蛋白 100g/L 。为确诊应首先选下列哪项实验室检查
- 血电解质测定
 - 血清碱性磷酸酶测定
 - 血胆固醇、三酰甘油测定
 - 血清 T_3 、 T_4 、TSH测定
 - 染色体核型分析
37. 女,1岁,腹泻2天,尿少。查体:眼窝和前囟明显凹陷,四肢稍凉,血钠 134mmol/L ,血钾 3.1mmol/L 。该患儿诊断考虑为
- 肠炎,轻度脱水,低钾血症
 - 肠炎,中度脱水,低钾血症

- C. 肠炎,重度脱水,低钾血症
 D. 肠炎,中度脱水
 E. 肠炎,重度脱水,低钾血症,低钠血症
38. 男,3个月,咳嗽、气急10天,痰较多。入院后给予头罩吸氧,测血气分析示 PaO₂ 115mmHg, PaCO₂ 68mmHg, pH 7.28。对该患儿酸碱状态的评估可能性最大的是
- A. 代谢性酸中毒(呼吸部分代偿)
 B. 代谢性酸中毒+呼吸性酸中毒
 C. 呼吸性酸中毒(肾脏部分代偿)
 D. 呼吸性碱中毒(单纯肾脏代偿)
 E. 代谢性碱中毒(呼吸部分代偿)
39. 男,6岁,诊断为急性淋巴细胞白血病,予VDLP方案化疗。化疗期间尿常规检查应特别注意
- A. 尿蛋白
 B. 尿白细胞
 C. 尿红细胞
 D. 尿pH及尿酸结晶
 E. 管型
40. 男,4岁,诊断为室间隔缺损,根据其血流动力学改变,可以增大的心腔是
- A. 右心室、左心室增大
 B. 右心房、右心室增大
 C. 右心室增大、肺动脉扩张
 D. 左心房、左心室增大
 E. 左心房、右心房增大
41. 某孕妇,有流产史,现再次怀孕,羊水中血清胆红素升高,血型“A”,Rh阴性,其血清中可能含有
- A. IgG抗A或抗B抗体
 B. IgG抗Rh(D)抗体
 C. IgM抗A或抗B抗体
 D. IgM抗Rh(D)抗体
 E. IgG抗A或抗B抗体, IgM抗Rh(D)抗体
42. 男,6岁,眼睑水肿、尿少3天,尿红细胞3~5个/HP,血补体0.23g/L,诊断为急性肾炎。该患儿C₃下降的主要原因是
- A. 补体合成障碍
 B. 补体消耗
 C. 补体从尿中排出增多
 D. 补体活性降低,难以检出
 E. 补体进入组织
43. 男,胎龄32周,顺产娩出,生后6小时出现气促,X线表现两肺野透明度减低,有均匀

细小的颗粒,网状阴影及支气管充气征。

该患儿最可能的诊断为

- A. 新生儿肺透明膜病
 B. 湿肺
 C. 肺不张
 D. 吸入性肺炎
 E. 新生儿脓胸
44. 男,1岁,因水肿、尿少10天入院。血压120/90mmHg,贫血貌,血白细胞8.7×10⁹/L,血红蛋白56g/L,血小板51×10⁹/L,网织红细胞6.3%,尿蛋白(++++),红细胞3~5个/HP,血尿素氮18.9mmol/L。该患儿最可能的诊断是
- A. 急性肾炎
 B. 先天性肾病综合征
 C. IgA肾病
 D. 溶血尿毒综合征
 E. Alport综合征
45. 女,2岁,近1年多反复呼吸道感染,3次患肺炎。应首选下列哪项检查
- A. 血常规
 B. 血培养
 C. PPD试验
 D. 胸部X线检查
 E. 免疫功能检查

二、以下提供若干个案例,每个案例下设若干个考题。请根据答案所提供的信息,在每题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(46~49题共用题干)

- 男,1岁2个月,腹泻3天,每天8~10次,蛋花汤样。查体:烦躁不安,皮肤弹性差,哭时泪少,四肢稍凉,尿量明显减少,呼吸稍增快。
46. 该患儿最可能的诊断为
- A. 轻度脱水,酸中毒
 B. 中度脱水,酸中毒
 C. 中度脱水,碱中毒
 D. 重度脱水,酸中毒
 E. 重度脱水,酸中毒,休克
47. 该患儿体液丢失为
- A. 20~30ml/kg
 B. 30~50ml/kg
 C. 50~100ml/kg
 D. 100~120ml/kg

- E. 120~150ml/kg
48. 该患儿入院后测血钠 136mmol/L, 累积损失量宜先补
- 2/3 张, 50~100ml/kg
 - 1/2 张, 50~100ml/kg
 - 2/3 张, 100~150ml/kg
 - 1/2 张, 100~150ml/kg
 - 开始快速注入 2:1 等渗含钠液
49. 该患儿血钾 3.2mmol/L, 可能是
- 血钾属正常
 - 钾摄入不足
 - 钾经消化道丢失
 - 肾排出钾过多
 - 血中 H⁺ 过高

(50~52 题共用题干)

男, 4 个月, 发热, 咳嗽 2 天, 喘鸣 1 天, 既往无喘息史, 体查: 体温 38.5℃, 气稍促, 唇周轻度发绀, 双肺闻喘鸣音, 少许中湿啰音。

50. 该患儿最可能的诊断是
- 急性支气管炎
 - 婴幼儿哮喘
 - 腺病毒肺炎
 - 毛细支气管炎
 - 肺炎支原体肺炎
51. 取早期及恢复期血清做抗体滴度检测, 抗体滴度升高多少有诊断意义
- 2 倍
 - 4 倍
 - 6 倍
 - 8 倍
 - 10 倍
52. 该患儿治疗中不恰当的是
- 吸氧
 - 雾化吸入沙丁胺醇和爱全乐
 - 抗病毒治疗
 - 镇静+利尿
 - 补液维持水电解质平衡

(53~55 题共用题干)

女, 5 岁, 2 周前曾患扁桃体炎, 近 2 天出现双眼睑水肿, 肉眼血尿。血压 130/90mmHg, 尿蛋白(卅), 红细胞满视野, 管形 1~2 个/HP, ASO 1:256。

53. 该患儿最可能的诊断是
- 急性肾炎
 - 肾炎性肾病

- IgA 肾病
 - 慢性肾炎急性发作
 - 肾盂肾炎
54. 患儿突然出现尿量明显减少, 呼吸 60 次/分, 双肺可闻及水泡音, 心率 160 次/分, 肝脏肋下 3cm, 考虑该患儿可能出现了
- 急性肾衰竭
 - 高血压脑病
 - 肺炎
 - 循环充血
 - 代谢性酸中毒
55. 针对以上情况下列处理措施哪项不当
- 限制水钠入量
 - 应用呋塞米
 - 强心药用量宜大且维持治疗
 - 硝苯地平降压
 - 血压监测

(56~59 题共用题干)

男, 5 岁, 发热 10 天。查体: 体温 39.0℃, 全身无皮疹, 双侧颈部淋巴结直径约 1.5cm, 咽部明显充血, 双侧扁桃体 II 度充血肿大, 见白色膜状物, 心、肺无异常, 腹软, 肝脏右肋下 3cm 可触及, 脾脏左肋下 3cm。

56. 该患儿在门诊应做的主要初步检查是
- 血常规+异形淋巴细胞计数
 - 外周血细胞形态
 - 肝功能
 - 腹部 B 超
 - 抗链球菌溶血素 O
57. 患儿血白细胞 $16.0 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 0.24, 淋巴细胞 0.76, 异型淋巴细胞 0.12, 谷丙转氨酶 183U/L。该患儿最可能的诊断是
- 化脓性扁桃体炎
 - 传染性单核细胞增多症
 - 上呼吸道感染
 - 肝炎
 - 败血症
58. 为进一步明确诊断, 以下检查中最重要的是
- 血清嗜异性抗体测定
 - 血清抗 VCA-IgG 和 IgM 抗体测定
 - 血清抗 CMV-IgG 和 IgM 抗体测定
 - 血清病毒分离
 - 血培养