

BENCAO XINYONGTU

# 本草新用途

第3版

主编 曾立崑

人民軍醫出版社





## 图书在版编目(CIP)数据

本草新用途/曾立崑主编. —3 版. —北京:人民军医出版社,  
2008.1

ISBN 978-7-5091-1473-5

I. 本… II. 曾… III. 本草—汇编 IV. R281.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 192220 号

策划编辑:杨磊石 文字编辑:伦踪启 责任审读:黄栩兵  
出 版 人:齐学进 主  
出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店  
通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编:100036  
质量反馈电话:(010)51927270;(010)51927283  
邮购电话:(010)51927252  
策划编辑电话:(010)51927292  
网址:[www.pmmp.com.cn](http://www.pmmp.com.cn)

印刷:北京国马印刷厂 装订:京兰装订有限公司  
开本:850mm×1168mm 1/32  
印张:15.25 字数:536 千字  
版、印次:2008 年 1 月第 3 版第 1 次印刷  
印数:17501~22000  
定价:35.00 元

版权所有 侵权必究  
购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

## 内 容 提 要

本书是在广泛收集本草药理作用及临床应用研究的基础上，结合作者 50 余年的临证经验编写而成。共介绍中草药 230 余味，按其主要作用与用途分为 22 章。每味药物包括名称、药用部分与产地、成分、药理作用、传统应用；重点介绍其临床新用途，治疗的病症近 400 种。全书内容丰富、资料翔实，介绍的方法简便易行、疗效可靠，是基层医务工作者学习、应用中草药很有价值的参考书，亦可供医学院校师生和中医药爱好者参阅。

## 第3版前言

《本草新用途》第1版于1999年问世以后，2004年又出了第2版，承蒙读者的厚爱，先后4次印刷，发行17 000余册。同时，也收到了一些读者来信，对书中的某些不足之处提出了很好的修订建议。为适应医药科学技术的发展，满足读者的需求，在人民军医出版社的支持下，我们对本书再次进行了修订。

此次修订，在保留原版特色的基础上，重点增补了近5年来发表在国内医药期刊上的有关中草药的临床新用途，如应用中草药治疗乙肝、糖尿病、冠心病、妇科病、风湿病、结石病、不孕症、性病，以及外科烧烫伤、疮疖、湿疹等，特别是中草药对癌症的治疗。治疗的疾病由第2版的300余种增加到近400种。其次，吸收近年来的科研成果，在成分、药理、传统应用等方面也增补了新的内容，如增加了防风、薄荷、玄参、土茯苓、白鲜皮、番泻叶、威灵仙、木瓜、薏苡仁、砂仁、五灵脂、山药、党参、菟丝子、百合、绞股蓝、蛇床子等十几种比较实用和常用的药物。此外，修正了原版中的差错，删除了部分疗效欠佳或在基层不易实施的内容，如马鞭草、一枝黄花、十大功劳叶、商陆、罂粟壳、菝葜、豨莶草、花椒、银杏叶、钓鱼竿、芹菜、博落回、七叶莲等十几种不常用的药物；犀角改为水牛角。对个别药物的归类也进行了调整，如青蒿归入清热药，龙骨、牡蛎归入安神药，冰片归入开窍药，麦芽归入消食药。修订后，内容更为

新颖、实用。但限于我们的水平有限，仍难免有错误及不足之处，诚恳读者及同行专家批评指正。

参加本书编写工作的还有彭叔余、曾再山、曾芬莲、曾焱山等医师，对本书的编写给予帮助的还有刘锦高、刘仲云、李世清、伍君逑、龚新辉等，在此一并致谢。

2007年8月，曾立崑在廣州被殺害。廣州公安局稱，殺害曾立崑的主謀是陳英傑，陳英傑是廣州人，當時在廣州某公司工作，2007年8月1日，陳英傑持刀將曾立崑刺死。

# 目 录

第1章 解表药	.....	(1)	水牛角	.....	(59)
荆芥	.....	(1)	佛甲草	.....	(62)
麻黄	.....	(3)	金银花	.....	(63)
柴胡	.....	(6)	连翘	.....	(67)
桂枝	.....	(10)	青蒿	.....	(70)
葛根	.....	(13)	玄参	.....	(71)
辛夷	.....	(15)	第3章 解毒药	.....	(74)
野菊花	.....	(18)	蒲公英	.....	(74)
防风	.....	(20)	板蓝根	.....	(76)
薄荷	.....	(22)	败酱草	.....	(79)
第2章 清热药	.....	(24)	仙人掌	.....	(81)
黄连	.....	(24)	紫草	.....	(82)
黄柏	.....	(27)	桉叶	.....	(86)
石膏	.....	(29)	虎杖	.....	(88)
知母	.....	(31)	紫花地丁	.....	(91)
鱼腥草	.....	(34)	扛板归	.....	(93)
苦参	.....	(37)	千里光	.....	(95)
大青叶	.....	(39)	土茯苓	.....	(96)
龙胆	.....	(41)	白鲜皮	.....	(98)
芦根	.....	(43)	第4章 泻下药	.....	(101)
山慈姑	.....	(45)	大黄	.....	(101)
青黛	.....	(47)	芒硝	.....	(105)
穿心莲	.....	(49)	火麻仁	.....	(106)
天花粉	.....	(50)	芫花	.....	(108)
梔子	.....	(53)	番泻叶	.....	(109)
黄芩	.....	(55)	第5章 止痢药	.....	(111)
地骨皮	.....	(57)	马齿苋	.....	(111)



## 本草新用途

地锦草	(113)	薏苡仁	(177)
白头翁	(115)	第9章 温里药	(179)
鸦胆子	(117)	肉桂	(179)
第6章 祛风湿药	(120)	附子	(181)
独活	(120)	干姜	(184)
牛膝	(122)	细辛	(185)
防己	(124)	吴茱萸	(186)
秦艽	(128)	第10章 理气药	(190)
桑寄生	(129)	木香	(190)
鸡血藤	(131)	青木香	(192)
乌头	(133)	枳实	(195)
五加皮	(135)	青皮	(198)
鹿衔草	(137)	乌药	(200)
威灵仙	(139)	陈皮	(202)
木瓜	(141)	第11章 消食药	(204)
第7章 芳香化湿药	(143)	山楂	(204)
藿香	(143)	莱菔子	(206)
厚朴	(144)	神曲	(208)
苍术	(147)	鸡内金	(211)
白豆蔻	(149)	麦芽	(212)
砂仁	(150)	第12章 止血药	(216)
第8章 利水渗湿药	(153)	槐花	(216)
茯苓	(153)	槿木(叶)	(218)
泽泻	(155)	牡丹皮	(219)
猪苓	(157)	地榆	(221)
茵陈	(160)	白及	(223)
益母草	(162)	蒲黄	(226)
瞿麦	(164)	侧柏叶	(227)
金钱草	(166)	旱莲草	(230)
半边莲	(168)	仙鹤草	(232)
白茅根	(170)	茜草根	(234)
玉米须	(173)	艾叶	(236)
萹蓄	(175)	紫珠	(237)
赤小豆	(176)	红藤	(238)

# 目 录



第13章 活血化瘀药	.....	(241)	白芥子	.....	(307)
红花	.....	(241)	第15章 安神药	.....	(310)
丹参	.....	(243)	灵芝草	.....	(310)
毛冬青	.....	(247)	夜交藤	.....	(312)
桃仁	.....	(248)	珍珠	.....	(313)
三七	.....	(250)	刺五加	.....	(314)
川芎	.....	(254)	磁石	.....	(316)
王不留行	.....	(257)	远志	.....	(317)
延胡索	.....	(259)	柏子仁	.....	(319)
莪术	.....	(261)	酸枣仁	.....	(321)
水蛭	.....	(263)	龙骨	.....	(322)
姜黄	.....	(266)	牡蛎	.....	(324)
五灵脂	.....	(267)	第16章 熄风降压药	.....	(328)
第14章 止咳化痰药	.....	(269)	白芍	.....	(328)
前胡	.....	(269)	罗布麻	.....	(331)
杏仁	.....	(270)	夏枯草	.....	(333)
款冬花	.....	(272)	蝉蜕	.....	(335)
马兜铃	.....	(274)	杜仲	.....	(337)
半夏	.....	(275)	全蝎	.....	(339)
浙贝母	.....	(279)	蜈蚣	.....	(340)
桔梗	.....	(281)	天麻	.....	(342)
百部	.....	(284)	地龙	.....	(344)
紫菀	.....	(286)	钩藤	.....	(347)
瓜蒌	.....	(287)	白芷	.....	(349)
葶苈子	.....	(289)	第17章 开窍药	.....	(353)
老君须	.....	(292)	牛黄	.....	(353)
枇杷叶	.....	(293)	麝香	.....	(355)
白僵蚕	.....	(294)	羚羊角	.....	(358)
苏合香	.....	(296)	石菖蒲	.....	(359)
桑白皮	.....	(297)	冰片	.....	(361)
天南星	.....	(299)	第18章 补虚药	.....	(365)
冬虫夏草	.....	(302)	当归	.....	(365)
洋金花	.....	(303)	枸杞子	.....	(369)
旋覆花	.....	(306)	玉竹	.....	(371)



## 本草新用途

黄精	(373)	槟榔	(430)
何首乌	(375)	乌梅	(432)
山茱萸	(378)	川楝子	(434)
淫羊藿	(380)	地肤子	(436)
龟甲	(383)	使君子	(437)
熟地黄	(384)	<b>第 21 章 抗癌药</b>	(440)
鹿茸	(387)	白花蛇舌草	(440)
女贞子	(389)	白英	(442)
麦冬	(391)	鸡矢藤	(444)
阿胶	(394)	喜树	(446)
补骨脂	(397)	龙葵	(448)
仙茅	(398)	陆英	(450)
人参	(400)	雷公藤	(451)
太子参	(404)	毛茛	(454)
黄芪	(406)	山豆根	(455)
山药	(410)	鳖甲	(457)
党参	(413)	穿山甲	(459)
菟丝子	(415)	重楼	(462)
百合	(418)	绞股蓝	(464)
<b>第 19 章 收涩药</b>	(420)	<b>第 22 章 其他药</b>	(467)
五倍子	(420)	马钱子	(467)
五味子	(422)	大蒜	(469)
贯众	(425)	硼砂	(471)
海螵蛸	(427)	黄花夹竹桃	(473)
<b>第 20 章 驱虫药</b>	(430)	蛇床子	(474)

# 第1章 解 表 药

**【别名】** 假苏、姜芥、稳齿菜、荆芥穗、线芥。

**【药用部分与产地】** 为唇形科一年生草本植物的全草。秋季开花穗绿时割取地上部分晒干，亦有先单独摘取花穗，再割取枝茎，分别晒干，前者称为荆芥穗，后者称为荆芥。产于江苏、浙江、湖北等地。

**【成分】** 含挥发油 1.8%，油中主要成分为右旋薄荷酮、消旋薄荷酮、少量右旋柠檬烯等。

**【药理】** 用人工发热的家兔，口服荆芥煎剂与浸剂 2g(生药)/kg，无甚解热作用。在体外，高浓度(1:100)有抗结核杆菌之作用<sup>[1]</sup>。

**【传统应用】** 性味归经：辛苦而温，芬香而散，入肺、肝经。功能：发汗，散风湿，清头目，利咽喉。主治：伤寒头痛，中风口噤，身强项直，口眼喎斜，目昏花，吐衄肠风，崩中血痢，产风血运，瘰疬肿块。止血炒炭用。

**【临床新用途】**

- 治疗小儿支原体肺炎 据报道，有人用止嗽散为主治疗小儿支原体肺炎 18 例。方法：以荆芥 10g 为主，配紫菀、百部、白前、杏仁、鱼腥草、桔梗、冬瓜仁各 10g；痰多者加贝母、法半夏各 6g；气促者加苏子、款冬花各 8g；热甚者加黄芩、天竺黄各 10g；久病者加桃仁、丹参各 10g，地龙 6g；水煎 3 次服，每日 1 剂。结果：显效 15 例，有效 1 例，无效 2 例<sup>[2]</sup>。

- 治疗血小板减少症 采用荆芥炭治疗血小板减少症引起鼻出血者 21 例。治疗结果：显效 16 例，有效 4 例，无效 1 例。方法：以荆芥炭 30g 为主，配侧柏炭 10g，每日 1 剂，水煎 2 次分服，连服 7 剂为 1 个疗程，21 例中服 2 个疗程者 8 例，服 2~3 个疗程者 13 例。

- 治疗流行性感冒 采用荆菊散治疗本病 18 例，治疗结果，疗效满意。方法：以荆芥 30g 为主，配野菊花 20g，每日 2 剂，水煎 3 次服。加减：伴咳嗽者加矮地茶 30g；气喘者加麻绒 10g；高热者加石膏 30g。18 例中最少服 3 剂，最多服 7 剂。



## 中草新用途

4. 治疗风疹 采用荆薄散治疗本病 32 例, 显效 22 例, 有效 9 例, 无效 1 例。方法: 以荆芥 20g 为主, 配薄荷 10g, 金银花 15g, 鱼腥草 20g, 每日 1 剂, 水煎 3 次服。加减: 高热者加石膏 30g; 疹色较红者加牡丹皮 10g; 耳后淋巴结肿大者加夏枯草 20g; 胸闷易烦者加焦山楂 15g; 鼻出血者加白茅根 30g。治疗过程中, 服 1 剂后症状明显减轻, 2 剂后大部分症状消失, 最多 6 剂症状全部消失。

5. 治疗神经性头痛 方法: 荆芥 20g, 石膏、淡婆根各 30g, 水煎 3 次服。加减: 头两侧痛者加白芷 20g; 偏虚者每剂炆鸡蛋 3 个口服。

6. 治疗胆碱能性荨麻疹 有人用防风通圣散治疗本病 60 例。方法: 荆芥、栀子、防风各 6g, 连翘、黄芩、桔梗各 10g, 生石膏 20g, 制大黄、芒硝各 3g。遇热加剧加生地黄、知母、牡丹皮、赤芍药; 遇饮酒或运动后症状加剧加黄连、知母、茯苓; 遇情绪紧张症状加剧加郁金、佛手、柴胡等。水煎, 每日 1 剂, 分早、晚 2 次服。10 日为 1 个疗程。结果: 治愈 45 例, 有效 10 例, 无效 5 例, 总有效率 91.7%<sup>[3]</sup>。

7. 治疗急性支气管炎 有人用风寒止咳液治疗本病 298 例。方法: 服用风寒止咳液,(主要成分为荆芥、麻黄、苏叶、杏仁、白前、桔梗、陈皮、紫菀、前胡、甘草)。每次 10~20ml, 每日 3 次, 5 日为 1 个疗程。结果: 临床抑制 197 例, 显效 92 例, 有效 6 例, 无效 3 例, 总有效率 99.2%<sup>[4]</sup>。

8. 治疗喉源性咳嗽 有人用清宣郁热法治疗本病 67 例。方法: 荆芥穗 7g, 金银花、麦冬、胖大海、浙贝母、赤芍各 10g, 蝉蜕、桔梗各 6g, 甘草 5g。每日 1 剂, 水煎分上、下午服。若素体肺气虚, 反复感冒者加黄芪 12g, 白术 10g, 防风 6g; 素体阴虚火旺者, 去荆芥穗, 加知母、炒黄柏各 6g, 干生地黄 12g; 大便干结者加牛蒡子 10g; 胸闷不适者加瓜蒌 10g, 炒枳壳 6g。结果: 治疗 4 周后, 19 例显效, 43 例好转, 5 例无效<sup>[5]</sup>。

## 参 考 文 献

1. 江苏新医学院. 中药大辞典. 上海: 上海科学技术出版社, 2003; 1553.
2. 徐 雯. 止嗽散为主治疗小儿支原体肺炎 18 例. 浙江中医杂志, 1997; (10): 543.
3. 蔡秀珍. 防风通圣散治疗胆碱能性荨麻疹 60 例. 河北中医, 2001; (11): 835.
4. 古献民. 风寒止咳液治疗急性支气管炎 298 例. 湖南中医杂志, 2003; (2): 12.
5. 叶云生. 清宣郁热治疗喉源性咳嗽. 浙江中医杂志, 2006; (1): 6.



## 麻 黄

【别名】龙沙、卑盐、狗骨、生麻绒、净麻绒、麻黄根、麻黄绒。

【药用部分与产地】为麻黄科植物草麻黄、木贼麻黄、中麻黄的草质茎，晒干切断使成药材。主产河北、山西、新疆、内蒙古等地。

【成分】生物碱、甲基麻黄碱、伪麻黄碱、挥发油等。

【药理】

1. 发汗作用 近年来的试验证明，甲基麻黄碱、麻黄水提取物、麻黄水煎液，麻黄配伍桂枝、麻黄汤以及麻黄挥发油给动物灌服，均能使大鼠足跖部放散的水分增加，而呈现发汗作用。

2. 平喘作用 麻黄平喘作用确实可靠，平喘的有效成分为麻黄碱。

3. 利尿作用 利尿作用的有效成分主要是 D-伪麻黄碱。麻醉犬、兔静脉注射一定量伪麻黄碱，均可见尿量明显增加。

4. 抗炎作用 麻黄水提取物、醇提取物能明显抑制炎症反应。

5. 解热、抗病毒作用 麻黄挥发油对实验性发热动物有解热作用，对流感病毒亚甲型有明显的抑制作用。

6. 升高血压作用 麻黄碱因能兴奋  $\alpha$  和  $\beta$  肾上腺能受体而使心跳加快、心肌收缩力加强、心输出量增加、血管收缩而呈现升高血压作用。

【传统应用】性味归经：辛温微苦，性温，入肺、膀胱经。功能：发汗解表，去营中寒邪，胃中风热，通九窍，开毛孔。主治：风寒感冒、咳嗽气喘、水肿停滞、中风伤寒、头痛温疟、毒风疹痒、目赤肿痛。夏月禁用。发汗用其茎与节，止汗用其根与节。

【临床新用途】

1. 治疗急性痛风关节炎 据报道，有人用加味麻黄、连翘、赤小豆汤治疗本病 28 例，3 日内症状完全消失者 16 例，好转者 8 例，4 例疗效不明显。方法是以炙麻黄 6g 为主，配连翘、牛膝各 15g，赤小豆、生地黄各 30g，地龙 10g，白茅根 20g，甘草 5g，每日 1 剂煎服<sup>[1]</sup>。

2. 治疗支气管哮喘 自 1986 年以后，根据春夏养阴的治则，参照清代张氏《医通》的记载，制成冬病夏治软膏，治疗本病 32 例。方法：麻绒、曼陀罗花、苏子各 30g，细辛 10g，共研细末，以上药为 1 人 1 年的治疗用量。时在夏秋季节内，治疗时将制备好的药粉取 1/3，加生姜汁调成膏状（每次鲜生姜 100g 洗净、浸泡后捣碎，挤出姜汁调匀），分别摊在 6 块直径约 5cm 的油纸或塑料布上贴于背部；取肺俞、心俞、膈俞穴（即 3、5、7 胸椎下旁开 5cm 处），然后再用橡皮膏固定。一般贴 4~6 小时，如果贴后局部有烧灼感或疼痛，可以提前取



下,如贴后局部有发痒、发热、舒适感,可多贴几小时,等干燥后再取下,每隔1日贴1次,即初伏、二伏、三伏共贴3次,缓解期哮喘症发展的病人都可贴,一般连续贴治3年。以晴天中午前后贴治为佳、阴雨天贴的效果欠佳。贴药前及取下前不能活动过多,以免脱落。实践证明,本疗法能提高机体免疫力,降低其过敏性,改善丘脑-肾上腺皮质系统的功能,收到止咳、化痰效果。32例中有效率为79.9%。

3. 治疗小儿肺炎 采用麻杏石甘汤加减治疗本病36例,效果满意,其中显效24例,有效10例,无效2例。方法:以麻绒4g为主,配生石膏、杏仁各10g,甘草5g,每日1剂,水煎3次口服。加减:咳逆者加法半夏4g;痰多者加尖贝(狗牙贝)5g;咳重者加矮地茶10g;热重者加条芩8g。所治病例一般2~6剂见效,连服10剂,X线摄片肺炎病灶消失者为显效,仅症状消失者为有效,转其他治疗者为无效。

4. 治疗低血压 方法:麻绒10g,黄芪、当归各20g。加减:若头昏者加天麻20g;无力甚者加党参20g;四肢冷者加附片15g。5剂浓煎3次去渣存汁,加蜂蜜500ml再煎1次,浓缩成1000ml,瓶装备用,每次服20ml,每日2次,10日为1个疗程。结果:18例中,服1~2个疗程者11例,服3个疗程者7例。其中17例血压皆恢复正常,1例无效。

5. 治疗扁平疣 据报道,有人用麻杏薏甘汤治疗本病33例。方法:以麻黄9g为主,配杏仁、薏苡仁、苍术各10g,板蓝根20g,甘草6g,每日1剂,水煎3次分服,半个月为1个疗程,可连服2个疗程。治疗结果:痊愈29例,好转4例,全部有效<sup>[1]</sup>。

6. 治疗小儿支气管肺炎 有人用肺炎合剂为主治疗本病180例。肺炎合剂组成:炙麻黄、生大黄(后下)各4g,杏仁、桃仁、桑叶、桑皮各8g,生石膏(先煎)、鱼腥草、蚤休各15g,前胡、炙百部各10g,川贝6g,每日1剂,水煎浓缩200ml频服或灌肠,每日2次。热甚者加黄芩8g,寒水石10g;痰盛加瓜蒌仁10g,鲜竹沥20ml;憋喘为主加地龙10g,钩藤8g;腹泻加炒扁豆10g,薏苡仁15g,或加服中药止泻散2g;每日3次;伴心阳虚加熟附片4g,生晒参10g,淡干姜6g,另煎服;伴血象明显增高者加用抗生素;缺氧明显给予吸氧;心衰严重者予强心利尿。结果:180例病儿中,痊愈147例,有效24例,无效9例,总有效率95%,疗效与用药的迟与早有着密切关系,发病1日内用药的58例,1~3日用药的85例,3日以上用药的37例,有效率分别为95.3%,92.3%,89.9%<sup>[2]</sup>。

7. 治疗肺心病心力衰竭 有人用中西医结合治疗本病60例。方法:麻黄8g,白芍15g,细辛5g,桂枝、干姜、法半夏、五味子各10g。气虚甚者加黄芪



20g, 红参 10g(另煎对服); 脾肾阳虚、心阳不振者加附片、肉桂各 10g, 或静脉推注参附注射液 20ml; 口唇发绀、心悸胸闷者加丹参 20g, 川芎、桃仁各 10g; 尿少水肿者加猪苓 10g, 泽泻 15g; 气喘者加葶苈子、白芥子各 10g; 口渴、大便秘结者加大黄 10g。结果: 显效 30 例, 有效 28 例, 无效 2 例, 有效率 96.7%<sup>[3]</sup>。

8. 治疗外感咳嗽 有人用三拗汤治疗本病 80 例。方法: 三拗汤加味。炙麻黄、苦杏仁各 10g, 炙甘草 5g。加减: 风寒咳嗽加荆芥、紫菀、款冬花各 10g; 风热咳嗽加黄芩、桑白皮、桔梗、白前各 10g; 若痰湿重、咳痰多、胸闷、苔腻加陈皮、半夏、苏子、地龙各 10g。3 日为 1 个疗程, 治疗 3 个疗程。结果: 治愈 60 例, 好转 15 例, 无效 5 例, 总有效率 93.8%<sup>[4]</sup>。

9. 治疗小儿咳嗽变异性哮喘 有人用麻桔连翘汤治疗本病 98 例。方法: 炙麻黄、金银花、黄芩、连翘、桔梗、防风、苏子、苏梗、桃仁、杏仁、姜半夏、浙贝母、僵蚕、神曲各 4~6g, 射干 1.5~3g, 蝉蜕、甘草各 2~3g。每日 1 剂, 水煎 2 次浓缩至 100~300ml, 分 2~4 次服。结果: 显效 76 例, 好转 18 例, 无效 4 例, 总有效率 95.9%<sup>[5]</sup>。

10. 治疗外感后顽固性咳嗽 有人用三拗汤加味治疗本病 126 例。方法: 炙麻黄、杏仁、桔梗、前胡、浙贝母、射干、木蝴蝶、皂角刺各 9g, 野荞麦根 30g, 炒黄芩、黛蛤散(包煎)、桑白皮各 15g, 地肤子、人中白各 12g, 生甘草 6g。加减: 咽干舌红苔少, 加芦根 15g, 麦冬 9g; 舌苔厚腻, 湿浊明显的加生薏苡仁、炒薏苡仁各 15g, 炒莱菔子 12g。每日 1 剂, 水煎分 2 次温服, 7 日为 1 个疗程。结果: 治愈 78 例, 显效 44 例, 无效 4 例, 总有效率 96.8%<sup>[6]</sup>。

11. 治疗急性支气管炎 有人用麻杏石汤加龙骨牡蛎治疗本病 66 例。方法: 麻黄、杏仁各 8g, 石膏、煅龙骨、煅牡蛎各 24g, 板蓝根、鱼腥草、蒲公英各 18g, 浙贝母、牛蒡子、瓜蒌皮各 12g, 瓜蒌仁 15g, 桔梗 6g。咳嗽痰多, 色白质清酌加半夏、苏子、白芥子; 伴咽痒加紫苏叶、荆芥、防风; 伴胸痛加海蛤壳、青黛、丝瓜络、当归; 伴口燥咽干加北沙参、玉竹、百合。每日 1 剂, 水煎服。结果: 治疗 3~12 日, 治愈 50 例, 有效 10 例, 无效 6 例<sup>[7]</sup>。

12. 治疗面神经麻痹 有人用小续命汤加减治疗本病 30 例。方法: 麻黄、桂枝、白芍、杏仁、制附片、防风、甘草各 10g, 贯众 30g, 西党 15g, 防己 12g, 黄芩、川芎各 5g, 生姜 5 片。偏风热者去桂枝、附片、生姜, 加金银花 20g, 连翘 15g。每日 1 剂, 水煎分 2 次服, 15 日为 1 个疗程。结果: 治愈 18 例, 有效 10 例, 无效 2 例, 总有效率 93.3%<sup>[8]</sup>。



## 参 考 文 献

- 1 萧佐桃,邹高祈.中医杂病集成.长沙:湖南科技出版社,1991;69—323.
- 2 张小平.肺炎合剂为主治疗小儿支气管肺炎 180 例.湖南中医杂志,1999;(1):28.
- 3 高飞.中西医结合治疗肺心病心力衰竭 60 例总结.湖南中医杂志,1999;(3):4.
- 4 陈荣.三拗汤加味治疗外感咳嗽 80 例.浙江中医杂志,2003;(8):339.
- 5 程志源.麻桔连翘汤治疗小儿咳嗽变异性哮喘 98 例.浙江中医杂志,2005;(1):29.
- 6 戚世伟.三拗汤加味治疗外感后顽固性咳嗽 126 例.浙江中医杂志,2006;(2):80.
- 7 王莉萍.麻杏石甘汤治疗急性支气管炎 66 例.浙江中医杂志,2006;(6):328.
- 8 严湘凤.小续命汤加减治疗面神经麻痹 30 例.湖南中医杂志,2006;(3):63.

## 柴 胡

【别名】地熏、茈胡、山菜、茹草、柴草、芸蒿。

【药用部分与产地】为伞形科植物北柴胡和狭叶柴胡的根，春秋挖取根部，去净茎苗，晒干，生用或醋炒用。产于吉林、辽宁、河北、山东、安徽等地。

【成分】含柴胡皂苷、挥发油柴胡醇及  $\alpha$ -菠菜甾醇等。

【药理】

1. 抗癌作用 醇制剂 200mg(生药)/ml，在灭菌肿瘤培养内，对人体卵巢癌、纤维肉瘤等的癌细胞均有抗癌作用<sup>[1]</sup>。

2. 解热作用 煎剂 5g(生药)/kg 或醇浸膏 2.5g(生药)/kg 对实验性发热的家兔有解热作用<sup>[2]</sup>。

3. 抗炎作用 柴胡皂苷有抗渗出及抗炎等作用<sup>[2]</sup>。

4. 有改善肝功能作用 煎剂对食用霉米感染发生肝功能障碍的小鼠，其谷丙及谷草转氨酶的升高，远较不同时喂给煎剂的对照组为轻；对用伤寒疫苗引起的家兔肝功能障碍者(尿胆原呈阳性反应)，口服煎剂 0.5~1.0g(生药)/kg 有显著的改善作用<sup>[2]</sup>。

5. 有抑制杆菌作用 注射剂注射，对结核杆菌、流行性感冒病毒、牛痘病



毒及疟原虫等均有抑制作用<sup>[2]</sup>。

6. 其他作用 醇浸液及提取的粗制苷有镇静、镇痛、镇咳作用；对麻醉兔能使血压轻度下降并收缩离体兔耳血管；对离体豚鼠心房及离体蛙心均呈抑制；对离体兔肠呈局部刺激；对小鼠小肠呈推进运动；对离体的豚鼠回肠用乙酰胆碱引致的收缩有明显的促进作用。煎剂给兔口服能升高血糖，并有溶血作用<sup>[2]</sup>。

【传统应用】性味归经：苦，平，微寒，味薄气升为阳，入肝、胆经。功能：使阳气上升，引清气上行，而平少阳厥阴之邪热，宣畅气血，散结调经，为足少阳表药。主治：伤寒邪热，痰热结实，虚劳肌热，呕吐心烦，诸症寒热，头眩目赤，胸痞胁痛，口苦耳聋，妇人热入血室，胎前产后诸热，小儿痘疹，五疳羸热。散十二经疮疽，血凝气聚，功同连翘。

【临床新用途】  
1. 治疗乳腺增生症 有人以养血疏肝之法治疗本病 72 例。方法：以柴胡 10g 为主配延胡索、青皮、陈皮各 10g，当归、赤白芍、郁金、葫芦巴各 12g，枸杞子、橘核、逍遥丸各 30g，肿块较硬者加三棱、莪术各 10g；气虚者加党参 12g；阴虚者加天冬 15g；冲任失调者加肉苁蓉、巴戟天、淫羊藿各 12g，鹿角片 10g；肝肾不足，痰阻气滞者加半夏 10g，菟丝子 12g，蛤壳、六味地黄丸各 30g。此外小金丹、内消片（蜈蚣、全虫、甲片、斑蝥）、黑追风丸（斑蝥）等攻消剂可常规选用。结果：治愈 43 例，好转 27 例，无效 2 例，有效率 97.2%。疗程最长达 3 个月，最短 7 日<sup>[3]</sup>。

2. 治疗肝硬化 据报道，疏肝理脾汤治疗肝硬化 32 例。方法：以柴胡 10g 为主配青皮、白芍、越墙藤、姜厚朴、茯苓、炒扁豆、三棱各 10g，白茅根 20g，加减；小便短少加商陆、木香各 10g；便稀纳差者加神曲、山楂各 10g；黄疸者加茵陈、田基黄各 15g；消化道出血者加侧柏炭、炒地榆各 10g；肝掌有蜘蛛痣者加田七、红花各 5g，生地黄 10g；肝、脾大者加煅鳖甲、莪术各 10g；水肿甚者加猪苓、泽泻各 10g；口苦脉弦者加川连 6g。结果：痊愈 14 例（腹胀、腹水及其他主要症状消失，体征及化验检查基本正常），有效 14 例（主要症状减轻，腹水减少，化验指标接近正常），无效 2 例（主要症状及肝功能检查均无好转）<sup>[4]</sup>。

3. 治疗老年人室性早搏 据报道，有人以柴胡加龙骨牡蛎汤治疗老年人室性早搏 90 例。方法：以柴胡 10g，配红参 9g，黄芩、法半夏、桂枝各 12g，龙骨、牡蛎（先煎）各 20g，甘松、炙甘草各 10g；怔忡、失眠者加酸枣仁 15g，琥珀粉 6g；胸痛脘闷者加丹参 15g，砂仁 10g，檀香 12g；喘满发绀者加薤白、瓜蒌各 12g，三七 6g（粉碎冲服）。上方水煎服，每日 1 剂，30 日为 1 个疗程，服 2 个疗程。结果：治愈 45 例，好转 37 例，无效 8 例，总有效率 91.1%<sup>[5]</sup>。