

人机对话版

RENJIDUIHUABAN

2008

卫生专业职称考试通关捷径

WEISHENGZHUANYEZICHENGKAOSHI
CHONGGUANJIEJING

妇产科学
全真模拟试卷

卫生专业技术资格考试专家委员会/策划编写

紧扣大纲 题库权威

模拟实考 过关必备

卫生专业职称考试通关捷径

妇产科学全真模拟试卷

FUCHAN KEXUE QUANZHEN MONISHIJUAN

主编 乐 杰

副主编 林仲秋 周红林 冯丽华

编著者 (以姓氏笔画为序)

王绍娟	田丽娜	付 艳	乐 杰
乐晓妮	冯丽华	刘立新	孙晓琦
李艺扬	李佩玲	李艳芳	李晓文
李雪梅	何 冰	何 娟	宋 华
张 坦	张松灵	张海鹏	张媛媛
林仲秋	周红林	袁毅翀	顾艳伟
柴 微	徐红梅	高 竞	曹云霞
谭季春		魏振彤	

秘书 张松灵

 人民軍醫出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目(CIP)数据

妇产科学全真模拟试卷/乐杰主编. —北京:人民军医出版社, 2008. 3

(卫生专业职称考试通关捷径)

ISBN 978-7-5091-1416-2

I. 妇… II. 乐… III. ①妇科学—医药卫生人员—资格考核—习题②产科学—医药卫生人员—资格考核—习题 IV. R71-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 183920 号

策划编辑:郭伟疆 王琳 崔玲和 张利峰 文字编辑:崔玲和 责任审读:张之生

出版人:齐学进

出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927270;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927300—8139

网址:www.pmmp.com.cn

印刷:北京天宇星印刷厂 装订:京兰装订有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:31.25 字数:1025 千字

版、印次:2008 年 3 月第 1 版第 2 次印刷

印数:4501~5500

定价:69.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

前　　言

为了满足临床医学专业晋升中级资格(主治医师)全国统一考试的需要,根据人民军医出版社的选题安排,我们组织具有丰富试题编写经验的专家编写了本全真模拟试卷。本试卷的特点是紧密围绕指导用书、考试大纲和临床实践;目的是使应试者提高业务能力和应试成绩,顺利通过中级职称考试,通关成功。我们相信,只要应试者认真复习、掌握试卷所涉及的内容,踏踏实实做模拟试卷,就一定能够顺利通过全国主治医师的资格考试。

本模拟试卷总计 14 套 5 600 道全真模拟试题,涵盖妇产科学考试大纲中所有的知识点和作为主治医师应该掌握的全部内容。每套试卷均包括基础知识、相关专业知识、专业知识和专业实践能力四部分(即四份试卷),每份试卷均为 100 道题,并附参考答案。2008 年版删去“以上都不是”的多选题。读者应独立作题,在充分复习普通高等教育“十五”国家级规划教材《妇产科学》(第 6 版)及供 8 年制和 7 年制《妇产科学》教材的基础上,认真思考,完成试题。病历分析是考核拟晋升主治医师的重要内容。病历分析的能力高低,取决于正确的临床思维方法及丰富的临床实践经验。我们在附 1 中列人机对话模拟试题 30 题,以提供考试形式,供参考。特别提醒:复习和做模拟题时,千万不要把主要精力放在背记试题和答案上。

本书在编写过程中,得到吉林大学第一医院、中山大学第二医院和昆明医学院第一医院领导的大力支持,得到人民军医出版社领导和崔玲和编辑的积极帮助,得以尽快与考生见面,谨在此表示诚挚的谢意。

在修订过程中,由于参加编写的人员较多,加之时间紧迫,书中难免有不妥之处,殷切希望使用本书的考生和妇产科同道们提出,以便及时纠正改进。

衷心祝愿应试者能够顺利通过全国主治医师的资格考试,成为一名合格的妇产科主治医师。

主编 乐 杰
2007 年 10 月

编写说明

为了满足卫生专业技术人员晋升中级资格应试的需要,人民军医出版社组织具有丰富试题编写经验的各学科专家以全真模拟试卷的形式编写了《卫生专业职称考试通关捷径》丛书。本试卷的特点是紧密围绕指导用书、考试大纲和临床实践需要,目的是使应试者提高业务能力和应试成绩,顺利通过中级职称考试。我们相信,只要应试者认真复习、掌握试卷所涉及的内容,踏踏实实做模拟试卷,就一定能够顺利通过考试。

本丛书依照最新考试大纲,以全真模拟试题形式将考纲中所有知识点与各学科的系统知识结合起来,经过精心编排,模拟真实的考试环境。为考生提供了将考纲重点、知识难点、解题要点、正确答案相结合的高效率复习模式。力争通过试题将考点融会贯通,为准备晋升的医师提供复习、应试的捷径。特别提醒:复习和做模拟题时,千万不要把主要精力放在背记试题和答案上。

在编写本模拟试卷的过程中,编者得到了多方的支持与帮助,在此表示诚挚的谢意。由于参与编写的人员较多,编写时间仓促,难免有错误或疏漏之处,殷切希望广大读者批评指正,以便及时纠正和改进。

对于本套丛书存在的不足和错误,请将您的意见反馈到读者反馈信箱 info@pmmp.com.cn,以便在修订时改正。最后,衷心祝愿大家顺利通过考试!

编 者
2008年1月

目 录

全真模拟试卷一	(1)
基础知识	(1)
相关专业知识	(8)
专业知识	(16)
专业实践能力	(23)
答案	(33)
全真模拟试卷二	(35)
基础知识	(35)
相关专业知识	(42)
专业知识	(50)
专业实践能力	(57)
答案	(67)
全真模拟试卷三	(69)
基础知识	(69)
相关专业知识	(76)
专业知识	(84)
专业实践能力	(91)
答案	(101)
全真模拟试卷四	(103)
基础知识	(103)
相关专业知识	(110)
专业知识	(117)
专业实践能力	(125)
答案	(133)
全真模拟试卷五	(135)
基础知识	(135)
相关专业知识	(142)
专业知识	(150)
专业实践能力	(157)
答案	(167)
全真模拟试卷六	(169)
基础知识	(169)
相关专业知识	(176)
专业知识	(184)
专业实践能力	(191)
答案	(201)
全真模拟试卷七	(203)
基础知识	(203)
相关专业知识	(210)
专业知识	(217)
专业实践能力	(225)
答案	(235)
全真模拟试卷八	(237)
基础知识	(237)
相关专业知识	(244)
专业知识	(252)
专业实践能力	(259)
答案	(269)
全真模拟试卷九	(271)
基础知识	(271)
相关专业知识	(278)
专业知识	(285)
专业实践能力	(293)
答案	(303)
全真模拟试卷十	(305)
基础知识	(305)
相关专业知识	(312)
专业知识	(319)
专业实践能力	(327)
答案	(337)

全真模拟试卷十一	(339)
基础知识	(339)
相关专业知识	(346)
专业知识	(354)
专业实践能力	(361)
答案	(371)
全真模拟试卷十二	(373)
基础知识	(373)
相关专业知识	(380)
专业知识	(388)
专业实践能力	(395)
答案	(405)
全真模拟试卷十三	(407)
基础知识	(407)
相关专业知识	(414)
专业知识	(422)
专业实践能力	(429)
答案	(439)
全真模拟试卷十四	(441)
基础知识	(441)
相关专业知识	(448)
专业知识	(456)
专业实践能力	(463)
答案	(473)
附 1 人机对话模拟试题	(475)

全真模拟试卷一

基础知识

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 自卵巢排出的卵子，受精部位通常是在
A. 宫腔
B. 输卵管壶腹部
C. 输卵管峡部与间质部联接处
D. 输卵管壶腹部与峡部联接处
E. 输卵管伞部与壶腹部联接处
2. 妊娠 28 周末的胎儿体重，估计为
A. 600g
B. 800g
C. 1 000g
D. 1 200g
E. 1 400g
3. 属于宫颈癌的项目，错误的是
A. 多见于 40~60 岁妇女
B. 发病率居女性生殖器恶性肿瘤之首
C. 发病与宫颈炎症无关
D. 不典型增生属癌前病变
E. 原位癌不发生转移
4. 属于受精卵发育与着床项目，正确的是
A. 精子在输卵管与卵子相遇，顶体外膜破裂释放出顶体酶，称精子获能
B. 获能精子穿过初级卵母细胞透明带为受精开始
C. 受精卵着床后蜕膜产生“早孕因子”抑制母体淋巴细胞活性
D. 妊娠期子宫内膜称蜕膜
E. 囊胚与子宫肌层间的子宫内膜为包蜕膜
5. 人绒毛膜促性腺激素于妊娠期间分泌量达高峰的时期为
A. 妊娠 5~7 周
B. 妊娠 8~10 周
C. 妊娠 11~13 周
D. 妊娠 14~16 周
- E. 妊娠 17~19 周
6. 属于妊娠期母体心血管系统变化的项目，正确的是
A. 心脏向左下方移位
B. 听到收缩期杂音可诊断为心脏异常
C. 孕妇心排出量对活动的反应与未孕妇相同
D. 收缩压无变化，舒张压轻度降低
E. 下肢静脉压无明显变化
7. 进行性交后试验的最佳时间应为
A. 月经净后 3 日
B. 月经来潮前 3 日
C. 预测排卵日
D. 两次月经中间
E. 非经期的任何日期
8. 属于滋养层发育过程的项目，正确的是
A. 滋养层外层是细胞滋养细胞
B. 合体滋养细胞分化出细胞滋养细胞
C. 合体滋养细胞是分裂生长的细胞
D. 细胞滋养细胞是执行功能的细胞
E. 滋养层内面有一层细胞称胚外中胚层
9. 属于分娩时宫口扩张机制的项目，错误的是
A. 是子宫体肌肉缩复作用向上牵拉的结果
B. 是前羊膜囊扩张的作用
C. 破膜后胎先露部直接压迫宫颈
D. 宫口扩张快慢决定产程长短
E. 初产妇宫颈管消失与宫口扩张同时进行
10. 骨盆测量低于正常值的径线为
A. 骶棘间径 22cm
B. 骶嵴间径 25cm
C. 坐骨棘间径 10cm
D. 坐骨结节间径 9cm
E. 真结合径 11cm
11. 与子宫肌瘤临床症状关系不大的项目为
A. 肌瘤部位
B. 肌瘤数目
C. 肌瘤生长速度

- D. 肌瘤类型
E. 肌瘤是否变性
12. 属于胎盘产生人胎盘生乳素的项目,正确的是
A. 为糖蛋白激素
B. 合体滋养细胞分泌
C. 随妊娠进展,其分泌量渐少
D. 有抗胰岛素生成作用
E. 胎盘功能低下时浓度增大
13. 女性生殖管道的始基为
A. 中肾管
B. 泌尿生殖嵴
C. 泌尿生殖褶
D. 泌尿生殖窦
E. 副中肾管
14. 脐动脉 S/D 比值在妊娠晚期的正常值为
A. <3
B. >2
C. <2
D. >3
E. <4
15. 不属于盆膈范畴的肌肉及筋膜的项目为
A. 耻尾肌
B. 骶尾肌
C. 坐尾肌
D. 会阴浅横肌
E. 覆盖肛提肌筋膜
16. 降低孕产妇死亡率属于
A. 围婚期保健
B. 生育期保健
C. 孕产期保健
D. 哺乳期保健
E. 产褥期保健
17. 属于妊娠期母体泌尿系统变化的项目,正确的是
A. 夜尿量少于日尿量
B. 泌尿系统平滑肌张力降低
C. 肾小管对葡萄糖再吸收能力增加
D. 输尿管蠕动增强,尿流缓慢
E. 易患左侧急性肾盂肾炎
18. 不属于会阴的项目为
A. 为封闭骨盆出口的软组织
B. 前方为耻骨联合下缘
C. 后方为骶髂关节
D. 耻骨降支及骶结节韧带在两侧
E. 坐骨支及坐骨结节在两侧
19. 绘制而成妊娠图的数值不包括
A. 胎心率
B. 孕妇血压
C. 孕妇心率
D. 胎头双顶径
E. 孕妇腹围
20. 成年未生育妇女正常子宫的大小应为
A. 8cm×6cm×4cm
B. 8cm×6cm×3cm
C. 7cm×5cm×3cm
D. 6cm×4cm×2cm
E. 5cm×4cm×2cm
21. 我国发生尿瘘最常见的原因为
A. 产伤
B. 妇科手术损伤
C. 放射性损伤
D. 阴道内放腐蚀性药物
E. 膀胱病变
22. 影响宫颈柱状上皮向外移位的激素为
A. 雌激素
B. 孕激素
C. 雄激素
D. 肾上腺皮质激素
E. 甲状腺激素
23. 分娩时行左侧会阴后-侧切开,不会被切断的肌肉为
A. 球海绵体肌
B. 坐骨海绵体肌
C. 会阴浅横肌
D. 会阴深横肌
E. 部分肛提肌
24. 子宫脱垂Ⅰ度重型是指宫颈外口
A. 达坐骨棘水平
B. 达处女膜缘
C. 距处女膜缘<3cm
D. 距处女膜缘<4cm
E. 距处女膜缘>4cm
25. 临产后,胎头迟迟不入盆,测量的径线最有价值的为
A. 骶棘间径
B. 骶嵴间径
C. 坐骨棘间径
D. 骶耻外径
E. 对角径
26. 属于阴蒂的项目,正确的是
A. 位于两大阴唇顶端的联合处

- B. 无勃起性
C. 分头脚两部分
D. 阴蒂头富含神经末梢
E. 阴蒂脚附着于两侧耻骨
27. 属于无排卵性功血病理改变的项目, 错误的是
A. 出现萎缩型子宫内膜
B. 出现分泌不良内膜
C. 月经后半期表现为增生期内膜
D. 出现不典型增生已属癌前病变
E. 月经周期中内膜均呈单纯型增生
28. 不属于胎心率晚期减速特征的项目为
A. 胎心率下降起点落后于宫缩曲线上升起点
B. 多在宫缩波峰处开始
C. 胎心率曲线减速波谷落后于宫缩曲线波峰
D. 下降幅度<50 次/分
E. 胎心率恢复至原水平所需时间较短
29. 孕妇尿中与胎儿胎盘功能关系密切的激素为
A. 雌酮
B. 雌二醇
C. 雌三醇
D. 孕酮
E. 睾酮
30. 临产后的子宫收缩不能观察到的项目为
A. 宫缩持续时间
B. 宫缩强度
C. 宫缩规律性
D. 宫缩间歇时间
E. 宫缩极性
31. 属于正常骨产道的项目, 正确的是
A. 最短的前后径是中骨盆前后径
B. 最短的横径是骨盆入口横径
C. 骨盆轴下段向下向前
D. 中骨盆横径相当于两髂臼中心
E. 骨盆倾斜度正常值为 70°
32. 属于女性内生殖器血液供应的项目, 正确的是
A. 子宫动脉上支供应输卵管与卵巢
B. 子宫动脉下支比子宫动脉上支细
C. 卵巢动脉来自肾动脉
D. 卵巢动脉经卵巢固有韧带到达卵巢
E. 阴道动脉来自阴部内动脉
33. 子宫肌瘤组织中含量最高的激素为
A. 孕酮
B. 睾酮
- C. 雌二醇
D. 雌酮
E. 催乳激素
34. 胎头枕额径为
A. 两顶骨隆突之间
B. 由鼻根上方到枕骨隆突
C. 由前囟前端到枕骨大孔
D. 由前囟中央到枕骨隆突下方
E. 由颏骨下方中央到后囟顶部
35. 临产后第一产程活跃期的加速期是指宫口扩张
A. 1~2cm
B. 3~4cm
C. 5~6cm
D. 7~8cm
E. 9~10cm
36. 子宫内膜增生期中期的组织学特征为
A. 腺体数增多, 腺上皮细胞增生活跃
B. 内膜表面略呈波浪状, 腺体呈弯曲状
C. 内膜腺体开口面向宫腔, 有糖原等分泌物溢出
D. 见到细胞内的糖原排入腺腔
E. 以上都不是
37. 属于枕左前位分娩机制的项目, 正确的是
A. 胎头进入骨盆入口时呈俯屈状态
B. 下降动作呈持续性
C. 俯屈动作完成后, 胎头以枕额径通过产道
D. 胎头颅骨最低点达骨盆最大平面时出现内旋转
E. 内旋转动作完成于第一产程末期
38. 人工流产综合反应的发生原因主要为
A. 长时间仰卧截石位
B. 精神过度紧张
C. 迷走神经虚脱症状
D. 疼痛刺激
E. 吸宫时负压过大
39. 妻子患常染色体显性遗传病, 丈夫染色体正常, 其子女预期危险率为
A. 1/2
B. 1/4
C. 1/8
D. 1/16
E. 1/32
40. 收集妇科病史时, 错误的是
A. 病情越重, 抢救前越需要详细了解和掌握病情

- B. 对外院转诊者,应阅读病情介绍
C. 对患者可以启发,但避免暗示
D. 主诉简单明确地提出主要症状和持续时间
E. 对有鉴别诊断意义的阴性症状应列入现病史中
41. 属于产后子宫重量逐渐减少的项目,错误的是
A. 分娩结束时约为 800g
B. 产后 1 周约为 500g
C. 产后 2 周约为 300g
D. 产后 6 周约为 60g
E. 产后 8 周约为 50g
42. 判断排卵日最简单的辅助检查方法为
A. 尿孕二醇测定
B. 孕激素试验
C. 基础体温测定
D. 子宫内膜活检
E. 检测血 LH 值
43. 属于流产临床过程的项目,正确的是
A. 妊娠 8 周前的流产,多为不全流产
B. 妊娠 8~12 周的流产,多为完全流产
C. 难免流产时妊娠试验均为阴性
D. 难免流产是由不全流产发展而来
E. 不全流产可发生失血性休克
44. 妊娠期间阑尾位置随孕周增长的变化特点为
A. 向上、内、后移位
B. 向上、外、后移位
C. 向上、内、前移位
D. 向上、外、前移位
E. 向上、后移位
45. 白色恶露一般持续时间为
A. 1 周
B. 2 周
C. 3 周
D. 4 周
E. 5 周
46. 继发性痛经最典型的体征应为
A. 宫颈举痛
B. 阴道后穹隆饱满
C. 宫骶韧带触痛性结节
D. 子宫后倾、不活动
E. 子宫增大、压痛
47. 属于早产的概念,正确的是
A. 妊娠 20 足周至不满 37 足周间终止者
B. 妊娠 24 足周至不满 36 足周间终止者
- C. 妊娠 28 足周至不满 36 足周间终止者
D. 妊娠 28 足周至不满 37 足周间终止者
E. 妊娠 28 足周至不满 38 足周间终止者
48. 属于女性外生殖器解剖的项目,错误的是
A. 阴阜皮下有丰富的脂肪组织
B. 大阴唇富含神经末梢
C. 小阴唇为一对纵行皮肤皱襞,表面湿润
D. 阴蒂为与海绵体相似的组织
E. 阴道前庭为两侧小阴唇之间的菱形区
49. 子宫内膜癌手术-病理分期ⅢB 期是指癌
A. 侵犯肌层 > 1/2
B. 累及宫颈黏膜腺体
C. 侵犯宫颈间质
D. 侵犯浆膜和(或)附件
E. 累及阴道上 1/3 段
50. 不属于女性内生殖器淋巴回流的项目为
A. 阴道上段淋巴汇入腹股沟深淋巴结
B. 阴道下段淋巴主要汇入腹股沟浅淋巴结
C. 宫颈淋巴大部汇入闭孔淋巴结及髂内淋巴结
D. 宫体两侧淋巴汇入腹股沟浅淋巴结
E. 输卵管淋巴汇入腰淋巴结
51. 胎儿娩出至胎盘胎膜娩出所需时间,应为
A. 5~10 分钟,不超过 15 分钟
B. 5~10 分钟,不超过 25 分钟
C. 5~15 分钟,不超过 30 分钟
D. 10~20 分钟,不超过 30 分钟
E. 20~30 分钟,不超过 60 分钟
52. 属于卵巢周期性变化的项目,正确的是
A. 成熟卵泡是卵泡发育的最后阶段
B. 颗粒细胞间血管丰富
C. 卵泡内膜层无血管存在
D. 卵泡外膜与卵巢间质有明显界限
E. 卵泡外膜细胞演变为放射冠
53. 切除全子宫及双侧附件时,不会切断的韧带为
A. 卵巢固有韧带
B. 骨盆漏斗韧带
C. 阔韧带
D. 主韧带
E. 圆韧带
54. 行子宫输卵管碘油造影,不符合生殖器结构征象的项目为
A. 宫腔狭窄,边缘呈锯齿形
B. 输卵管腔有多个狭窄部分,呈典型串珠状
C. 相当于输卵管卵巢部位有钙化灶
D. 碘油进入子宫一侧或两侧静脉丛,可排除子

- 宫内膜结核
- E. 输卵管管腔细而僵直
55. 属于输卵管解剖特点的项目,正确的是
- A. 位于阔韧带上缘内
 - B. 全长 15~18cm
 - C. 输卵管分为 3 部分
 - D. 峡部在壶腹部的外侧
 - E. 峡部管腔最窄
56. 属于羊水过多的项目,错误的是
- A. 胎儿畸形率高
 - B. 易发生早产
 - C. 为剖宫产指征
 - D. 易发生妊娠期高血压疾病
 - E. 易发生产后出血
57. 女性生殖器官与邻近器官的关系,错误的是
- A. 膀胱充盈不影响盆腔检查
 - B. 输尿管于宫颈内口水平外侧 2cm 向前进入膀胱
 - C. 阴道前穹隆穿刺易引起膀胱损伤
 - D. 阑尾炎症可波及右附件
 - E. 尿道长 4~5cm,邻近阴道,易感染
58. 不属于母乳喂养的项目为
- A. 新生儿吸吮橡皮奶头可做安慰物
 - B. 指导母亲喂奶方法
 - C. 与新生儿分开时应保持泌乳
 - D. 禁止给新生儿喂糖水或牛乳
 - E. 促进母乳喂养支持组织的建立
59. 卵巢表面的组织为
- A. 腹膜
 - B. 卵巢白膜
 - C. 生发上皮
 - D. 结缔组织
 - E. 卵巢皮质
60. 属于细菌性阴道病的项目,正确的是
- A. 阴道 pH 为 6.5
 - B. 阴道黏膜明显充血
 - C. 阴道分泌物黏稠
 - D. 阴道黏膜不充血
 - E. 分泌物中未查出线索细胞
61. 不可能引起闭经的疾病为
- A. 甲状腺功能亢进症
 - B. 甲状旁腺功能亢进
 - C. 肾上腺皮质功能亢进
 - D. 胰岛素抵抗
 - E. 垂体催乳激素腺瘤
62. 易发生蒂扭转的卵巢囊肿为
- A. 皮样囊肿
 - B. 子宫内膜异位囊肿
 - C. 黏液性囊腺瘤
 - D. 浆液性囊腺瘤
 - E. 滤泡囊肿
63. 不属于第二产程心脏负担最重原因的项目为
- A. 血容量增加
 - B. 腹压增加,内脏血液涌向心脏
 - C. 肺循环压力增加
 - D. 周围阻力更增大
 - E. 心排血量及平均动脉压增加
64. 胎儿生长受限儿的死亡率为正常儿的
- A. 1~3 倍
 - B. 4~6 倍
 - C. 7~9 倍
 - D. 10~12 倍
 - E. 13~15 倍
65. 外因性不均称型胎儿生长受限的新生儿,除体重偏低外的特点为
- A. 身长与孕龄相符,头径偏低
 - B. 身长与孕龄相符
 - C. 头径与孕龄相符
 - D. 身长、头径与孕龄相符
 - E. 头径与孕龄相符,身长偏低
66. 初孕妇,28岁,3周前开始胎动,检查子宫长度为 23cm,比较符合实际的妊娠周数应为
- A. 14~16 周
 - B. 17~19 周
 - C. 20~22 周
 - D. 23~25 周
 - E. 26~28 周
67. 新生儿出生 1 分钟,心率 90 次/分,律齐,呼吸浅且不规律,四肢活动好,吸羊水时喉部有反射动作,躯干皮肤红润,四肢青紫,Apgar 评分应为
- A. 9 分
 - B. 8 分
 - C. 7 分
 - D. 6 分
 - E. 5 分
68. 少女,15岁,腹部叩诊移动性浊音(+)。肛诊左附件区触及新生儿头大实质性肿瘤,

血清甲胎蛋白值 $>400\mu\text{g/L}$ 。本例卵巢肿瘤应诊断为

- A. 未成熟畸胎瘤
- B. 内胚窦瘤
- C. 浆液性囊腺瘤
- D. 颗粒细胞瘤
- E. 纤维瘤伴腹水

二、以下提供若干案例，每个案例下设若干考题。

请根据各考题题干所提供的信息，在每道题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(69~71题共用题干)

女，46岁，月经过多半年，周期不定，经期延长，末次月经于两周前，检查子宫正常大小，质软。

69. 本例可能的诊断为

- A. 子宫内膜癌
- B. 子宫肌瘤
- C. 绝经过渡期功血
- D. 子宫肌腺病
- E. 早孕

70. 若月经来潮4小时行刮宫，镜下见子宫内膜腺上皮呈高柱状，核分裂象增多，腺体较长，呈弯曲状，小动脉略弯曲，本例子宫内膜应为

- A. 增生晚期内膜
- B. 分泌晚期内膜
- C. 月经期内膜
- D. 蜕膜
- E. 子宫内膜不典型增生

71. 本例恰当的处理措施为

- A. 人工周期治疗
- B. 周期性孕激素治疗
- C. 连续孕雄激素治疗
- D. 连续雌孕激素治疗
- E. 子宫切除

(72~74题共用题干)

经产妇，25岁，产后第一天，主诉下腹痛。查低热、出汗，咽不充血，脐下2横指触及有宫缩的宫底。血白细胞计数稍高，中性粒细胞0.70。

72. 本例最可能的诊断为

- A. 产后子宫内膜炎
- B. 产后宫缩痛
- C. 子宫肌瘤红色变

D. 卵巢囊肿蒂扭转

- E. 子宫肌炎

73. 正常产后第3日，乳房胀痛，无红肿，乳汁少，伴低热。处理方法首选

- A. 芒硝敷乳房
- B. 生麦芽煎汤饮
- C. 用吸乳器吸乳汁
- D. 让新生儿多吸吮双乳
- E. 少喝汤水

74. 经治疗于产后第5日，双乳房胀痛，乳汁排出不畅，最常见的原因为

- A. 进食少
- B. 卧床不活动
- C. 未及早按摩、热敷乳房
- D. 未给新生儿早吸吮、多吸吮
- E. 乳头凹陷

(75~78题共用题干)

26岁初产妇，妊娠39周，规律宫缩6小时，宫口开大3cm，未破膜，枕左前位，估计胎儿体重2500g，胎心144次/分，骨盆外测量未见异常。

75. 此时恰当处理应为

- A. 抑制宫缩，使其维持至妊娠40周
- B. 等待自然分娩
- C. 人工破膜加速产程进展
- D. 静脉滴注缩宫素
- E. 行剖宫产术

76. 若此后宫缩渐弱，产程进展已达20小时，胎膜已破，宫口仅开大6cm，此时恰当处理应为

- A. 等待自然分娩
- B. 肌注麦角新碱，加速产程进展
- C. 静脉滴注缩宫素
- D. 静注地西洋，加速产程进展
- E. 立即行剖宫产术

77. 若宫口开全，胎头拨露已半小时，此时处理应为

- A. 肌注盐酸哌替啶100mg
- B. 静滴葡萄糖液内加维生素C
- C. 静脉滴注缩宫素
- D. 产钳术助产
- E. 立即行剖宫产术

78. 胎盘娩出后6分钟开始阴道多量流血，时多时少，检查宫底有时扪不清，此时应考虑出血原因为

- A. 子宫收缩乏力
- B. 宫颈裂伤
- C. 阴道裂伤
- D. 凝血功能障碍
- E. 胎盘残留

(79~81题共用题干)

女,27岁,停经70日,阴道中等量流血3日伴发热,昨日阴道排出较大肉样组织,今晨突然大量阴道流血,血压86/64mmHg,体温38.2℃,脉搏116次/分,子宫如孕2个月大,宫口可通过1指,阴道分泌物明显臭味,血白细胞总数 $14.5 \times 10^9/L$,中性粒细胞0.80,血红蛋白78g/L。

79. 本例应诊断为感染合并

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 稽留流产
- D. 不全流产
- E. 完全流产

80. 本例除抗体克外,还需进行的紧急处理为

- A. 大量输血、输液
- B. 静脉滴注缩宫素
- C. 静脉滴注广谱抗生素
- D. 钳夹宫腔内妊娠产物
- E. 立即进行彻底清宫

81. 本例自然流产最常见的原因为

- A. 孕妇患甲状腺功能低下
- B. 孕妇接触放射线物质
- C. 孕妇细胞免疫调节失调
- D. 母儿血型不合
- E. 遗传基因缺陷

三、以下提供若干组考题,每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(82~86题共用备选答案)

- A. 女型骨盆
- B. 单纯扁平骨盆
- C. 类人猿型骨盆
- D. 男型骨盆
- E. 骨软化症骨盆

82. 骨盆入口呈横椭圆形,入口横径较前后径稍长,耻骨弓较宽

- 83. 骨盆入口呈凹三角形,骶岬突向前,耻骨联合向前突,坐骨结节间径明显缩短
- 84. 骨盆入口呈横扁圆形,骶岬向前下突出,骨盆入口横径正常
- 85. 骨盆入口略呈三角形,两侧壁内聚,坐骨棘突出,耻骨弓较窄
- 86. 骨盆入口呈长椭圆形,入口、中骨盆及骨盆出口和横径均狭窄

(87~88题共用备选答案)

- A. TSH
- B. 雄激素
- C. FSH
- D. LH
- E. GnRH

87. 主要来源于肾上腺皮质的激素为

88. 下丘脑弓状核神经细胞分泌的激素为

(89~92题共用备选答案)

- A. 妊娠16~20周
- B. 妊娠24周后
- C. 妊娠24~36周
- D. 妊娠32~34周
- E. 妊娠36周起

89. 检查羊水细胞染色体最合适时期为

90. 作骨盆径线内测量的最合适时期为

91. 腹部检查能区别胎头、胎体的最早时期为

92. 臀先露可行外转胎位术的时期为

四、以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择备选答案中所有正确答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

93. 保持子宫前倾的韧带有

- A. 圆韧带
- B. 主韧带
- C. 阔韧带
- D. 宫骶韧带
- E. 骨盆漏斗韧带

94. 属于胎儿窘迫临床表现的项目包括

- A. 12小时胎动9次
- B. 胎心监护胎心率为106bpm
- C. 羊水Ⅲ度污染
- D. 孕妇尿E3值为5mg/24h
- E. NST胎动时胎心率加速5bpm

95. 羊水栓塞出现休克之前,先兆症状包括
 A. 烦躁不安
 B. 寒战
 C. 恶心
 D. 呕吐
 E. 气急
96. 巨大卵巢囊肿的特征包括
 A. 平卧时腹部中间隆起
 B. 叩诊腹部鼓音,两侧浊音
 C. 无移动性浊音
 D. 下腹可触及边界清楚的肿块
 E. B超见液性暗区随体位移动
97. 属于妊娠期卵巢的变化有
 A. 卵巢增大
 B. 停止排卵
 C. 可见双侧妊娠黄体
 D. 妊娠黄体功能于孕10周被胎盘完全取代
 E. 妊娠黄体于孕10周开始萎缩
98. 临产后进行肛门检查了解胎头下降程度
- 时,能够用作标记的项目为
 A. 矢状缝
 B. 耻骨联合后面
 C. 骶岬
 D. 坐骨棘
 E. 坐骨结节
99. 能够协助诊断前置胎盘的项目为
 A. 不同类型决定出血时期及出血量
 B. 出血常伴宫缩及阵发性腹痛
 C. 胎头高浮或胎位异常
 D. 胎膜破口距胎盘边缘4cm
 E. 超声检查可确定胎盘边缘位置
100. 不属于短效口服避孕药避孕机制的项目包括
 A. 增加宫腔分泌液
 B. 抑制卵泡生长发育
 C. 阻止受精卵着床
 D. 抑制排卵
 E. 使宫颈黏液变稠

相关专业知识

一、以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 胎儿娩出后5分钟,产妇出现多量阴道流血,最可能的原因
 A. 胎盘部分剥离
 B. 宫颈裂伤
 C. 子宫收缩乏力
 D. 阴道静脉破裂
 E. 凝血功能障碍
2. 原发性不孕的定义为
 A. 夫妇同居,性生活正常,未避孕,2年未孕者
 B. 夫妇同居,性生活正常,未避孕,1年未孕者
 C. 夫妇同居,性生活正常,虽第一次婚姻曾生育,此后未避孕2年未孕者
 D. 夫妇同居,性生活正常,虽第一次婚姻曾生育,此后未避孕1年未孕者
 E. 夫妇同居后1年未孕,一方有无法纠正的解剖生理缺陷者

3. 妊娠期高血压疾病的高危因素不包括
 A. 孕妇年龄<25岁
 B. 多胎妊娠
 C. 慢性高血压
 D. 糖尿病
 E. 低社会经济状况
4. 属于子宫内膜癌的项目,正确的是
 A. 单纯化疗治疗效佳
 B. 40~50岁妇女居多
 C. 常见症状是大量阴道流血
 D. 晚期用大剂量孕激素治疗有效
 E. 宫腔冲洗液查癌细胞是最有效的诊断
5. 属于妊娠期肝内胆汁淤积症的项目,错误的是
 A. 是妊娠中晚期特有的并发症
 B. 皮肤瘙痒和黄疸为临床特征
 C. 对孕妇危害大于对胎儿危害
 D. 病因目前尚不清楚
 E. 冬季发病高于夏季
6. 不属于异位妊娠的项目为

- A. 宫颈妊娠
B. 输卵管妊娠
C. 卵巢妊娠
D. 腹腔妊娠
E. 子宫残角妊娠
7. 属于妊娠滋养细胞疾病的项目,错误的是
A. 妊娠滋养细胞肿瘤不包括葡萄胎
B. 葡萄胎二次刮宫标本中镜下见到退变绒毛可诊断为侵蚀性葡萄胎
C. 侵蚀性葡萄胎和绒癌对化疗敏感
D. 侵蚀性葡萄胎多发生在葡萄胎清宫术后6个月内
E. 绒毛膜癌易发生肺转移
8. 胎盘早剥部位出血发生在
A. 底蜕膜
B. 包蜕膜
C. 绒毛膜
D. 胎盘边缘血窦
E. 子宫螺旋动脉
9. 单卵双胎发生在桑葚期(早期囊胚)的结局为
A. 各自形成独立的胎盘,形成双羊膜囊单绒毛膜共用一个胎盘
B. 各自发育成两个胎儿,共享一个胎盘,共存于一个羊膜腔内
C. 发育成包入性寄生胎(胎内胎)
D. 发育成不同形式联体儿
E. 形成两个受精卵,两个羊膜囊和两个绒毛膜,独立着床形成各自胎盘
10. 不属于副中肾管发育异常的项目为
A. 阴道闭锁
B. 处女膜闭锁
C. 输卵管发育不全
D. 双角子宫
E. 单角子宫
11. 属于输卵管妊娠的项目,正确的是
A. 流产型多在孕6~8周
B. 破裂型多在孕10周左右
C. 破裂型多发生在壶腹部
D. 间质部妊娠多在孕5个月时破裂
E. 间质部妊娠破裂出血较多
12. 紧急避孕药避孕的主要机制为
A. 增加宫腔分泌液
B. 抑制卵泡生长发育
C. 阻止受精卵着床
D. 抑制排卵
- E. 使宫颈黏液变稠
13. 属于羊水过多概念的项目,正确的是
A. 妊娠末期羊水量>2000ml
B. 妊娠足月羊水量>2000ml
C. 妊娠任何时期羊水量>2000ml
D. 妊娠近足月羊水量≥2000ml
E. 妊娠32周以后羊水量≥2000ml
14. 导致内因性均称型胎儿生长受限的因素不包括
A. 染色体异常
B. 病毒宫内感染
C. 叶酸、氨基酸缺乏
D. 接触放射线
E. 重症贫血
15. 属于前庭大腺的项目,正确的是
A. 又称巴多林腺
B. 妇科检查时能够触及时
C. 平时分泌黏液
D. 腺管开口于阴道口两侧
E. 腺管开口闭塞可形成脓肿
16. 连续检测12小时的胎动总数,提示为胎儿窘迫的次数应小于
A. 10次
B. 15次
C. 20次
D. 25次
E. 30次
17. 成年妇女正常宫腔容量为
A. 2ml
B. 3ml
C. 5ml
D. 8ml
E. 10ml
18. 不属外因性不均称型胎儿生长受限新生儿特点的项目为
A. 外表无营养不良表现
B. 身长、头径与孕龄相符,体重较轻
C. 各脏器细胞数量正常,但细胞体积缩小,以肝脏为著
D. 胎盘体积正常,功能下降
E. 出生时新生儿常有低血糖
19. 属于妊娠合并心脏病的项目,正确的是
A. 总血容量于妊娠36~38周增加达高峰
B. 心功能Ⅲ、Ⅳ级不宜妊娠
C. 为预防产后出血,静注麦角新碱
D. 发生产后出血,应快速输血

- E. 产时未发生心力衰竭,产后通常不再发生心衰
20. 卵巢囊肿发生蒂扭转时,其蒂的组成应为
A. 骨盆漏斗韧带、卵巢固有韧带、输卵管、圆韧带
B. 骨盆漏斗韧带、卵巢固有韧带、输卵管
C. 骨盆漏斗韧带、输卵管、圆韧带
D. 骨盆漏斗韧带、卵巢固有韧带、圆韧带
E. 输卵管、卵巢固有韧带
21. 需与妊娠合并病毒性肝炎相鉴别的疾病不包括
A. 妊娠剧吐
B. 妊娠期急性脂肪肝
C. 子痫前期
D. 妊娠合并糖尿病
E. 妊娠期肝内胆汁淤积症
22. 生长激素腺瘤导致的闭经属于
A. 子宫性闭经
B. 卵巢性闭经
C. 肾上腺性闭经
D. 垂体性闭经
E. 下丘脑性闭经
23. 属于原发性输卵管癌的项目,正确的是
A. 平均发病年龄40岁
B. 发病与长期雌激素刺激可能有关
C. 好发于壶腹部,单侧居多
D. 病灶起自输卵管浆膜
E. 血行转移为主
24. 妊娠晚期妇女24小时尿蛋白定量不应达到
A. 0.1g
B. 0.2g
C. 0.3g
D. 0.4g
E. 0.5g
25. 卵巢癌患者术后病理报告为左髂总淋巴结转移,手术-病理分期应为
A. II b期
B. II c期
C. III a期
D. III b期
E. III c期
26. 属于排卵性月经失调发病机制的项目,错误的是
A. 黄体过早衰退
B. 可并发催乳激素水平增高
- C. 黄体发育良好,但萎缩过程延长
D. LH不足使黄体发育不全,孕激素分泌减少
E. FSH缺乏使卵泡发育缓慢,雌激素减少,黄体无法形成
27. 最常见的卵巢恶性肿瘤为
A. 库肯勃瘤
B. 未成熟畸胎瘤
C. 绒毛膜癌
D. 浆液性囊腺癌
E. 黏液性囊腺癌
28. 子宫内膜异位症的好发年龄为
A. 15~35岁
B. 20~40岁
C. 25~45岁
D. 30~50岁
E. 35~55岁
29. 属于心脏病孕妇于分娩期血流动力学变化的项目,错误的是
A. 第一产程宫缩使周围循环阻力增加,全身血容量减少
B. 第二产程宫缩时屏气,肺循环压力加大
C. 第二产程腹压增大,内脏血液涌向心脏,回心血量增加
D. 第三产程胎儿娩出后,子宫胎盘循环停止,大量血液进入体循环,回心血量增加
E. 第三产程子宫迅速缩小,腹压减低,大量血液回到内脏,回心血量减少
30. 重度子痫前期孕妇,于妊娠晚期出现腹痛伴阴道流血,最可能的疾病为
A. 边缘性前置胎盘
B. II度胎盘早剥
C. 宫颈癌
D. 子宫破裂
E. 脐带帆状附着
31. 怀疑为子宫内膜不规则脱落,理想取内膜活组织检查的时间应为
A. 月经第1日
B. 月经第5日
C. 月经干净后3日
D. 月经周期中间
E. 月经来潮前12小时
32. 属于老年性阴道炎的项目,错误的是
A. 常见于绝经后妇女
B. 阴道壁可有表浅溃疡
C. 阴道黏膜有散在出血点
D. 口服尼尔雌醇有效