


HUAHUI



木本花卉

▲ 储博彦 主编



河北科学技术出版社



MU BENG HUA HUI

木本花卉

储博彦 主编



河北科学技术出版社

主 编 储博彦

副 主 编 路丙社

编写人员 徐振华 王学勇 白志英

摄 影 纪惠芳 纪殿荣

图书在版编目(CIP)数据

木本花卉/储博彦主编. —石家庄:河北科学技术出版社,
2002

ISBN 7-5375-2600-1

I. 木... II. 储... III. 木本植物-花卉-观赏园艺 IV. S685

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 047875 号

木本花卉

储博彦 主编

河北科学技术出版社出版发行(石家庄市和平西路新文里8号)

河北新华印刷二厂印刷 新华书店经销

850×1168 1/32 4印张 2003年1月第1版

2003年1月第1次印刷 印数:1—3000 定价:26.00元



目录

叶子花	1
阔叶十大功劳	4
海桐	6
八仙花	9
红檵木	12
月季	15
贴梗海棠	19
玫瑰	22
重瓣榆叶梅	26
白鹃梅	29
棣棠	31
鸡麻	34
红碧桃	36
黄刺玫	39
火棘	42
刺桐	44
香椽	46
金橘	48
佛手	50
米兰	52
一品红	54
枸骨	57
悬铃花	59
木槿	61
山茶花	63





倒挂金钟·····	66
红瑞木·····	68
杜 鹃·····	71
紫金牛·····	74
朱砂根·····	76
金钟花·····	78
迎春花·····	81
毛茉莉·····	83
鸡蛋花·····	85
软枝黄蝉·····	88
五色梅·····	90
桢 桐·····	93
紫 珠·····	95
海州常山·····	97
美国凌霄·····	99
虾衣花·····	101
金苞花·····	103
龙船花·····	105
粉叶金花·····	108
猬 实·····	110
锦带花·····	113
海仙花·····	116
金银木·····	119
天目琼花·····	122



叶子花

◆ 别 名

毛宝巾、三角花。

◆ 形态特征

攀缘性灌木，茎木质，有倒钩刺。单叶互生，卵形或倒卵形。小花淡红或黄色，苞片显著，形似叶，色似花，红色或紫色。


◆ 生长习性

喜温暖、湿润，要求强光和富含腐殖质的肥沃土壤。

◆栽培管理

以扦插繁殖为主。成活后及时上盆，盆土以壤土、牛粪、腐叶及河沙混合堆积腐熟，用时再加适量骨粉。栽后浇透水，栽培中要经常摘心，以形成丛生低矮株形。生长期每月施一次饼肥水，花期增施几次磷肥，适时浇水、松土、除草。花期及时清理落花、落叶，花后整形修剪，促生更多茁壮新枝。5年左右重剪一次。10月下旬移入温室，室温18℃左右，冬季控制浇水，使植株充分休眠，则来年花期会更加花繁色艳。







• 阔叶十大功劳


阔叶十大功劳

◆ 形态特征

常绿灌木。奇数羽状复叶，卵形至卵状椭圆形，坚硬革质；叶缘反卷，有刺状齿。花黄色，有香气，总状花序直立。浆果卵形，蓝黑色。

◆ 生长习性

性强健，耐阴，喜温暖气候。



◆栽培管理

可用播种、扦插或分株法繁殖。无论是播种苗、扦插苗还是分株苗，均需带宿土或土球移栽。移栽最好在4~5月或10月进行；栽植后及时喷水，稍加遮阳，缓苗后转入正常管理。生长季节结合浇水追肥2~3次，苗木枝繁叶茂。对土壤要求不严，但在湿润、排水良好、肥沃的沙质壤土中生长最好。盆栽要注意经常保持盆土湿润，冬季要在不低于5℃的温度下越冬，每3~5年换一次盆。

• 海 桐





海桐

◆ 别名

海桐花、七里香、山攀花。

◆ 形态特征

常绿灌木或小乔木，树冠球形。单叶互生，枝顶常轮生，革质，倒卵形。顶生伞房花序，花白色或淡黄绿色。

◆ 生长习性

喜光，略耐阴，耐寒，耐贫瘠。对土壤要求不严，忌水涝。



◆栽培管理

以播种繁殖为主，也可扦插繁殖。要求土壤肥沃、排水良好。播种于春季进行，播前种子应先用草木灰或碱水浸泡，搓去黏胶，再用清水洗净沙藏。扦插在4~6月进行，半嫩枝扦插成活率高。移栽时应带土坨，注意保护树形，并遮阳缓苗。干旱季节适当浇水，可能时冬季施肥一次。北方冬季置0℃以上室内，控制浇水即可。高温干旱期，注意防止介壳虫寄生。



• 八仙花



八仙花

◆ 别 名

绣球花、阴绣球。

◆ 形态特征

落叶灌木。叶对生，椭圆形至阔卵形。伞房花序顶生，具总梗，全为不孕花。花初开时绿色转为白色，后变成蓝色或粉红色。

◆ 生长习性

性喜温暖、湿润及半阴环境，适宜肥沃、富含腐殖质、排水良好的酸性壤土，不耐碱。

◆栽培管理

扦插、压条、分株皆可繁殖，以扦插为主。3月份扦插苗生根后移入7厘米盆中，5月上旬转入10厘米的盆中，6月中旬定植于17厘米盆中。6月进行第一次摘心。生长期每2~3周施以豆饼、人粪尿或鸡粪沤制的稀释液肥一次，以促其生长和花芽分化。北方碱性土地地区，常施硫酸亚铁或硫酸亚铁与其他有机肥料配置的矾肥水，以中和碱性。盆土可用壤土、腐叶土或堆肥土等量混合，并配入适量河沙。春暖后移于室外荫棚下培养；8月以后增加光照，促进花芽形成；9月以后逐渐减少灌水，促使枝条充实，准备进入休眠；10月底摘除叶片移入温室，控制浇水，维持半干状态，室温保持在3~5℃，令其充分休眠。花后应换较大的花盆，更换培养土，以恢复其长势。



•红榿木



红榿木

◆ 别 名

榿花、榿木。

◆ 形态特征

常绿灌木或小乔木。单叶互生，暗紫色，革质，卵形至椭圆形。花3~8朵组成头状花序，花瓣4枚，带状，紫红色。

◆ 生长习性

喜光，稍耐半阴，有一定抗旱性，不耐寒，适应性较强。