

分 类 草 药 性

新编

附：草药三字经



中医古籍出版社

原著 ◆ 清·无名氏
新编 ◆ 邬家林 谢宗万

原著 清·无名氏

新编 邬家林 谢宗万

分类草药性 新编

附：草药三字经

中医古籍出版社

责任编辑：刘 婷
封面设计：天水工作室

图书再版编目（CIP）数据

分类草药性新编 / 邬家林，谢宗万编著. —北京：中医古籍出版社，2007

ISBN 7-80174-219-2

I . 分… II . ①邬… ②谢… III. 中草药—中药性
味 IV. R285. 1

中医古籍出版社出版发行
(北京东直门内南小街 16 号 100700)
全国各地新华书店经销
北京金信诺印刷有限公司 印刷
787 × 1092 毫米 16 开 11.5 印张 28 千字
2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷
印数 0001~3000 册
ISBN 7-80174-219-2/R · 218
定价：16.00 元

前　　言

《分类草药性新编》是在《分类草药性》的基础上，经原文校注，基原考订，并按药性本草的基本内容，整理新编而成。

《分类草药性》原名《草药性》，系清代四川地方性草药书，不著撰人，可能经多人将民间草药医生经验多次汇集而成，非一人之作。该书自清代以来，在四川等地广为流传，现存有清代、民国年间的下列木刻版本：

甲. 清·光绪丙午年（1906年）重庆文华堂刻本（简称甲本）。书名《草药性》，封面右上角刻有“天宝神方”，扉页为神农画像，分草、藤、风、杂类（上卷）和根、头、皮、叶、花、子、香、椒、麻、龙、箭、石、菜、蒿、角、衣、莲（下卷）等21类，莲类置于末尾。载药437味。

乙. 清·宣统三年（1911年）诚德堂藏版（简称乙本）。书名《分类草药性》，扉页无神农画像，不分卷，但以整个草药性为上卷，将《天宝本草》作为下卷装订在一起。分类与甲本相同，但莲类置于香、椒类之间，衣类置于末尾。载药420味。

丙. 民国七年（1918年）成都博文堂藏版（简称丙本）。书名、版式及内容与乙本同。

丁. 民国二十一年（1932年）吕文明、吕文滨藏版（简称丁本）。书名、版式及内容与乙本同。

戊. 民国二十八年（1939年）新刊本（简称戊本）。书名、版式及内容与乙本同。

以上版本中，甲本虽然出版时间较早，但少数药味有重复，文字错漏较多。相比之下，乙本则在一定程度上克服了甲本的上述缺点。丙、丁、戊本是不同年代的重刻本。

《草药性》的首刊年代不明，但从甲本末页附言“此书草药各种性，神农尝下百草根，古往今来治世病，莫大之功到而今，余将字迹来改正，重纂新刻实费心，士农工商存一本，家吉人祥万事兴。”分析，此前必有旧刻本。再根据甲本封面右上角所刻“天宝神方”分析，此书估计与《天宝本草》有关，可能选《天宝本草》中部分草药而阐述其药性。诚如是，则《草药性》应在《天宝本草》之后。《天宝本草》最早的版本为同治年间刻本，现存最早的版本为光绪二年（1876年）刻本，《草药性》的成书年代应在光绪二年至光绪丙午年（1876~1906年）之间。《分类草药性》一名虽晚出于宣统三年（1911年），但对后世的影响更大，并已为《中药大辞典》等书收录，故本次新编沿用之。

一、《分类草药性》的特点

1. **分类特殊：**该书采用药名词头或词尾分类，即将药名的第一个字或末尾一字相同者，归为一类。如马蹄草，夏枯草等归为草类；大血藤，小血藤等归为藤类；三角风，八角风等归为风类；白茅根，白刺根等归为根类；槐树皮，东瓜皮等归为皮类。药名词头或词尾杂乱无章者则归为杂类。这种分类方法与明代《医方药性——草药便览》基本相似，它有便于按名查找的优点，并在一定程度上体现了按入药部位分类和按功效分类的分类原则，如草类、藤类、根类、皮类、叶类、花类、子类等即是按入药部位分类；风类（具祛风除湿或祛风解表功效者）香类（具辛香气味而有走窜发散药性，有发表散寒，活血散瘀功效者）、莲类（类似黄连、八角莲而有清热解毒功效者）、椒类（类似花椒而有理气功效者）等即是按功效分

类。本书分类也有一些缺点，如香草、香菇草，按字尾应列入草类，却按字头列入香类；龙骨莲按字头应列入龙类，却按字尾列入莲类；小青藤一名一支箭，实为瓶耳小草科的小草本，药用全草，原书既未列入草类，亦未列入箭类，却按字尾列入藤类，可是在箭类尚有一支箭，又名小青藤，则为重出条；开喉箭理应按字尾应列入箭类，却列入杂类。故本书分类亦有不完善，不合理之处。

2. 主记药性，兼论其他：本书名为《分类草药性》，在内容上也突出了药性的记述。但是，它又不是如其它药性专著那样详尽论述性味、归经、升降浮沉、有毒无毒、禁忌各项，而是根据民间草药使用特点和实际认识，除记述药性外，并从实用角度出发，较详细的记述功能主治和用法。此外，部分草药尚记载了下列综合性本草的内容：

(1) 产地与生境：如过江龙“生河边”；地蜈蚣：“遍地生”；刁连根“青巴石上生”；水黄连“出在涪州蔺市河生”；观音莲“出在南川金佛山”。

(2) 生长习性与采收：如斩头草“清明后发，十月即枯”；马兰花“三月间收用”。

(3) 品种与鉴别：如鸡冠花“红的治崩症，白的治白带”；龙头草“凡生必有双根，五叶、七叶者治吐血”；棋盘花“红、白、淡三种，白者治带症”；蹼地蜈蚣“味酸，梗六方，红色，叶青色”；海棠花“叶青色，梗有红筋，无子”；朱砂莲“味大苦，内黄赤色”等。

(4) 质量评价：如接骨丹“治一切跌打损伤，根皮更佳”；斩头草“扁者白根须可用，圆者无用”等。

(5) 炮制：如嚼连根“酒炒合叶用”；大刀豆根“煅存性用”；肥猪苗“九蒸九露能明目”；慈竹叶“其笋烧灰搽小儿肥疮”等。

3. 用法简便：本书充分体现了民间草药使用上注重简便适用的特点，多引用单验方，一般无复杂的加工、炮制或制剂，使用方便。其用法除一般常用的煎煮法以外，引用的方法主要还有：

(1) 洗：即煎水或水泡后用洗患处。如荔枝草“用叶洗痔疮”；苦参根“洗一切恶疮”等。

(2) 涂、搽或包敷：即将药口嚼或用其他方法粉碎成末，然后用水或油、蜜等液体辅料拌和均匀，再行搽、涂或以布包敷患处。如肥皂角“白矾同捣敷恶毒”；野油菜“治刀砍斧伤，烂疮生肌，嚼涂或沙糖兑服，其渣冲涂”；八角莲“一切疮毒用酒醋搽”；野地瓜叶“包疮毒”；老鼠刺“泡水搽火眼”等。

(3) 贴：即以新鲜的叶或根的切片贴置于患处或经络穴位上。如红合麻、文蛤根“贴痒子”等。

(4) 塞鼻、吹喉、滴耳：如酸浆草“截疟塞鼻”；明镜草“治蚊虫塞鼻孔”；水灯心“煅灰吹喉痹”；虎耳草“其汁治耳痛”等。

(5) 噎：即以原药或药液直接口含。如扁竹根“噙哦子”；八角莲“治口喉痹痛，磨酒口噙”等。

(6) 捣汁或泡水服：如蓝靛根“捣汁或服或涂，散毒去火”；铺地雷公“治血痢，叶生用兑水服”；山豆根“治咽喉肿毒泡水饮”。

4. 具有明显的四川民间草医用药的地方特色：本书所载 433 种草药，均系四川常用的民间草药，其药名、病名、治验都反映出四川的地方习俗。如紫金牛 (*Ardisia japonica*) 在全国不同的地区有不同的药名，本书将此称为矮茶风，并指出“一名地青杠，性温、平，无毒，治一切吐血咳嗽、气痛”，反映了四川的用药经验。再如虎杖 (*Polygonum cuspidatum*)，

其幼嫩茎叶味酸，四川民间经煮潦或直接切碎后，作为一种酸味菜肴食用，亦可用以作汤服，故别称此种植物为酸汤杆、酸溜溜（四川方言对浓酸味的形容）。《分类草药性》载虎杖为“酸溜溜一名土地榆，治风湿筋骨疼痛，发表、散寒、散血”，亦代表了四川的用药情况。此外，如哦子（扁桃腺肿大）、盐吼盐咳（喘咳）、蚁虫（鼻部螨虫侵害）、母猪风（癫痫）等病名，亦为四川民间的俗称。

《分类草药性》虽然有分类方法不尽完善，药性记述不够完整，部分品种有重复，字句讹误较多等缺点，但是，该书较为全面地总结了四川民间草医用药的丰富经验，新记载了一批过去本草书未曾记载的草药，为一批老药扩大了新的入药部位，对本草学乃至整个中医药学都作出了一定的贡献，值得进一步研究。

二、《分类草药性》整理研究的内容

1. 收集版本，校点原文：在全国各地收集到五种不同年代的版本和两种手抄本，经反复核对，发现光绪本出版时间虽较早，但部分条目有重复，文字错漏较多，相形之下，宣统本在质量上略胜一筹，故以宣统本为主，参照其他，进行了文字校对和标点，按名称、别名、形态特征、生长环境、采收加工、性味、功能、主治、用法的先后顺序对原文顺序作了调整。

2. 考订基原：根据原文的药名、别名、性味功能等的记述，结合四川目前实际用药的情况，对每一味药的来源植物进行考订，确定其植物拉丁名。

3. 调整名称，合并重复：部分药味的正名现已不用或少用，而原文的别名却为现时所多见，即调以别名为正名。个别药名易与他药相混淆，亦予适当调整。重复药味予以合并，有关性味功能等的记述，在备注项保留。

4. 插图：为便于草药的识别，随文插入原植物墨线图。但限于篇幅，仅选列了较难识别的部分草药的原植物墨线图。这些墨线图，几全部引用自《全国中草药汇编》（第二版），在此特表示谢意。

限于作者能力和水平，版本收集不全，个别草药未能订出拉丁学名，校点考订错误难免，敬希广大读者批评指正。

本书在整理过程中，得到张仕良、王家葵先生的支持，特致感谢。

凡例

一、本书以清代宣统三年诚德堂藏版为主，参考其他版本（清·光緒丙午年文華堂刻本、民国七年博文堂藏版、民国二十一年呂文明藏版、民国二十八年新刊本），校订整理，新编而成。

二、本书的分类及先后顺序均未作变动。草药味数，各版本及手抄本有所不同，部分药物又有重复，现经考订，重复者合并后，计有草类73味，藤类15味，风类22味，杂类71味，根类111味，头类6味，皮类14味，叶类16味，花类16味，子类25味，香类7味，莲类15味，椒类4味，麻类2味，龙类3味，箭类2味，石类4味，菜类2味，蒿类2味，角类4味，衣类2味，共416味，包括少数原书有的原植物相同而入药部位不同的药物。为便于查阅，每味药按先后顺序，给予编号。

三、本书体例：每一味药物分别为编号、药名、别名、正文、校注、基原、采收加工、性味、功能主治、用量用法、备考及附图。

四、本书药名原则上采用原书的正名，但部分正名现已极少使用，有的易与他药混淆，有的为方言近音字的讹误，则予更正，采用现今通用名为正名。

五、别名仅列全国通用名，四川常用名和原书别名。

六、正文是指原文经校正整理后的主文。原文主述性味、功能、主治和用法，少数药味述及别名、形态特征、生长环境、采收加工等；每一味药物对以上各项内容的记述或多或少，或缺；记述的先后顺序不一；文字上的错落，讹误较多，均无标点。以上问题，经校正整理后的正文，总体内容不变，文字按名称、别名、形态特征、生长环境、采收加工、性味、功能、主治、用法的先后顺序记述。

七、校注是对原文的名称、别名、功能、主治等重要内容进行校正的说明。

八、基原记述每一味药物的原植物所属科别、植物种的中文名、拉丁名和入药部位。如采用近年新订正的拉丁名，则后附常见异名。

九、部分药味文中述及不同入药部位的性味、功能、主治、用法等。按习惯不同入药部位而性味功能不同者，应作独立的一味药。故在正名后附不同入药部位的药名，并在备考项独立一条加以讨论。

十、备考是对相关的同名异物，重复品种，不同入药部位药物的备注。

十一、插图限于篇幅，仅选列较难识别的草药原植物墨线图。其编号与草药的序号相同。

十二、书末附有四川成都古卧龙桥街濂记书庄出版的《草药三字经》，并附药名索引和拉丁名索引。

十三、《草药三字经》原文经校点刊出，文中的病名作了黑体处理；文中的药名作了下划线处理，属《分类草药性新编》未收载的草药，尾注其基原，以便阅读和应用。

目 录

草 类

1. 马蹄草	(1)	34. 金沸草	(12)
2. 夏枯草	(1)	35. 三棱草	(12)
3. 车前草	(1)	36. 透骨草 (附: 急性子)	(13)
4. 酸浆草	(2)	37. 金钗草	(13)
5. 锋头草	(2)	38. 小味草	(13)
6. 荔枝草	(2)	39. 凤尾草	(14)
7. 伸筋草	(3)	40. 挖耳草	(14)
8. 辣子草	(3)	41. 响铃草	(15)
9. 连环草	(3)	42. 猪莶草	(15)
10. 藤萝草	(4)	43. 莲头草	(15)
11. 狗尾草	(4)	44. 猪拱草	(16)
12. 过江草	(4)	45. 旱莲草	(16)
13. 龙牙草	(5)	46. 湖广草	(16)
14. 堇头草	(5)	47. 细辛草	(17)
15. 益母草	(5)	48. 鱼香草	(17)
16. 合欢草	(6)	49. 四叶草	(17)
17. 芦茹草 (附: 合欢花)	(6)	50. 护心草	(18)
18. 老鹳草	(7)	51. 退血草	(18)
19. 苍耳草	(7)	52. 明镜草	(18)
20. 香茹草 (附: 苍耳根、苍耳子)	(7)	53. 对月草	(19)
21. 蛇牙草	(8)	54. 秤杆草	(19)
22. 地耳草	(8)	55. 筋骨草	(19)
23. 剪刀草	(8)	56. 龙胆草	(19)
24. 丁郎草	(9)	57. 星斗草	(20)
25. 蓼子草	(9)	58. 蜈蚣草	(20)
26. 笔筒草	(9)	59. 怀胎草	(20)
27. 香 草	(10)	60. 清明草	(21)
28. 还魂草	(10)	61. 瓜子草	(21)
29. 虎牙草	(11)	62. 鱼胆草	(21)
30. 虎耳草	(11)	63. 竹叶草	(21)
31. 西游草	(11)	64. 芫荽草	(22)
32. 远志草	(11)	65. 猪鞭草	(22)
33. 奶浆草	(12)	66. 吊岩草	(22)
		67. 谷精草	(22)
		68. 猪蓼子草	(23)
		69. 小肺金草	(23)

70. 地扭子草	(23)	103. 岩滴风	(34)		
71. 六月生草	(24)	104. 吊岩风	(34)		
72. 九子连环草	(24)	105. 鹤虱风	(35)		
73. 九头狮子草	(24)	106. 土防风	(35)		
藤类					
74. 大血藤	(25)	107. 羊蹄风	(35)		
75. 小血藤	(25)	108. 鹰爪风	(35)		
76. 左转藤	(25)	109. 矮茶风	(36)		
77. 紫金藤	(26)	110. 小箭杆风	(36)		
78. 鸡屎藤	(26)	杂类			
79. 红刺藤	(26)	111. 火炊灯	(37)		
80. 牛马藤	(27)	112. 骨碎补	(37)		
81. 右转藤	(27)	113. 地柏枝	(37)		
82. 莫娘藤	(27)	114. 马勃	(38)		
83. 面根藤	(28)	115. 蒲公英	(38)		
84. 大风藤	(28)	116. 老君须	(38)		
85. 小青藤	(28)	117. 爆格蚤 (附: 女贞子)	(39)		
86. 石南藤	(29)	118. 刘寄奴	(39)		
87. 母猪藤	(29)	119. 何首乌 (附: 首乌叶)	(39)		
88. 排风藤	(29)	120. 老蛇尾	(40)		
风类					
89. 过墙风	(30)	121. 隔山撬	(40)		
90. 九节风	(30)	122. 开喉箭	(40)		
91. 南蛇风	(31)	123. 九道箍	(41)		
92. 乌骚风	(31)	124. 水案板	(41)		
93. 三角风	(31)	125. 红浮萍	(42)		
94. 八角风	(31)	126. 黄精	(42)		
95. 火麻风	(32)	127. 朝天罐	(42)		
96. 破骨风	(32)	128. 千年矮	(43)		
97. 透骨风	(32)	129. 藕节巴	(43)		
98. 珍珠风	(33)	130. 八棱麻	(43)		
99. 三皮风	(33)	131. 臭牡丹	(43)		
100. 五皮风	(33)	132. 天门冬	(44)		
101. 兔耳风	(34)	133. 老鼠刺	(44)		
102. 牛耳风	(34)	134. 水灯心	(44)		
		135. 铁灯心	(45)		
		136. 土薄荷	(45)		
		137. 竹间黄	(45)		
		138. 矮沱树	(46)		

139. 千里光	(46)	178. 丝瓜壳	(58)
140. 骚羊舌	(46)	179. 瓦松	(59)
141. 金毛狗	(47)	180. 牛毛毡	(59)
142. 白头翁	(47)	181. 小打不死	(59)
143. 肉螃蟹	(47)		
144. 地乌龟	(48)		
145. 四块瓦	(48)		
146. 破石珠	(48)	182. 芦竹根(附: 芦竹笋)	(60)
147. 山慈姑	(49)	183. 蒲草根	(60)
148. 松节(附: 松子)	(49)	184. 萝卜根	(60)
149. 偷油婆	(49)	185. 南瓜根	(60)
150. 千脚虫	(50)	186. 白茄根	(61)
151. 佛顶珠	(50)	187. 奶参根	(61)
152. 牛膝	(50)	188. 荞麦根	(61)
153. 仙人掌	(51)	189. 石韦根	(62)
154. 通天窍	(51)	190. 篦叶根	(62)
155. 女儿红(附: 女儿红叶)	(51)	191. 山焦根	(62)
156. 露蜂房	(52)	192. 苦参根	(62)
157. 艳山红(附: 艳山红叶)	(52)	193. 芫花根	(63)
158. 接骨丹(附: 接骨丹叶)	(52)	194. 蒲蓄根(附: 蒲蓄草)	(63)
159. 猪总管	(53)	195. 白刺根(附: 白刺叶)	(63)
160. 钓鱼竿	(53)	196. 芫荽根 (附: 芫荽子、芫荽秧)	(64)
161. 牛筋条	(53)	197. 鹿葱根	(64)
162. 三颗针	(54)	198. 杉木根	(65)
163. 鸭脚板	(54)	199. 羊藿根	(65)
164. 水灵芝	(54)	200. 桂花根	(65)
165. 淫羊藿	(54)	201. 刁连根	(65)
166. 青酒缸	(55)	202. 香樟根	(66)
167. 铁马鞭	(55)	203. 石竹根	(66)
168. 水莴苣	(55)	204. 绛梨根(附: 绛梨叶)	(66)
169. 夜关门	(56)	205. 金樱根	(67)
170. 猫耳朵	(56)	206. 通花根	(67)
171. 刮经板	(56)	207. 侧耳根	(67)
172. 鼻血雷	(56)	208. 晕药根	(68)
173. 山枇杷	(57)	209. 梦花根	(68)
174. 见肿消	(57)	210. 吴萸根(附: 吴茱萸叶)	(68)
175. 顺气兰	(57)	211. 茵香根(附: 茵香虫)	(69)
176. 金银盆	(57)	212. 蓝靛根	(69)
177. 路边姜	(58)		

根类

213. 臭草根	(69)	250. 三白根	(80)
214. 蛇泡根(附:蛇泡叶)	(70)	251. 算盘根	(81)
215. 泽兰根	(70)	252. 乌泡根	(81)
216. 扁竹根	(71)	253. 淡竹叶根	(81)
217. 山豆根	(71)	254. 姜豆根	(82)
218. 使君根(附:川棟根)	(71)	255. 岩豆根	(82)
219. 大力根	(71)	256. 香圆根	(82)
220. 酸榴根	(72)	257. 红豆根	(82)
221. 木瓜根	(72)	258. 鱼香根	(83)
222. 丝瓜根(附:丝瓜叶、丝瓜花、丝瓜皮)	(72)	259. 楠木根	(83)
223. 五谷根	(73)	260. 茶香根	(83)
224. 黄葛根	(73)	261. 芭茅根	(83)
225. 兰花根 (附:兰花、兰叶)	(73)	262. 蕨萁根	(83)
226. 菊花根	(74)	263. 蕉香根	(84)
227. 赤葛根	(74)	264. 油柿根	(84)
228. 皂药根	(74)	265. 野葡萄根	(84)
229. 马桑根	(74)	266. 大乌泡根	(84)
230. 山楂根	(75)	267. 和尚头根	(85)
231. 白茅根	(75)	268. 梔子花根	(85)
232. 刺梨根	(75)	269. 麻柳树根 (附:麻柳树叶)	(85)
233. 韭菜根	(76)	270. 臭牡丹根	(86)
234. 地棕根	(76)	271. 臭黄荆根 (附:臭黄荆叶)	(86)
235. 构树根	(76)	272. 鸡血李根	(86)
236. 杨柳根	(76)	273. 老虎泡根	(86)
237. 桃树根(附:桃树叶)	(77)	274. 刺五甲根	(87)
238. 枣子根	(77)	275. 铁篱笆根	(87)
239. 羊奶根(附:羊奶花)	(77)	276. 水蜡烛根	(87)
240. 文蛤根	(77)	277. 八月瓜根	(88)
241. 黄椒根	(78)	278. 蓖秧泡根	(88)
242. 百部根	(78)	279. 牛筋条根 (附:牛筋条叶)	(88)
243. 黄泡根	(78)	280. 红苋菜根	(88)
244. 红子根(附:红子叶)	(79)	281. 野地瓜根 (附:野地瓜叶)	(89)
245. 卷子根	(79)	282. 牛王刺根	(89)
246. 牛奶根	(79)	283. 冬苋菜根 (附:冬苋菜叶)	(89)
247. 阳藿根	(80)		
248. 地瓜根(附:地瓜叶)	(80)		
249. 黄荊根	(80)		

284. 大刀豆根	(90)	叶类		
285. 金挖耳根	(90)	313. 霜桑叶	(100)	
286. 八月兰根	(90)	314. 水麻叶	(100)	
287. 老鼠刺根	(90)	315. 金竹叶	(100)	
288. 木姜子根	(91)	316. 卷子叶	(100)	
289. 野黄豆根 (附: 野黄豆叶)	(91)	317. 扁担叶	(101)	
290. 月季花根 (附: 月季花、月季花果)	(91)	318. 荷叶	(101)	
291. 瓜蒌根 (附: 瓜蒌皮、瓜蒌子)	(92)	319. 黄瓜叶	(101)	
292. 石地桔牛根	(92)	320. 芙蓉叶	(101)	
头类				
293. 鸡公头	(93)	321. 侧柏叶	(102)	
294. 刺春头	(93)	322. 马桑叶	(102)	
295. 芭蕉头(附: 芭蕉花)	(93)	323. 慈竹叶(附: 慈竹笋)	(102)	
296. 苦荞头	(93)	324. 苦竹叶	(103)	
297. 鸡骨头	(94)	325. 淡竹叶	(103)	
298. 老萝卜头	(94)	326. 枇杷叶	(103)	
皮类				
299. 槐白皮(附: 槐角)	(95)	327. 柿子叶(附: 柿蒂)	(103)	
300. 杉木皮	(95)	328. 水竹叶	(104)	
301. 柞树皮(附: 柞树叶)	(95)	花类		
302. 榆白皮	(96)	329. 茶花	(105)	
303. 梧桐皮	(96)	330. 石莲花(附: 石莲叶)	(105)	
304. 香椿皮	(96)	331. 野红花 (附: 大薊、小薊)	(105)	
305. 白杨皮	(97)	332. 芙蓉花(附: 芙蓉根)	(106)	
306. 紫荆皮	(97)	333. 马蔺花 (附: 马蔺叶、马蔺根)	(106)	
307. 白鲜皮	(97)	334. 南瓜花	(106)	
308. 臭椿皮	(98)	335. 石榴花	(107)	
309. 核桃皮	(98)	336. 芭蕉花	(107)	
310. 桑白皮	(98)	337. 白菊花	(107)	
311. 石榴皮	(98)	338. 野棉花 (附: 野棉花叶)	(107)	
312. 冬瓜皮	(99)	339. 鸡冠花	(108)	
		340. 海棠花	(108)	
		341. 金银花	(108)	
		342. 棋盘花 (附: 棋盘花根)	(108)	
		343. 粉团花(附: 粉团根)	(109)	

344. 玉簪花 (附: 玉簪根) (109)

莲类

子类

345. 气桐子 (110)
346. 气柑子 (110)
347. 莱菔子 (110)
348. 火麻子 (110)
349. 金铃子 (111)
350. 金弹子 (111)
351. 野茄子 (111)
352. 天泡子 (附: 天泡叶) (111)
353. 油菜子 (112)
354. 青菜子 (112)
355. 白菜子 (112)
356. 气桃子 (112)
356. 黄梔子 (113)
358. 黄荆子 (113)
359. 地纽子 (113)
360. 天茄子 (113)
361. 天葵子 (114)
362. 冬葵子 (附: 冬葵根) (114)
363. 石滚子 (115)
364. 吴萸子 (115)
365. 算盘子 (115)
366. 柏树子 (附: 柏树叶) (115)
367. 金樱子 (116)
368. 地笋子 (116)
369. 蛇床子 (116)

377. 冬苋莲 (120)
378. 朱砂莲 (120)
379. 观音莲 (120)
380. 见血莲 (121)
381. 水黄连 (121)
382. 老蛇莲 (121)
383. 独脚莲 (122)
384. 八角莲 (122)
385. 侧树莲 (122)
386. 龙骨莲 (122)
387. 白蛇莲 (123)
388. 山黄连 (123)
389. 鸡脚莲 (123)
390. 飞蛇莲 (123)
391. 土黄莲 (124)

椒类

392. 铁焊椒 (125)
393. 野花椒 (125)
394. 地胡椒 (125)
395. 山胡椒 (126)

麻类

396. 土升麻 (127)
397. 红活麻 (127)

香类

370. 大茅香 (117)
371. 小茅香 (117)
372. 洗手香 (117)
373. 蜘蛛香 (117)
374. 满山香 (118)
375. 水茴香 (118)
376. 青藤香 (118)

龙类

398. 过山龙 (128)
399. 过江龙 (128)
400. 八爪金龙
(附: 八爪龙叶) (128)

箭类

401. 柳皮箭 (130)
402. 一枝箭 (130)

410. 茵陈蒿 (134)

石类

403. 石泽兰 (131)
404. 石菖蒲 (131)
405. 石气柑 (131)
406. 石良姜 (131)

411. 水八角 (135)
412. 水皂角 (135)

角类

413. 肥皂角 (135)
414. 皂角刺 (135)

菜类

407. 野油菜 (133)
408. 岩白菜 (133)

415. 龙衣 (136)
416. 凤凰 (136)

蒿类

409. 齐头蒿 (134)

附录：

草药三字经 (137)
中文名笔画索引 (141)
拉丁名索引 (161)

〔卷首〕

草类

1. 马蹄草

〔别名〕 地逢草、积雪草、崩大碗。

〔正文〕 马蹄草一名地逢草。开^[1]心气，消肿，发表。治肺火咳嗽、肾虚耳鸣、五淋。敷疮毒。

〔校注〕 [1] 甲本误刻为“闭”。


〔基原〕 为伞形科植物积雪草 *Centella asiatica* (L.) Urban 的全草。

〔采集加工〕 夏、秋采收，洗净，鲜用或晒干。

〔性味〕 辛、苦，寒。

〔功能主治〕 祛风散寒，清热利湿。治肺热咳嗽，湿热黄疸，小便黄赤、疔疮肿毒。

〔用量用法〕 10~20g，煎服或捣汁服。外用捣敷。



2. 夏枯草

〔正文〕 夏枯草散诸毒，去风散肿^[1]。治痒子，兼除目疾。

〔校注〕 甲本以后各本作“去风火诸疮”。

〔基原〕 为唇形科植物夏枯草 *Prunella vulgaris* L. 带花或果穗的全草。

〔采集加工〕 夏季采收，晒干。

〔性味〕 苦、辛，寒。

〔功能主治〕 清肝散结，清热解毒。治黄疸肝炎，肺结核，头目昏眩，疮疡肿毒，乳痈。

〔用量用法〕 10~15g，煎服。外用煎水洗。



3. 车前草

〔别名〕 车前。

〔正文〕 车前草味甘，性寒，无毒。去热毒^[1]，利水清火，通利小便，能止血痢症，消肿，补肾明目。治痨子。

〔校注〕 [1] 各本作“毒热”。

〔基原〕 为车前科植物车前 *Plantago asiatica* L. 的全草。

〔采集加工〕 夏、秋采收，洗净，鲜用或晒干。

〔性味〕 甘，寒。

〔功能主治〕 清热利尿，止血痢，解热毒。治热淋尿赤、目赤红肿，黄疸，血痢，疮疡，痄腮。

〔用量用法〕 10~25g，煎服。外用鲜叶贴敷。



[备考] 平车前 *Plantago depressa* Willd. 的全草有时混入车前草使用。四川草医认为平车前（又名虾蟆草、虾蟆叶）有致腹痛的副作用，不宜作车前草使用。

4. 酸浆草

[别名] 酸酸草、酢浆草。

[正文] 酸浆草一名酸酸草。去瘀血，生新血，消肿。治跌打。截虐塞鼻。酒炒敷鱼口，治红白痢症^[1]。

[校注] [1] 甲本无“一名酸酸草，截虐塞鼻，酒炒敷鱼口，治红白痢症”字句。


[基原] 为酢浆草科植物酢浆草 *Oxalis corniculata* L. 的全草。

[采集加工] 夏季采收，洗净，鲜用或晒干。

[性味] 酸，寒。

[功能主治] 清热利湿，去瘀生新，消肿，截虐。治湿热黄疸，湿热带下，湿热痢疾，跌打肿痛，虐疾。

[用量用法] 5~10g，煎服。外用捣敷或煎水洗。鲜叶塞鼻治虐疾。



戟叶堇菜

[别名] 地黄瓜。

[正文] 锯头草^[1]一名地黄瓜。味辛，性烈，有毒。去风火，散瘀血，消毒肿疗疮。

[校注] [1] 各本作“华头草”，实指其原植物的叶形似铧头，应作铧头草。

[基原] 为堇菜科植物戟叶堇菜 *Viola betonicifolia* Sm.、紫花地丁 *Viola philippica* Cav. 或长萼堇菜 *Viola incospicua* Blume 的全草。

[采集加工] 春、夏采收，洗净，鲜用或晒干。

[性味] 辛、苦，寒。

[功能主治] 清热解毒，散瘀消肿。治肠痈，黄疸，热淋，疔疮肿毒。

[用量用法] 10~15g，煎服。外用鲜品捣敷。

6. 荔枝草

[别名] 癞蛤蟆、癞子草。

[正文] 荔枝草一名癞蛤蟆。味辛香，性温。治一切久年癩疮。用叶洗痔疮，痒疮。研末调香油搽鼻虫。

[基原] 为唇形科植物芥苧 *Salvia plebia* R. Br. 的全草。

[采集加工] 春、夏采收，鲜用或晒干。

[性味] 辛，凉。

[功能主治] 凉血，解毒，杀虫。治一切痈疮，痔疮，痈肿，咳血，尿血。

[用量用法] 10~20g，煎服。外用鲜品捣敷或煎水洗。

[备考] 各本另记有“癞子草”称：“癞子草洗一切风疮，治牛鼻生铁线虫。”癞子草与荔枝草系同物异名。



7. 伸筋草

[别名] 石松。

[正文] 伸筋草治筋骨疼痛，风湿麻木，脚转筋^[1]，痧气^[2]。

[校注] [1] 各本作“转筋”。 [2] 甲本作“理气”。

[基原] 为石松科植物石松 *Lycopodium japonicum* Thunb. 的全草。

[采集加工] 夏、秋季采收，晒干。

[性味] 苦、辛，温。

[功能主治] 祛风散寒，除湿消肿，舒筋活络。治风湿麻木，筋骨疼痛，脚转筋，水肿，跌打损伤。

[用量用法] 10~15g，煎服或泡酒服。外用鲜品捣敷。

8. 辣子草

[别名] 鸭脚板、野芹菜。

[正文] 辣子草一名鸭脚板，一名野芹菜。味苦，性热，有毒。治一切恶疮，包鱼口的良药，外治蛇咬，熬酒渣^[1]敷疮毒。

[校注] [1] 甲本以后各本误作“渲”。

[基原] 为毛茛科植物扬子毛茛 *Ranunculus sieboldii* Miq. 毛茛 *Ranunculus japonicus* Thunb. 或回回蒜 *Ranunculus chinensis* Bunge 的全草。

[采集加工] 春、夏采收，鲜用或晒干。

[性味] 辛、苦，热。有毒。

[功能主治] 解毒，截疟。治一切恶疮肿毒，疟疾，蛇咬伤。

[用量用法] 外用，适量捣敷。



9. 连环草

[别名] 九子连环草、肉连环。

[正文] 连环草散疮毒，解烦热。治痞子。

[基原] 为兰科植物虾脊兰 *Calanthe discolor* Lindl. 或三褶虾脊兰 *Calanthe tricarenata* Lindl. 的全草或根茎。

[采集加工] 夏季花后采收，鲜用或晒干。

[性味] 甘、辛，温。

[功能主治] 散结，解毒。治九子痨（颈淋巴结核），扁桃体炎，痔疮。