

全科医学(中级) 资格考试全真模拟

Quanke yixue zige kaoshi
quanzhen moni

主编单位：湖南新湘科技咨询服务中心

主 编：谈新宏

 湖南科学技术出版社

全科医学 (中级) 资格考试全真模拟

Quanke yixue (zhongji) zige kaoshi
quanzhen moni

主编单位：湖南新湘科技咨询服务中心

主 编：谈新宏

副 主 编：孔 魏

编 者：邓声莉	尹逊强	邓 静	孔 魏	史训凡
史静琤	左晓霞	田 焱	刘双珍	任国峰
邱元正	陈立平	李奉华	肖 莹	闵晓珊
李 吉	李湘民	岳少杰	周巧玲	罗 卉
张成裕	欧利红	张 怡	杨晓苏	张晓梅
易 斌	郑智远	张赞玲	钟美佐	贺艳娟
莫 龙	郭桂平	谈新宏	黄宇琨	梁昌华
谢红付	雷闽湘	潘频华		

 湖南科学技术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

全科医学 (中级) 资格考试全真模拟 / 谈新宏主编.
长沙: 湖南科学技术出版社, 2008. 1
ISBN 978-7-5357-4890-4

I. 全… II. 谈… III. 全科医学—医师—资格考核—习题 IV. R4-44

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第049075号

全科医学(中级)资格考试全真模拟

主编单位: 湖南新湘科技咨询服务中心

主 编: 谈新宏

策划编辑: 邹海心

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路276号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系: 本社直销科 0731-4375808

印 刷: 长沙鸿发印务实业有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址: 长沙县黄花镇印刷科技园3号

邮 编: 410137

出版日期: 2008年1月第1版第1次

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 18.25

字 数: 378000

书 号: ISBN 978-7-5357-4890-4

定 价: 35.00元

(版权所有·翻印必究)

前 言

根据《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》所做出的“加快发展全科医学,培养全科医师”的重要决策,近几年来,随着全科医学专业技术资格考试与全科医学教育逐步开展,建设以全科医师为骨干的高素质的社区卫生服务队伍,保证社区卫生服务深入、健康、持续发展已成为当今卫生工作改革的主题之一。

为配合全国卫生专业技术全科医学(中级)资格考试,帮助考生在有限的时间内掌握考试要点,提高复习效率;为配合全科医师岗位培训和全科医师规范化培训,帮助学员在培训过程中更好地抓住学习重点,特组织相关学科专家,根据《全科医学(中级)资格考试大纲》,编写本册全科医学(中级)资格考试模拟试题及参考答案。

本书在考点覆盖、体例设置、难易区分、信度比较、训练考查等方面完全与卫生部医学考试中心最新颁布的考试大纲、考试内容、考试形式相一致,达到模拟试题及参考答案的效果,同时也是全科医学教育、全科医学岗位培训配套使用的习题集,是本难得的考试必备用书。

广大考生与学员使用此书,可以达到三个目的:第一,准确把握考点覆盖与分布,开拓解题思路,提高解题技巧,查漏补缺。第二,真实检验学习水平,自我模拟,自我评分,把握考核目标。第三,宏观把握考点结构,熟练掌握题型,提高解题能力,有的放矢,举一反三。

由于时间仓促,又限于我们的水平,难免会存在疏漏和不妥之处,欢迎广大读者不吝指正。

编 者

2007 年 8 月

目 录

第一部分 基础知识考试全真模拟

模拟试题一及参考答案	(1)
模拟试题二及参考答案	(11)
模拟试题三及参考答案	(21)
模拟试题四及参考答案	(31)
模拟试题五及参考答案	(41)
模拟试题六及参考答案	(51)

第二部分 相关专业知识考试全真模拟

模拟试题一及参考答案	(61)
模拟试题二及参考答案	(71)
模拟试题三及参考答案	(81)
模拟试题四及参考答案	(91)
模拟试题五及参考答案	(101)
模拟试题六及参考答案	(111)
模拟试题七及参考答案	(121)

第三部分 专业知识考试全真模拟

模拟试题一及参考答案	(131)
模拟试题二及参考答案	(141)
模拟试题三及参考答案	(151)
模拟试题四及参考答案	(161)
模拟试题五及参考答案	(171)
模拟试题六及参考答案	(181)
模拟试题七及参考答案	(191)
模拟试题八及参考答案	(201)

第四部分 专业实践能力考试全真模拟

模拟试题一及参考答案 (211)

模拟试题二及参考答案 (222)

模拟试题三及参考答案 (233)

模拟试题四及参考答案 (243)

模拟试题五及参考答案 (254)

模拟试题六及参考答案 (264)

模拟试题七及参考答案 (275)

第一部分 基础知识考试全真模拟

模拟试题一及参考答案

A 型题

答题说明

(以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个或 A、B、C、D 四个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。共 74 题,每题 1 分,共 74 分)

1. 全科医学最大的特点是()
A. 强调早期发现并处理疾患 B. 强调对当事人的“长期负责式照顾” C. 强调在社区场所对患者提供服务 D. 强调预防疾病和维护健康
2. 下列不属于心、脑血管疾病的二级预防内容的是()
A. 筛检疾病 B. 警惕先兆症状 C. 心电图运动试验 D. 合理膳食 E. 防止伤残
3. 农村合作医疗的基本内容为()
A. 公共卫生、基本医疗 B. 公共卫生 C. 健康教育 D. 疾病预防 E. 健康促进
4. 有关病例对照研究的说法,正确的是()
A. 病例是某医院住院的全部病例 B. 设立的对照组是未患病的健康人群 C. 设立的对照组是与病例组具有可比性的未患该病的人群的随机样本 D. 所收集的资料是调查时的情况 E. 可以确证疾病的病因
5. 进行流行病学问卷设计时,应注意()
A. 文字应尽量精练,尽量采用专业术语 B. 包括所有感兴趣的问题 C. 不能包括姓名、年龄等隐私问题 D. 考虑调查对象的具体情况,调查表应尽量通俗易懂 E. 只能使用封闭式问题
6. 影响健康教育评价效果的因素很多,其中随年龄的增长,心理特征发生变化应属()
A. 历史性因素 B. 测试因素 C. 统计回归因素 D. 时间因素 E. 偏倚
7. 儿童时期健康教育的内容不包括()
A. 常见疾病的防治 B. 心理问题的防治 C. 行为问题的教育 D. 促进认知的提高 E. 预防意外事故

8. 衡量小儿生长发育和营养状况最常用的指标是()
A. 身长 B. 体重 C. 头围 D. 胸围 E. 皮下脂肪厚度
9. 母亲患有下列哪种疾病时可以不终止母乳喂养()
A. 活动性肺结核 B. 精神病 C. 乳腺炎 D. 艾滋病 E. 急性呼吸道感染
10. 儿童发生维生素 D 缺乏性佝偻病时,最早出现骨骼改变的部位是()
A. 头部 B. 胸部 C. 腹部 D. 上肢 E. 下肢
11. 铁剂与下列哪种物质同时服用时有助于铁的吸收()
A. 维生素 A B. 维生素 B C. 维生素 C D. 维生素 D E. 叶酸
12. 妇女一生按性功能的发育变化,可分为()
A. 幼年期、青春期、生育期、围绝经期和老年期五期 B. 婴儿期、幼年期、青年期、围绝经期和老年期五期 C. 幼年期、青春期、围绝经期和老年期四期 D. 婴儿期、幼年期、青年期和老年期四期 E. 婴儿期、幼年期、青年期和围绝经期四期
13. 孕中期是指()
A. 孕 13 周到孕 27 周末 B. 孕 30 周以内 C. 孕 13 周到孕 30 周内 D. 孕 20 周到孕 30 周 E. 孕 20 周到孕 36 周
14. 有关围绝经期的概念,错误的是()
A. 是妇女生育旺盛功能状态逐渐衰退的一个时期 B. 是卵巢功能开始衰退到完全停止的阶段 C. 绝经是此阶段最突出的表现 D. 一般历时 10 ~ 20 年 E. 其年龄一般从 50 岁开始
15. 老年人使用抗生素应掌握的原则包括()
A. 从小剂量开始,长期维持药物 B. 经常更换抗生素,以达到最佳疗效 C. 抗生素可作为预防感染用药 D. 联合用药时注意配伍禁忌 E. 患者体温降至正常后 1 天即应停药
16. 药物在血浆中与血浆蛋白结合后,下列哪条是正确的()
A. 药物作用增强 B. 药物代谢加快 C. 暂时失去药理活性 D. 药物排泄加快 E. 药物作用减弱
17. 从乳汁中排泄不足以对乳儿产生不良反应的药物有()
A. 红霉素 B. 林可霉素 C. 四环素 D. 青霉素 E. 卡那霉素
18. 对肾功能正常者,头孢曲松的血清消除半衰期是()
A. 0.45 ~ 1 小时 B. 约 2 小时 C. 4 ~ 5 小时 D. 6 ~ 9 小时 E. 超过 10 小时
19. 胃溃疡患者宜选用何种解热镇痛药()
A. 对乙酰氨基酚 B. 布洛芬 C. 阿司匹林 D. 吲哚美辛 E. 保泰松
20. 全科医师是()
A. 全面掌握各科业务技术的临床医师 B. 提供全部“六位一体”社区卫生服务的基层

医师 C. 能熟练处理常见健康问题、为社区群众提供上门医疗服务的基层医师

D. 经全科医学专业培训合格,在社区提供长期负责式医疗保健的医师 E. 以预防为主
的医师

21. 统计分析的四个基本步骤中不包括()

A. 设计 B. 数据收集 C. 数据整理 D. 数据分析 E. 数据记录

22. 表示某地死亡率随时间变化的情况可选用()

A. 线图 B. 半对数线图 C. 圆图 D. 百分条图 E. 散点图

23. 在社区实施健康教育计划,进行社区需求评估的目的是()

A. 明确实施过程中的管理问题 B. 明确社区主要的健康问题 C. 确定干预的目标
D. 了解高危人群健康状况 E. 了解妇幼卫生状况

24. 以下关于健康教育的特点的说法,错误的是()

A. 健康教育是有计划、有组织和系统的传播与教育活动,通过社区诊断,提出周密的计
划,制定预期目标、确定相应的策略与方法 B. 健康教育以行为改变为目标,健康教育
的一切内容都是围绕人的行为问题,健康教育的核心是帮助人们树立健康意识,建立健康
行为 C. 健康教育的基本策略是信息传播、行为干预 D. 注重效果评价,全面的、
完整的健康教育项目应该从科学的设计开始 E. 健康教育的场所遍及社区、医院、学
校、工厂、公共场所等,不同场所的目标人群健康教育内容和方式相同

25. 高龄老人睡眠障碍的突出表现是()

A. 间断入睡 B. 失眠 C. 多噩梦 D. 不易醒 E. 睡眠过深

26. 患者,男,70岁。脑卒中3天,无尿2天,下腹部可触及胀大的膀胱,用手挤压有少许尿液
滴出。最可能的诊断是()

A. 梗阻性尿潴留 B. 药物性尿潴留 C. 精神性尿潴留 D. 压力性尿潴留
E. 神经源性尿潴留

27. 关于流行病学,下列说法正确的是()

A. 流行病学从基因水平认识疾病 B. 流行病学从细胞水平认识疾病 C. 流行病学
从群体水平认识疾病 D. 流行病学从个体水平认识疾病 E. 流行病学从分子水平
认识疾病

28. 农村合作医疗将重点放在()

A. 保小不保大 B. 迫切需要解决的是农民因患大病而导致贫困的问题 C. 低水平
服务 D. 技术水平差 E. 服务方式不合理

29. 农村合作医疗要求自来水普及率达到()

A. 75% B. 60% C. 50% D. 80% E. 90%

30. 主要问题目录所记录的问题一般指()

A. 患者所患的疾病名称 B. 患者的危险因素和不良行为 C. 过去、现在或将来影

- 响个人健康的异常情况 D. 患者会诊及转诊的记录 E. 以上都不对
31. 美国有资料报道,70 岁以下离婚男女死于心脏病、肺癌的相对危险度为 2,肝硬化为 7,高血压为 3。这说明()
- A. 家庭功能失调对健康有影响 B. 家庭环境对健康有影响 C. 有些疾病发病机制与家庭有关系 D. 家庭结构异常对健康有影响 E. 以上都不对
32. 在胎儿的整个发育过程中,胚胎细胞对致畸因子最为敏感、胎儿最容易出现缺陷和畸形的时期是()
- A. 胚胎 1~2 周 B. 胚胎 3~8 周 C. 胎儿 9~12 周 D. 胎儿中期 E. 胎儿后期
33. 在儿童基础免疫中,只需接种一次的疫苗有()
- A. 乙型肝炎疫苗 B. 麻疹疫苗 C. 脊髓灰质炎减毒活疫苗 D. 吸附百白破联合疫苗 E. 流行性乙型脑炎疫苗
34. 新生儿疾病筛查时所采的血液是()
- A. 新生儿静脉血 B. 新生儿动脉血 C. 新生儿手指尖血 D. 新生儿头皮血 E. 新生儿足跟血
35. 女孩在几岁以前开始第二性征发育考虑性早熟()
- A. 8 岁以前 B. 6 岁以前 C. 13 岁以前 D. 青春期以前 E. 16 岁以前
36. 孕期保健不包括以下哪项()
- A. 孕早、中、晚期的保健 B. 性知识教育 C. 母乳喂养的宣传教育 D. 孕期心理保健 E. 了解影响孕期保健的社会因素及其预防方法和途径
37. 以下哪项不增加孕产妇的死亡危险性()
- A. 营养不良 B. 胎儿宫内发育迟缓 C. 多产 D. 难产 E. 产后出血
38. 我国长寿老人的年龄范围是()
- A. 60 岁以上 B. 70 岁以上 C. 80 岁以上 D. 90 岁以上 E. 100 岁以上
39. 肾衰竭伴有感染的患者禁用()
- A. 氯霉素 B. 多西环素 C. 红霉素 D. 氨基苷类 E. 青霉素
40. 与青霉素过敏性休克有关的主要抗体是()
- A. IgA B. IgG C. IgE D. IgM E. 以上都不是
41. 吲哚美辛的主要镇痛部位在()
- A. 大脑皮质 B. 脑干网状结构 C. 下丘脑 D. 痛觉传入神经 E. 外周末梢痛觉感受器
42. 应用生后 1 分钟阿氏评分法判定新生儿出生窒息的标准是()
- A. 0~1 分 B. 3 分及以下 C. 5 分及以下 D. 7 分及以下 E. 9 分及以下
43. 下列关于大众传播媒介的特点的说法,错误的是()

- A. 大众传播是直接性传播,传播者与受传者之间的关系是直接性的 B. 覆盖面广,传播速度快,资源利用率高 C. 大众传播媒介面向社会,具有公开性,负有舆论导向作用,大众传播媒介传出的信息正确或错误,可能使为数众多的群众受益或上当 D. 大众传播媒介具有时效性,传播的信息一要新,二要快 E. 大众传播基本是单向传播,针对性差,反馈差
44. 流行病学实验研究最常用的分析指标不包括()
- A. 有效率和生存率 B. 保护率和效果指数 C. 治愈率和好转率 D. 发病率和死亡率 E. 有效率和保护率
45. 下列不属于公共卫生服务的是()
- A. 卫生防疫 B. 环境治理 C. 食品卫生 D. 美容服务 E. 计划免疫
46. 家系图的目的是()
- A. 对家庭背景和潜在的健康问题做出总结 B. 对家庭功能进行描述 C. 描述家庭生活周期 D. 描述家庭资源 E. 以上都不对
47. 在下列心理发育指标中,新生儿初生时尚不具备的是()
- A. 听觉 B. 味觉 C. 触觉 D. 痛觉 E. 条件反射
48. 新生儿保健最为关键的时期是()
- A. 出生后 24 小时 B. 出生后 36 小时 C. 出生后 1 周 D. 出生后 2 周 E. 出生后 28 天
49. 围绝经期激素替代治疗可增加()
- A. 卵巢肿瘤发生的可能 B. 子宫内膜癌和乳腺癌发生的可能 C. 输卵管癌发生的可能 D. 宫颈癌发生的可能 E. 外阴癌发生的可能
50. 新生儿肺部革兰阴性杆菌感染,可选用下列哪种药物()
- A. SMZ + TMP B. 四环素 C. 氨苄西林 D. 氯霉素 E. 链霉素
51. 全科医疗与专科医疗主要的不同点之一是()
- A. 所遇疾病通常是初期的、未分化的 B. 没有心理、社会层面的问题 C. 所遇疾病相当大部分处于进展期 D. 健康咨询极少 E. 医疗设备的差别
52. 有关现况研究的说法,正确的是()
- A. 可计算出发病率 B. 需要设立对照组进行比较 C. 可以发现因果联系 D. 抽样调查是实施现况研究的唯一方法 E. 现况调查的资料中因与果是并存的
53. 流行病学现场试验中实验组和对照组人群最大的不同点是()
- A. 观察指标不同 B. 目标人群不同 C. 入选标准不同 D. 干预措施不同 E. 随访方式不同
54. 关于婚前卫生咨询的叙述,以下哪项是错误的()
- A. 婚前卫生咨询是面对面,个人的咨询 B. 应包括婚育问题的咨询 C. 应包括个

人、家庭个别医学问题的咨询 D. 应对服务对象做好保密工作 E. 与咨询的方法与技巧关系不大

55. 关于妊娠合并心脏病的处理,下列说法哪项不正确()
A. 充分休息 B. 消除引起心力衰竭的各种危险因素 C. 纠正贫血 D. 立即终止妊娠 E. 预防上呼吸道感染
56. 老年人药物分布的特点是()
A. 肝血流减少,药物代谢缓慢 B. 脂溶性药物分布容积减少 C. 水溶性药物分布容积增大 D. 与血浆蛋白结合率高的药物浓度升高 E. 消化道运动降低,药物吸收减少
57. 老年抑郁症适用的抗抑郁药物是()
A. 阿米替林 B. 赛庚啶 C. 异丙嗪 D. 维生素 D E. 氯苯那敏
58. 肝功能不全患者可按正常剂量使用的抗菌药物有()
A. 土霉素 B. 红霉素酯化物 C. 氯霉素 D. 头孢唑啉 E. 两性霉素 B
59. 下列哪种药物小儿应用可引起听觉损害而致聋()
A. 氯霉素 B. 庆大霉素 C. 磺胺嘧啶 D. 青霉素 E. 头孢唑啉
60. 下列哪种情况下,不能放置宫内节育器()
A. 月经干净后3~7天 B. 自然分娩3个月后 C. 手术产6个月后 D. 自然流产同时 E. 中期引产月经恢复后
61. 下列哪项不是社区控烟教育的目的和内容()
A. 孤立吸烟者 B. 教育青少年拒绝第一支烟 C. 引导吸烟者自愿戒烟 D. 对自愿戒烟者进行戒烟方法的指导 E. 创建无烟家庭
62. 下列哪项不是危害健康的行为()
A. 不良生活方式 B. A型行为模式 C. C型行为模式 D. 恐惧行为 E. 预警行为
63. 关于初级卫生保健的描述,下列说法正确的是()
A. 初级卫生保健是低水平的卫生服务 B. 初级卫生保健主要是面向农村的服务 C. 初级卫生保健是一种采用低技术的卫生服务 D. 初级卫生保健是发展中国家的专利 E. 初级卫生保健是一种基本的卫生保健,体现了社会平等权利
64. 农村合作医疗的经费管理实行()
A. 专项管理 B. 自主管理 C. 联合管理 D. 基层管理 E. 农民管理
65. 儿童记忆开始的标志是()
A. 非条件反射的出现 B. 条件反射的出现 C. 无意注意的出现 D. 有意注意的出现 E. 思维活动的出现
66. 母乳喂养的婴儿在添加辅食时最迟不能超过()

A. 2 个月 B. 4 个月 C. 6 个月 D. 8 个月 E. 10 个月

67. 下列因素中,胎盘早剥的危险因素是()

A. 妊娠高血压 B. 母子血型不合 C. 妊娠期感染 D. 孕 20 周之前 E. 妊娠合并慢性疾病

68. 下列哪项小,表示用该样本均数估计总体均数的可靠性大()

A. CV B. S C. $\bar{\sigma x}$ D. R E. 四分位数间距

69. 某病病死率和某病死亡率均为反映疾病严重程度的指标,两者的关系为()

A. 病死率高,死亡率一定高 B. 病死率高,死亡率不一定高 C. 病死率高,死亡率一定低 D. 青年人口中,病死率高,死亡率也高 E. 女性人口中,病死率高,死亡率也高

70. 检查认知功能较多采用的量表是()

A. 抑郁量表 B. 情绪量表 C. 幸福度量表 D. 生活满意度量表 E. 简短精神状态量表

71. 下列不属于抑制细菌细胞壁合成的药物是()

A. 氨苄西林 B. 万古霉素 C. 磷霉素 D. 林可霉素 E. 头孢唑啉

72. 传播的分类不包括()

A. 社会传播 B. 人际传播 C. 大众传播 D. 组织传播 E. 自我传播

73. 社区的基本要素不包括()

A. 人群 B. 收入 C. 特有的文化背景 D. 特有的生活方式和认同意识 E. 一定的生活制度、生活服务设施和管理机构

74. 下列哪种疫苗接种后的局部反应不能用热敷处理()

A. 麻疹疫苗 B. 卡介苗 C. 百白破三联针 D. 白破二联针 E. 乙型肝炎疫苗

B 型题

答题说明

(以下提供若干个案例,每个案例下设若干个考题。请根据答案所提供的信息,在每道题下面的 A、B、C、D、E 五个或 A、B、C、D 四个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。共 5 题,每题 1 分,共 5 分)

75 ~ 77 题

某县有人口 10 万人,1997 年因各种疾病死亡 1000 人。该年共发生结核 300 人,原有结核 400 人,1997 年共有 60 人死于结核。请问:

75. 该县的总死亡率为()

A. 300/10 万 B. 60/1000 C. 60/10 万 D. 1000/10 万 E. 资料不足,不能

计算

76. 结核的病死率为()

A. 60/300 B. 60/400 C. 60/700 D. 60/1 000 E. 60/10 万

77. 结核的发病率为()

A. 300/10 万 B. 400/10 万 C. 700/10 万 D. 300/1000 E. 400/1000

78 ~ 79 题

孕 34 周合并妊娠高血压综合征孕妇,在某次逛超市后出现急剧腹痛,恶心,冷汗。B 超显示胎盘和子宫壁间出现均匀暗区,界限不清。

78. 该孕妇可能的诊断是()

A. 临产 B. 妊娠高血压子痫 C. 慢性高血压并发子痫 D. 胎盘早剥 E. 前置胎盘

79. 此时不正确的处理是()

A. 应用宫缩抑制剂 B. 监护胎儿宫内情况 C. 立即终止妊娠 D. 纠正休克
E. 预防和处理产后出血

C 型题

答题说明

(以下提供若干组考题,每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个或 A、B、C、D 四个备选答案。请从中选择一个与问题关系密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。共 11 题,每题 1 分,共 11 分)

80 ~ 82 题

某社区卫生服务中心要进行规范化管理,要求制定基本原则。

A. 社区 B. 家庭 C. 需求 D. 健康 E. 患者

80. 社区卫生服务以上列哪项为中心()

81. 社区卫生服务以上列哪项为单位()

82. 社区卫生服务以上列哪项为导向()

83 ~ 86 题

A. 乙型肝炎疫苗 B. 卡介苗 C. 脊髓灰质炎减毒活疫苗 D. 吸附百白破联合疫苗
E. 麻疹疫苗

83. 按照免疫程序,最晚接种的是()

84. 属于联合免疫的是()

85. 需要口服接种的是()

86. 需要皮内接种的是()

87 ~ 90 题

根据有效和经济的原则来选择下列头孢菌素:

A. 头孢曲松 B. 头孢哌酮 C. 头孢唑啉 D. 头孢氨苄 E. 头孢他啶

87. 抗铜绿假单胞菌作用最强的是()
88. 可用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌感染,口服给药的是()
89. 适用于革兰阳性感染,只供注射用的是()
90. 可一天给药一次的是()

D 型题

答题说明

(以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个或 A、B、C、D 四个备选答案,请从中选择备选答案中所有正确答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。共 10 题,每题 1 分,共 10 分)

91. 下列哪些药物不是第一线抗结核药()
A. 卡那霉素 B. 利福平 C. 吡嗪酰胺 D. 异烟肼
92. 老年人体内结构的变化包括()
A. 体内水分减少 B. 体内钾含量上升 C. 骨骼肌萎缩 D. 性腺萎缩 E. 体内钠含量明显降低
93. 影响传播效果的因素包括()
A. 环境因素 B. 传播者因素 C. 信息因素 D. 媒介与渠道因素 E. 受传者因素
94. 关于两样本均数比较的 t 检查,正确的说法是()
A. 求两样本来自同一总体 B. 要求两总体均服从正态分布 C. 两样本含量可以不同
D. 要求两总体方差相等 E. 查 t 界表时的自由度为两样本大小之和,即 $n_1 + n_2$
95. 全科医师在实施以问题为目标的健康照顾过程中,应掌握的原则是()
A. 不需要做出诊断 B. 尽可能准确掌握问题之所在 C. 经过处理应确认问题已真正解决
D. 以患者或接受健康照顾的人为中心 E. 利用高科技的生物学检查在最短时间做出诊断
96. 居民健康档案的基本内容包括以下内容()
A. 个体基本资料 B. 健康问题目录 C. 病情流程 D. 问题描述 E. 体检资料
97. 让新生儿吃到初乳具有非常重要的意义,主要体现在()
A. 初乳含有大量抗体,能预防新生儿的感染和变态反应 B. 初乳中白细胞含量低于成熟乳
C. 初乳有轻微的通便作用,能帮助清除肠道内的胆红素,预防或减轻新生儿

黄疸 D. 初乳含有生长因子,对婴儿小肠的发育有促进作用 E. 初乳中维生素 A 的含量较高,有助于减轻婴儿感染的严重程度

98. 健康教育计划过程评价的常用指标包括()

A. 健康教育材料拥有率 B. 健康教育讲座出勤率 C. 电视健康教育节目收视率
D. 健康教育知识及格率 E. 干预活动覆盖率

99. 妊娠合并糖尿病,影响胎儿健康,出现的后果有()

A. 巨大儿 B. 先天性畸形 C. 死胎 D. 新生儿高胆红素 E. 新生儿低血糖

100. 发生骨质疏松症的因素有()

A. 长期卧床 B. 大量吸烟 C. 户外活动少 D. 长期低钙饮食 E. 维生素 A 缺乏

参考答案

A 型题

1. B 2. D 3. A 4. C 5. D 6. D 7. E 8. B 9. E 10. A
11. C 12. A 13. A 14. E 15. D 16. C 17. D 18. D 19. A
20. B 21. E 22. A 23. B 24. E 25. A 26. E 27. C 28. B
29. A 30. C 31. D 32. B 33. B 34. E 35. A 36. B 37. B
38. D 39. D 40. C 41. E 42. D 43. A 44. D 45. D 46. A
47. E 48. A 49. B 50. C 51. A 52. E 53. D 54. E 55. D
56. D 57. A 58. D 59. B 60. D 61. A 62. E 63. E 64. A
65. B 66. C 67. A 68. C 69. B 70. E 71. D 72. A 73. B
74. B

B 型题

75. D 76. C 77. A 78. D 79. A

C 型题

80. E 81. B 82. C 83. E 84. D 85. C 86. B 87. E 88. D
89. C 90. A

D 型题

91. AC 92. ACD 93. ABCDE 94. BCD 95. BCD 96. ABCDE
97. ACDE 98. ABCE 99. ABCDE 100. ABCD

模拟试题二及参考答案

A 型题

答题说明

(以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个或 A、B、C、D 四个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。共 74 题,每题 1 分,共 73 分)

1. 以社区为基础健康照顾的基本要素是()
A. 社区诊断 B. 确立基层医疗单位 C. 确定目标 D. 制订计划 E. 社区规划
2. 以下何种措施不利于改善遵医行为()
A. 改善医患关系,加强医患沟通 B. 简化药物处方 C. 缩短医师接诊时间 D. 开展患者小组活动 E. 开展健康教育活动
3. 初级卫生保健从技术方法上看是()
A. 低级的 B. 高级的 C. 基层需求切实可行的、学术上可靠的 D. 综合性的 E. 高度专科化的
4. 农村合作医疗要求孕产妇系统管理率达到()
A. 95% B. 90% C. 85% D. 80% E. 75%
5. 某地某年肝炎发病人数占同年传染病人数的 10.1%,这是一种什么指标()
A. 率 B. 构成比 C. 发病率 D. 集中趋势 E. 时点患病率
6. 在机体的各个系统中,发育最晚的是()
A. 神经系统 B. 运动系统 C. 淋巴系统 D. 生殖系统 E. 内分泌系统
7. 实施母乳喂养时,哺乳间隔时间应固定在()
A. 0.5 小时 B. 1.0 小时 C. 1.5 小时 D. 2.0 小时 E. 不需定时,需要即哺
8. 减少药物不良反应的有效预防措施是()
A. 用药从最大剂量开始,逐渐减量 B. 多联合用药 C. 加强血药浓度监测 D. 疗程应尽量延长 E. 选用半衰期较长的药物
9. 药物作用的基本表现主要是使机体器官组织()
A. 功能升高或兴奋 B. 功能降低或抑制 C. 兴奋和/或抑制 D. 产生新的功能 E. A 和 D
10. 治疗肺炎球菌性肺炎的首选抗生素是()
A. 庆大霉素 B. 氨基苷类 C. 红霉素 D. 四环素 E. 青霉素
11. 具有解热镇痛作用的药物是()
A. 对乙酰氨基酚和非那西丁 B. 吲哚美辛 C. 氨基比林和布洛芬 D. 吗啡