

模拟试卷(一)

基础知识

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 5 个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 腹部反跳痛的发生机制是
 - A. 肠腔胀气及炎症
 - B. 内脏肿大及淤血
 - C. 肝胰肿瘤及淋巴结转移
 - D. 壁层腹膜受炎症累及
 - E. 胆总管结实并梗阻
2. 下列关于左、右主支气管的描述中正确的是
 - A. 气管在环状软骨处分为左、右主支气管
 - B. 左主支气管较右主支气管粗、短、直
 - C. 进行气管插管时,若插入过深时易误插入右主支气管
 - D. 异物易吸入左主支气管
 - E. 肺脓肿好发于左肺,与左主支气管的结构特点有关
3. 下列引起真菌性肺炎的病原菌为
 - A. 肺炎杆菌
 - B. 肠杆菌
 - C. 葡萄球菌
 - D. 白色念珠菌
 - E. 肺炎球菌
4. 诱发和加重心力衰竭最常见的因素是
 - A. 摄入高钠食物
 - B. 呼吸道感染
 - C. 严重脱水
 - D. 劳累过度
 - E. 各种缓慢型心律失常
5. 急性心肌梗死应用尿激酶治疗,其作用在于
 - A. 疏通心肌微循环
 - B. 增强心肌收缩力
 - C. 溶解冠脉内血栓
 - D. 促进心肌能量代谢
 - E. 减轻心脏前负荷
6. 消化性溃疡发生的基本原理是
 - A. 幽门螺杆菌感染
 - B. 胃酸分泌过多
 - C. 胃黏膜保护作用减弱
 - D. 胃酸和胃蛋白酶的消化作用
 - E. 黏膜损害因素和保护因素之间失去平衡
7. 肝性脑病的重要发病机制是
 - A. 假性神经递质学说
 - B. 胺、硫醇的短链脂肪酸的协同毒性作用
 - C. 氨中毒学说
 - D. γ -氨基丁酸
 - E. 氨基酸代谢不平衡学说
8. 可能导致慢性肾衰竭的病因是
 - A. 原发性肾脏疾病
 - B. 输入异型血
 - C. 贫血
 - D. 水、电解质和酸碱失衡
 - E. 多发性骨髓瘤
9. 下列泌尿系统疾病中,不出现管型尿的疾病是
 - A. 急性肾小球肾炎
 - B. 肾病综合征
 - C. 急性肾盂肾炎

- D. 急性膀胱炎
E. 急性间质性肾炎
10. 出生后的主要造血器官是
A. 骨髓
B. 肝、脾
C. 淋巴结
D. 扁骨
E. 长骨的髓端
11. 人体最重要的神经内分泌器官是
A. 下丘脑
B. 垂体
C. 甲状腺
D. 肾上腺
E. 性腺
12. 下列自身抗体中,诊断系统性红斑狼疮的标志抗体是
A. 抗核抗体(ANA)
B. 抗 SM 抗体
C. 抗双链 DNA 抗体
D. 抗 RNP 抗体
E. 抗 SSA 抗体
13. 脑出血的好发部位在
A. 大脑
B. 小脑
C. 脑桥
D. 脑干
E. 内囊
14. 脑出血最常见的病因是
A. 高血压和动脉粥样硬化
B. 白血病
C. 再生障碍性贫血
D. 抗凝及溶栓治疗
E. 血小板减少性紫癜
15. 按照骨折的程度和形态分类,属于不完全骨折的是
A. 斜形骨折
B. 裂缝骨折
C. 凹陷骨折
D. 嵌插骨折
E. 压缩骨折
16. 骨折愈合过程中第二期为
A. 骨痂改造塑形期
B. 血肿机化演进期
C. 临床愈合期
D. 骨性愈合期
E. 纤维愈合期
17. 鉴别腹股沟斜疝与直疝最有意义的体征是
A. 疝块的形状
B. 疝块是否降入阴囊
C. 是否易嵌顿
D. 回纳疝块后压住内环,增加腹内压是否脱出
E. 疝囊颈是否宽大
18. 下列损伤中,为闭合性损伤的是
A. 刺伤
B. 切割伤
C. 穿透伤
D. 擦伤
E. 脾破裂
19. 腹部内脏中最容易受损伤的器官是
A. 肝
B. 脾
C. 小肠
D. 结肠
E. 胃
20. 原位癌是指

- A. 早期癌
B. 原发癌
C. 癌前病变
D. 未发生转移的癌
E. 未突破基底膜的癌
21. 脑疝形成的主要原因是
A. 弥漫性颅内压增高
B. 脑脊液循环通路受阻
C. 颅腔内压力梯度明显改变
D. 脑水肿、脑组织体积增大
E. 脑干水肿
22. 急性肾功能衰竭少尿或无尿期常见的致死原因是
A. 高磷血症与低钙血症
B. 低钠血症
C. 低氯血症
D. 高镁血症
E. 高钾血症
23. 男性尿道球部损伤可致肿胀和淤血的部位有
A. 单纯阴茎
B. 单纯阴囊
C. 两侧股部
D. 会阴、阴茎、阴囊和下腹壁
E. 单纯会阴部
24. 不属肺癌的分类为
A. 鳞癌
B. 腺癌
C. 大细胞癌
D. 未分化的小细胞癌
E. 鳞腺癌
25. 胸骨角相当于
A. 第一肋骨平面
B. 第二肋骨平面
C. 第三肋骨平面
D. 第四肋骨平面
E. 第五肋骨平面
26. 中位硬膜外阻滞的范围是
A. 颈 5~胸 6 之间
B. 胸 6~胸 12 之间
C. 胸 8~腰 1
D. 腰部各棘突间隙
E. 经骶裂孔
27. 感染性休克常见于下列哪种疾病
A. 胆道蛔虫症
B. 急性水肿性胰腺炎
C. 肝脓肿
D. 急性梗阻性化脓性胆管炎
E. 急性胆囊炎
28. 气性坏疽是属于
A. 毒血症
B. 菌血症
C. 脓血症
D. 败血症
E. 脓毒败血症
29. 心跳、呼吸停止后,为挽救生命,避免脑细胞的死亡,要求在心跳骤停的多少分钟内立即进行现场心肺复苏术,复苏的成功率会越高
A. 5 分钟
B. 6~8 分钟
C. 8~10 分钟
D. 10~12 分钟
E. 8 分钟
30. CPR 是指
A. 心肺复苏术
B. 院前急救
C. 心肺脑复苏

- D. 脑复苏
E. 后期复苏
31. 铺手术洞单要求两侧和足端应垂下超过手术台边
A. 10cm
B. 15cm
C. 20cm
D. 25cm
E. 30cm
32. 胆囊管阻塞导致急性胆囊炎多数是由于
A. 胆囊结石
B. 致病菌侵入
C. 创伤
D. 胆囊管畸形
E. 肝内感染
33. 腹部手术半卧位的目的不正确的是
A. 促使腹内渗出液积聚于盆腔,以减少吸收
B. 膈肌下移,有利于呼吸
C. 腹肌松弛,减轻腹胀
D. 有利于引流
E. 促使肠蠕动,防止肠粘连
34. 引起高渗性缺水的病因不正确的是
A. 食管癌
B. 高热
C. 管饲浓缩高蛋白饮食
D. 大量使用渗透性利尿剂
E. 长期胃肠减压
35. 宫内节育器的并发症正确是
A. 感染
B. 阴道出血
C. 腰腹酸胀感
D. 经量增多
E. 子宫穿孔
36. 关于子宫韧带的解剖下面正确的是
A. 圆韧带起于子宫角止于腹股沟
B. 阔韧带富有肌纤维与子宫体肌纤维相接
C. 卵巢固有韧带使子宫倾向后方
D. 主韧带是横行与子宫颈两侧和骨盆壁之间
E. 子宫骶骨韧带使子宫侧向后方
37. 月经后子宫内膜再生层是
A. 致密层
B. 功能层
C. 基底层
D. 子宫肌层
E. 海绵层
38. 从胎儿娩出到胎盘娩出,不应超过
A. 15 分钟
B. 20 分钟
C. 30 分钟
D. 45 分钟
E. 60 分钟
39. 关于纯母乳喂养的描述,正确的是
A. 在母婴分开时,也要保持泌乳
B. 母乳也需定时
C. 两次哺乳之间可加喂糖水,避免小儿缺水
D. 哺乳后可以给孩子使用安慰奶头
E. 母乳也需定时定量
40. 正常新生儿出现溢奶的原因
A. 进食过量
B. 睡眠姿势不正确
C. 胃部呈水平状
D. 胃部呈垂直状
E. 消化不良
41. 输卵管妊娠下列说法正确的是

- A. 以间质部妊娠最常见
B. 一般子宫增大情况与停经天数相符
C. 输卵管发育不良或功能异常均可成为输卵管妊娠的原因
D. 阴道流血少,不易导致失血性休克
E. 后穹隆穿刺阳性可否定输卵管妊娠的可能
42. 胎盘早剥的病理生理不正确的是
A. 血管病变时底蜕膜小动脉痉挛,远端毛细血管缺血坏死破裂而出血引起早剥
B. 早剥初期受损的胎盘绒毛与蜕膜释放大纤维蛋白原入血,激发 DIC
C. 早剥持续时间越长,DIC 随之加剧
D. 积聚在胎盘宫壁间的血液可侵入肌层,引起子宫胎盘卒中
E. 促凝物质今日肾脏可发生急性肾衰
43. 孕妇患重症肝炎时威胁母婴生命的并发症是
A. 妊娠高血压
B. DIC
C. 心率失常
D. 心力衰竭
E. 糖尿病
44. 某些因素可影响白色假丝酵母菌的存活,请指出
A. 干燥
B. 紫外线
C. 化学制剂
D. 热
E. 日光
45. 下列不属于无排卵性功血的特点的是
A. 多见于育龄妇女
B. 月经周期紊乱
C. 经期长短不一
D. 出血量多少不等
E. 出血多者伴贫血
46. 不会引起痛经的疾病是
A. 子宫内膜异位症
B. 子宫腺肌病
C. 子宫黏膜下肌瘤
D. 盆腔炎症性包块
E. 无排卵性功血
47. 妇科手术术前严格禁水的时间是
A. 4 小时
B. 6 小时
C. 8 小时
D. 10 小时
E. 12 小时
48. 外阴、阴道手术术晨阴道准备的方法是
A. 按医嘱给抗生素
B. 常用 1:20 碘伏液坐浴
C. 一般行阴道冲洗或坐浴
D. 进无渣饮食
E. 术晨用消毒液行阴道和宫颈消毒
49. 宫内节育器放置时间正确的是
A. 月经干净后 3~7 天
B. 产后 1 个月
C. 剖宫产术后 3 个月
D. 人工流产术后宫腔长度大于 10cm 者
E. 哺乳期随时
50. 过期妊娠是指
A. 平时月经周期规律,妊娠达到 38 周仍未临产
B. 妊娠达到 39 周仍未临产
C. 平时月经周期规律,妊娠达 39 周仍未临产
D. 平时月经周期规律,妊娠达 42 周仍未临产

- E. 平时月经周期规律,妊娠达 40 周仍未临产
51. 为了解盆腔后壁的情况,应该做的检查是
- A. 腹部触诊
 - B. 外阴视诊
 - C. 阴道扪诊
 - D. 双合诊
 - E. 三合诊
52. 子宫内膜癌的复发率为
- A. 5%~10%
 - B. 10%~20%
 - C. 20%~30%
 - D. 30%~40%
 - E. 40%~50%
53. 根据小儿生长发育的特点,可将小儿年龄划分为
- A. 3 期
 - B. 4 期
 - C. 5 期
 - D. 6 期
 - E. 7 期
54. 婴儿补充维生素 D 的时间是
- A. 生后 1 周
 - B. 生后 2 周
 - C. 生后 3 周
 - D. 生后 4 周
 - E. 生后 2 个月
55. 足月儿是指
- A. 胎龄在 26 周至未满 37 周的新生儿
 - B. 胎龄在 26 周至未满 35 周的新生儿
 - C. 胎龄在 28 周至未满 37 周的新生儿
 - D. 胎龄在 37 周至未满 40 周的新生儿
 - E. 胎龄在 37 周至未满 42 周的新生儿
56. 营养不良主要指
- A. 热量和(或)脂肪的缺乏
 - B. 热量和(或)蛋白质的缺乏
 - C. 热量和(或)糖的缺乏
 - D. 蛋白质和(或)脂肪的缺乏
 - E. 脂肪和(或)糖的缺乏
57. 新生儿排胎便的时间为
- A. 生后 1~2 天
 - B. 生后 6 小时内
 - C. 生后 24 小时内
 - D. 生后 2~3 天
 - E. 生后 12 小时内
58. 控制新生儿惊厥首选的药物是
- A. 苯巴比妥
 - B. 安定
 - C. 5%水合氯醛
 - D. 苯妥英钠
 - E. 氯丙嗪
59. 胃排空水的时间为
- A. 1 小时
 - B. 1.5~2 小时
 - C. 0.5 小时
 - D. 2~3 小时
 - E. 3~4 小时
60. 根据病理分类,小儿肺炎可分为
- A. 典型性肺炎,非典型肺炎
 - B. 大叶性肺炎,支气管肺炎,间质性肺炎
 - C. 原虫性肺炎,衣原体肺炎
 - D. 吸入性肺炎,过敏性肺炎
 - E. 迁延性肺炎,小叶性肺炎
61. 心脏形成的关键时期是
- A. 胚胎发育 1~2 周
 - B. 胚胎发育 2~8 周
 - C. 孕前 3 个月

- D. 孕后 3 个月
E. 怀孕中期
62. 与肉眼血尿的颜色相关的是
A. 尿蛋白量
B. 尿比重
C. 尿酸碱度
D. 尿量
E. 尿肌酐量
63. 小儿尿路感染主要途径是
A. 上行感染
B. 直接感染
C. 从输尿管周围淋巴管感染
D. 血行感染
E. 从肠道经淋巴管感染
64. 小儿造血的两个阶段是
A. 中胚叶造血和肝(脾)造血
B. 肝(脾)造血和生后造血
C. 胚胎期造血和生后造血
D. 骨髓造血和骨髓外造血
E. 胚胎期造血和骨髓外造血
65. 引起病毒性脑膜炎最常见的原因是
A. 肠道病毒
B. 虫媒病毒
C. 腮腺炎病毒
D. 疱疹病毒
E. 流感病毒
66. 下列与儿童类风湿病有关致病因素为
A. 抗生素
B. 免疫抑制剂
C. 病毒感染
D. 类固醇激素
E. 抗风湿药
67. 传染病的流行形式有
A. 散发
B. 播散
C. 虫媒传播
D. 土壤传播
E. 胃肠传播
68. 小儿初次感染结核菌是否发展为结核病取决于
A. 机体免疫力
B. 年龄
C. 性别
D. 家族史
E. 生活习惯
69. 患者女性, 56 岁。因头晕、头疼就医, 测血压 165/105mmHg, 可考虑为
A. 正常高限
B. 临界高血压
C. I 级高血压
D. II 级高血压
E. III 级高血压
70. 医学伦理学作为一门独立的学科首先产生于
A. 英国
B. 法国
C. 意大利
D. 美国
E. 中国
71. 医学伦理学基本理论不包括的是
A. 生命神圣论
B. 医学人道论
C. 结果论与功利论
D. 非结果论与义务论
E. 人权论
72. 通过“对医学道德规范的意识”确定医学道德规范, 这是

- A. 具体医学伦理难题
- B. 抽象医学道德评价
- C. 具体医学道德评价
- D. 抽象医学伦理难题
- E. 社会医学伦理问题

二、以下提供若干组考题,每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 5 个备选答案。请从中选择一个与问题密切相关的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(73~74 题共用备选答案)

- A. ITP
 - B. 过敏性紫癜
 - C. 各种血友病
 - D. 白血病
 - E. 再生障碍性贫血
73. 由于血小板破坏性增加引起的出血性疾病是
74. 由于血管脆性增加引起的出血性疾病是

(75~77 题共用备选答案)

- A. 耳后皮下瘀斑
 - B. 脑脊液耳、鼻漏
 - C. “熊猫眼征”、“兔眼征”
 - D. 角膜干燥
 - E. 头痛、呕吐
75. 颅前窝骨折表现为
76. 颅中窝骨折表现为
77. 颅后窝骨折表现为

(78~79 题共用备选答案)

- A. 畸形
- B. 关节僵硬
- C. 骨痂改造塑形期
- D. 骨筋膜室综合征
- E. 原始骨痂形成期

78. 骨折早期并发症为
79. 骨折晚期并发症为

(80~81 题共用备选答案)

- A. 食管黏膜呈串珠样改变,食管蠕动良好
 - B. 充盈缺损,管腔狭窄梗阻
 - C. 食管下端呈光滑的鸟嘴状狭窄,断裂
 - D. 局限性黏膜皱襞增粗,断裂
 - E. 食管腔外压迫,黏膜常完整光滑
80. 晚期食管癌
81. 贲门失弛症

(82~84 题共用备选答案)

- A. 嵌顿性股疝
 - B. 肠蛔虫团堵塞
 - C. 乙状结肠扭转
 - D. 肠套叠
 - E. 急性肠炎
82. 属于单纯机械性不完全性肠梗阻的是
83. 属于动力性肠梗阻的是
84. 属于血运性肠梗阻且易发于婴儿的是

(85~87 题共用备选答案)

- A. 前列腺特异抗原
 - B. 膀胱肿瘤抗原
 - C. 经尿道前列腺切除术
 - D. 体外冲击波碎石
 - E. 流式细胞测定
85. PSA 是指
86. ESWL 是指
87. TUR-P 是指

(88~90 题共用备选答案)

- A. 丹毒
 - B. 新生儿皮下坏疽
 - C. 疖
 - D. 痈
 - E. 脓性指头炎
88. 易引起化脓性海绵状静脉窦炎

89. 病变部位一般不化脓的是

90. 需要尽早切开的是

(91~93 题共用备选答案)

- A. 子宫底高度在脐耻之间
- B. 子宫底高度在脐上 1 横指
- C. 子宫底高度在脐上 3 横指
- D. 子宫底高度在剑突与脐之间
- E. 子宫底高度在剑突下 2 横指

91. 妊娠 16 周末

92. 妊娠 24 周末

93. 妊娠 36 周末

(94~95 题共用备选答案)

- A. 宫颈糜烂
 - B. 子宫颈息肉
 - C. 子宫颈肥大
 - D. 子宫颈腺体囊肿
 - E. 子宫颈炎
94. 宫颈管黏膜因炎症刺激出现局部性增生
95. 宫颈鳞状上皮细胞被宫颈柱状上皮细胞

取代

(96~98 题共用备选答案)

- A. 握持反射消失
- B. 可独自玩弄小毛绒玩具
- C. 可用拇指、食指捏取葡萄干
- D. 能翻书
- E. 可搭几块积木

96. 18 个月

97. 12 个月

98. 10 个月

(99~100 题共用备选答案)

- A. 甲状腺功能亢进
- B. 甲状旁腺反应迟钝
- C. 甲状腺功能低下
- D. 甲状旁腺功能代偿性增强
- E. 常染色体隐性遗传

99. 维生素 D 缺乏性手足抽搐症的发病机制

100. 维生素 D 缺乏性佝偻病的发病机制

相关专业知识

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 5 个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列关于心尖搏动描述不正确的是

- A. 正常人位于左侧第 5 肋间锁骨中线内 0.5~1.0cm
- B. 搏动范围直径约 2.0~2.5cm
- C. 左室增大时,心尖搏动向左下移位
- D. 右室增大时,多向右侧移位
- E. 一侧肺不张时移向患侧

2. 目前控制哮喘最有效的药物是

- A. β_2 受体激动剂
- B. 糖皮质激素
- C. 抗胆碱能药物
- D. 茶碱类
- E. 肥大细胞膜稳定剂

3. 早期发现肺结核的最主要方法是

- A. 询问病史
- B. 胸部 X 线检查
- C. 痰菌检查
- D. 血沉检查
- E. 结核菌素试验

4. 下列药物中不是治疗心力衰竭的正性肌力的药物是

- A. 硝酸异山梨酯
- B. 地高辛
- C. 多巴胺
- D. 毛花苷 C
- E. 多巴酚丁胺

5. 下列属于应用洋地黄类药物禁忌证的疾

病是

- A. 充血性心力衰竭
- B. 三度房室传导阻滞
- C. 心房颤动
- D. 室上性心动过速
- E. 心房扑动

6. 急性肾盂肾炎抗感染原则

- A. 在尿液检查之前,首选青霉素
- B. 首选激素治疗
- C. 根据药敏可选用相关抗生素类药
- D. 用药至症状完全消失后停药
- E. 轻者可用一种抗菌药物

7. 关于急性肾炎的治疗下列不正确的是

- A. 对症治疗
- B. 急性期 1~2 周内应卧床休息
- C. 必须马上使用青霉素治疗
- D. 注意防治并发症
- E. 禁止肾毒性药物的使用

8. 缺铁性贫血的治疗原则

- A. 去除病因,补充铁剂
- B. 尽快输血,纠正贫血
- C. 加强营养,增加抵抗力
- D. 立即补足铁剂
- E. 首选注射铁剂

9. 治疗慢性再生障碍性贫血的首选药为

- A. 雄激素
- B. 雌激素
- C. 糖皮质激素
- D. 免疫抑制剂
- E. 造血因子

10. TRH 兴奋试验,如 TSH 有升高反应其

意义为

- A. 可排除甲亢
- B. 支持甲亢的诊断
- C. 见于 Graves 眼病
- D. 见于 TSH 瘤
- E. 见于自主性高功能腺瘤

11. 类风湿关节炎缓解期最主要的护理是

- A. 注意观察病情
- B. 避免过度疲劳
- C. 指导关节功能锻炼
- D. 避免精神刺激
- E. 给予饮食指导

12. 急性口服中毒可采用导泻方法清除胃肠道内尚未被吸收的毒物,下列不宜进行导泻的病人是

- A. 严重腹泻
- B. 洗胃后
- C. 中毒量小者
- D. 催吐后
- E. 昏迷者

13. 急性口服中毒可采用洗胃方法清除胃肠道内尚未被吸收的毒物,洗胃应尽早进行,一般洗胃有效时间是在服毒后

- A. 6 小时内
- B. 8 小时内
- C. 10 小时以内
- D. 12 小时以内
- E. 24 小时以内

14. 急性口服中毒可采用洗胃方法清除胃肠道内尚未被吸收的毒物,最常用的洗胃溶液

- A. 1 : 5000 高锰酸钾
- B. 1%~2%碳酸氢钠
- C. 20%甘露醇
- D. 清水

E. 1%食盐水

15. 亚硝酸盐中毒,解毒剂选用

- A. 二基丙醇药.
- B. 贝美格
- C. 亚甲蓝
- D. 硫代硫酸钠
- E. 阿托品、解磷定

16. 急性一氧化碳中毒时医护人员到达现场首先应采取的措施是

- A. 迅速脱离中毒现场
- B. 松解病人的衣服
- C. 保持呼吸道通畅
- D. 纠正缺氧
- E. 对症治疗

17. 急性感染性多发性神经根炎患者的脑脊液检查常表现为蛋白细胞分离现象,是指

- A. 蛋白显著升高,细胞数下降
- B. 蛋白显著升高,细胞数正常
- C. 蛋白显著下降,细胞数升高
- D. 蛋白显著下降,细胞数正常
- E. 蛋白正常,细胞数下降

18. 下列选项中属于骨折早期并发症的是

- A. 愈合障碍
- B. 关节僵硬
- C. 脂肪栓塞
- D. 骨化性肌炎
- E. 缺血性骨坏死

19. 下列不属于骨折专有体征的是

- A. 功能障碍
- B. 骨擦音
- C. 骨擦感
- D. 反常运动
- E. 畸形

20. 腰椎间盘突出症早期的基本治疗是
- A. 止痛药物
 - B. 理疗
 - C. 腰背肌锻炼
 - D. 绝对卧床休息
 - E. 推拿按摩
21. 冬眠低温疗法较为理想的是体温降至
- A. 肛温 $32\sim 33^{\circ}\text{C}$
 - B. 肛温 $31\sim 34^{\circ}\text{C}$
 - C. 肛温 $30\sim 32^{\circ}\text{C}$
 - D. 肛温 $28\sim 32^{\circ}\text{C}$
 - E. 肛温 $30\sim 33^{\circ}\text{C}$
22. 门静脉高压症手术治疗主要解决
- A. 食管胃底静脉曲张破裂出血
 - B. 腹水
 - C. 脾肿大脾功能亢进
 - D. 肝功能损害
 - E. 肝性脑病
23. 下列属于择期手术的疾病是
- A. 绞窄性肠梗阻
 - B. 乳癌
 - C. 易复性疝
 - D. 脾破裂
 - E. 胰腺癌
24. 急性阑尾炎最重要的体征是
- A. 结肠充气试验阳性
 - B. 直肠指诊右前方触痛
 - C. 腰大肌试验阳性
 - D. 右下腹固定压痛点
 - E. 腹膜炎体征
25. 尿液生化检查留取尿标本的方法是
- A. 新鲜晨尿
 - B. 中断尿
 - C. 导出尿液
 - D. 24 小时尿液
 - E. 尿沉渣
26. 尿细胞学检查找癌细胞,为提高阳性率,需留取
- A. 连续 3 天新鲜尿液
 - B. 导出尿液
 - C. 24 小时尿液
 - D. 2 小时尿液
 - E. 新鲜晨尿一次
27. “三凹征”产生的主要原因为
- A. 上呼吸道阻塞
 - B. 下呼吸道阻塞
 - C. 混合性呼吸道阻塞
 - D. 弥漫性肺部阻塞
 - E. 肺不张
28. 下列属于食管癌典型症状的是
- A. 进行性厌食
 - B. 进食时易哽噎
 - C. 胸骨后烧灼感
 - D. 胸痛,声音嘶哑
 - E. 进行性吞咽困难
29. 颅内压增高最根本的治疗原则是
- A. 脱水治疗
 - B. 糖皮质激素治疗
 - C. 病因治疗
 - D. 冬眠低温疗法
 - E. 侧脑室外引流术
30. 可作为肿瘤定性诊断的检查是
- A. 内镜检查
 - B. 实验室检查
 - C. 病理检查
 - D. 影像学检查
 - E. 同位素检查

31. 治疗成人急性呼吸窘迫综合征病人低氧血症的最佳措施是
- 避免输液过量过快
 - 持续高流量吸氧
 - 呼气末正压通气
 - 鼓励深呼吸和排痰
 - 按时使用有效抗生素
32. 有高血压史者术中出现低血压,指血压下降超过术前血压的
- 10%
 - 20%
 - 30%
 - 40%
 - 50%
33. 补充血容量首先应输注的液体是
- 胶体液
 - 血浆
 - 全血
 - 平衡盐溶液
 - 0.9%氯化钠
34. 脓形指头炎,切开引流的指征是
- 搏动性跳痛
 - 手指肿胀
 - 针刺样疼痛
 - 手背肿胀
 - 有波动感
35. 成人大面积烧伤后,液体疗法中,伤后第一个24小时,晶体与胶体液之比为
- 1:2
 - 2:1
 - 1:1.5
 - 1.5:1
 - 1.8:1
36. 心跳、呼吸骤停后出现较早的临床表现是
- 血压测不到
 - 面色苍白
 - 意识突然丧失
 - 反射消失
 - 瞳孔散大
37. 假孕症状下列描述不正确的是
- 乳房胀大
 - 外阴、阴道、宫颈着色
 - 生殖道变软
 - 阴道分泌物减少
 - 乳头、乳晕着色
38. 子痫病人护理措施中不正确的是
- 床边应加床档
 - 动作要轻巧
 - 保持呼吸道通畅
 - 协助病人多翻身、防止褥疮发生
 - 平卧、头偏向一侧
39. 对于过期妊娠护理措施描述不正确的是
- 指导孕妇积极休息,鼓励营养摄入
 - 进入产程后,鼓励产妇左侧卧位,给予氧气吸入
 - 若出现了胎盘功能减退或胎儿窘迫现象,应立即剖宫产结束分娩
 - 积极做好各种手术操作的准备和抢救新生儿的准备工作
 - 嘱孕妇多活动,多吃肉类食品
40. 妊娠合并肝炎的孕妇在产后的正确处理为
- 用四环素预防感染
 - 鼓励母乳喂养
 - 注射维生素K预防出血
 - 产妇分娩后回普通病房休息
 - 产后早期下床活动

41. 产妇死亡的第一位原因是
A. 妊娠高血压综合征
B. 妊娠合并心脏病
C. 产后出血
D. 羊水栓塞
E. 产褥感染
42. 尿瘘病人检查时应取的体位是
A. 平卧
B. 侧卧
C. 俯卧
D. 膀胱截石位
E. 膝胸位
43. 关于滴虫阴道炎临床表现正确的是
A. 外阴瘙痒, 红肿
B. 悬滴法找到白细胞增多
C. 阴道 pH4.5
D. 阴道黏膜上附着白带, 擦后露出红肿黏膜面
E. 稀薄泡沫状白带增多
44. 葡萄胎卵巢黄素化囊肿在葡萄胎清除后自然消失的时间是
A. 1 个月内
B. 2~4 个月内
C. 5 个月内
D. 半年内
E. 1 年内
45. 严重的化疗反应主要是
A. 造血功能障碍
B. 恶心呕吐
C. 肾功能损害
D. 皮肤色素沉着
E. 心功能损害
46. 妇科手术后腹部压沙袋
A. 2 小时
B. 4 小时
C. 6 小时
D. 8 小时
E. 10 小时
47. 晚期宫颈癌病人有大量米汤样或恶臭脓样阴道排液者, 可用擦洗阴道的溶液是
A. 0.5% 醋酸
B. 4% 碳酸氢钠
C. 1:2000 苯扎溴铵
D. 1:1000 呋喃西林
E. 1:5000 高锰酸钾
48. 下列会阴擦洗护理要点描述正确的是
A. 观察会阴伤口有无红肿及分泌物
B. 保持擦洗液温度在 40℃ 左右
C. 留置尿管者因防止脱出不用擦洗
D. 会阴伤口感染者应最先擦洗
E. 会阴擦洗每日 1 次
49. 会阴切开术后产妇的卧位为
A. 患侧卧位
B. 健侧卧位
C. 左侧卧位
D. 右侧卧位
E. 仰卧位
50. 下列属于会阴热敷适应证的有
A. 会阴白斑
B. 会阴出血
C. 会阴血肿
D. 阴道炎
E. 长期卧床者
51. 经腹输卵管结扎术时间选择正确的是
A. 非孕妇女最好是月经结束后 3~4 天
B. 哺乳期随时
C. 自然流产后即刻
D. 闭经妇女

- E. 分娩后 24 小时后
52. 新生儿衣原体肺炎,可选用的抗生素是
- 青霉素
 - 头孢菌素
 - 阿米卡星
 - 苯唑西林
 - 红霉素
53. 新生儿窒息复苏的关键是
- 清理呼吸道
 - 建立呼吸
 - 恢复循环
 - 药物治疗
 - 评价和环境
54. 预防佝偻病的措施不妥的是
- 婴儿期多服用钙剂
 - 多到户外晒太阳
 - 多食含维生素 D 的食物
 - 每日口服维生素 D 400~800IU
 - 冬季肌肉注射维生素 D 10 万~20 万 IU 一次
55. 营养不良早期诊断灵敏而可靠的指标是
- 血浆蛋白
 - 血浆转铁蛋白
 - 血浆胰岛素生长因子
 - 血浆胆固醇
 - 血糖
56. 2 岁小儿脉搏的正常值为
- 100~120 次/分
 - 120~140 次/分
 - 110~130 次/分
 - 80~100 次/分
 - 70~90 次/分
57. 与成人比较,小儿易发生呼吸功能不全的因素不包括
- 肺活量小
 - 呼吸道阻力小
 - 潮气量小
 - 每分通气量小
 - 气体弥散量小
58. 关于室间隔缺损,下列错误的是
- 左向右分流型
 - 体循环血流量减少
 - 肺循环血流量增加
 - 肺动脉第二音亢进
 - 胸骨左缘第 2~3 肋间可闻及 II~III 级收缩期喷射性杂音
59. 原则上注意缺陷多动障碍的患儿不用神经兴奋剂的年龄是
- 8 岁以下
 - 6 岁以下
 - 3 岁以下
 - 6 岁以上
 - 5 岁以上
60. 有关风湿热舞蹈病的治疗正确的是
- 青霉胺
 - 药物疗效不佳
 - 水杨酸盐
 - 泼尼松
 - 红霉素
61. 因治疗不当易引起 Reye 综合征的传染病是
- 猩红热
 - 麻疹
 - 水痘
 - 中毒型细菌性痢疾
 - 流行性腮腺炎
62. 目前国内认为第一线抗结核药物是

- A. 吡嗪酰胺
B. 卡那霉素
C. 对氨基水杨酸钠
D. 乙胺丁醇
E. 氨硫脲
63. 患者男性,21岁。20天前无明显诱因出现、体温最高达 39°C 。查体双侧颈部可触及数个黄豆大小的淋巴结,胸骨压痛阳性,骨髓检查提示急性白血病,为进一步区分是急淋还是急非淋,需首选的检查是
A. 细胞化学染色
B. 免疫学检查
C. 染色体
D. 基因检查
E. 复查骨髓检查
64. 男性,54岁,糖尿病病史20年,近期加重,其呼出的气味可能为
A. 恶臭味
B. 氨味
C. 烂苹果味
D. 刺激性大蒜味
E. 肝腥味
65. 患者女性,70岁。咳嗽、咳痰30年,活动后气促15年,双下肢水肿5年,加重20天入院,患者下肢水肿应考虑
A. 肺心病右心衰
B. 低蛋白血症
C. 摄盐过多
D. 合并肾炎
E. 冠心病
66. 患者男性,66岁。胸痛2小时,诊断为急性心肌梗死,给予急诊溶栓治疗,下列对直接诊断冠脉再通最有价值的是
A. 胸痛2小时内基本消失
B. 出现心律失常
C. 心电图抬高ST段回降 $>50\%$
D. 血清心肌酶峰值提前
E. 冠脉造影示闭塞动脉再通
67. 患者女性,68岁。入院诊断:慢性心力衰竭,遵医嘱服用地高辛每日 0.125mg ,某日病人将白墙看成黄墙,提示病人出现
A. 心衰好转征象
B. 心律恢复正常
C. 洋地黄药物中毒
D. 血钾过低
E. 血钠过高
68. 患者男性,38岁。甲亢复发。体格检查:轻度突眼,甲状腺弥漫性肿大,心率120次/分。实验室检查: $\text{FT}_3 \uparrow$, $\text{FT}_4 \uparrow$, $\text{TSH} \downarrow$, AST中度升高, $\text{WBC } 3.8 \times 10^9/\text{L}$ 。对此患者选用的治疗方法较为适宜的是
A. 抗甲状腺药物治疗
B. 复方碘溶液
C. 甲状腺手术治疗
D. 抗甲状腺药物+糖皮质激素
E. 放射性 ^{131}I 治疗
69. 患者女性,30岁。因外伤后感染,发生了气性坏疽,最重要的治疗是
A. 解热、镇痛
B. 高压氧治疗
C. 应用抗生素
D. 纠正水和电解质失调
E. 清创
70. 患者男性,42岁。腹部外伤2小时就诊,体格检查血压 $90/60\text{mmHg}$,脉搏110次/分,全腹压痛,伴腹肌紧张和反跳痛,血红蛋白 10g/L ,此时的治疗措施应为
A. 留置尿管,胃肠减压