



执业资格考试参考

张锐 主编

临床医学习题集

供护理、助产、临床医学、社区医学等专业用

贵州民族出版社



张锐主编

最简明
最实用
最权威
最经典

执业资格考试参考

临床医学学习题集

供护理、助产、临床医学、社区医学等专业用

第1册

出版时间：2007年7月

印数：

贵州民族出版社

责任编辑 薛丽娥

封面设计 吕凤梧

图书在版编目(CIP)数据

临床医学习题集:执业资格考试参考.第1册/张锐主编
一贵阳:贵州民族出版社,2007.4
ISBN 978 - 7 - 5412 - 1431 - 8/R · 36

I. 临... II. 张... III. 临床医学 - 专业学校 - 习题 IV. R4 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 038118 号

临床医学习题集

第1册

贵州民族出版社出版

(贵阳市中华北路 289 号)

贵州新华印刷二厂印刷

开本:787 × 1 092 mm 1/16 印张:15.125 字数:540 千

2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷

印数:1 ~ 6 000 册 定价:24.00 元

编委名单

主编 张 锐

主 审 薛 花

副主审 陈树芳 李惠兰

副主编 柴其宇

编 者 (以姓氏笔画为序)

刘贵书 刘建州 张 锐 张煜辉

张成福 吴 如 吴培娟 周莉 D

周莉 X 杨 军 祝春霞 赵国秀

赵岫雯 姜 娟 柴其宇 谢建敏

管 萍

前　　言

为进一步深化卫生职业教育教学改革,适应新时期卫生事业改革与发展形势对卫生职业人才、需求的变化,适应医疗、卫生、护理岗位的需求,以培养职业能力为重点,以专业技术应用能力和基本职业素质为主线,以服务为宗旨,以就业为导向,以岗位需求为标准,对各专业的临床教学内容进行了科学的选择配置、有效整合、合理排序,构建了科学的知识结构和能力结构。同时为了适应国家执业医师、助理执业医师和执业护士资格考试的要求,满足广大医务工作者晋升、晋级、竞聘考试的需要,专门组织各临床学科带头人及业务骨干教师编写了这套《临床医学习题集》共2册。

《临床医学习题集》具有内容新颖、题型众多、知识覆盖面广、题量大、内容丰富、涵盖学科考试及执业资格考试主要考点的特点,是考前强化训练的必备书籍。试题以卫生部最新规划教材为命题依据,题型包括A型题(A₁A₂A₃A₄)、B型题(B₁)、X型题、填空题、判断题、解释题、简答题和案例分析题。特别是以国家执业资格考试采用的A型题和B型题演练的内容,全方位模拟考试真题,既能使学生巩固新学的知识,又能提高综合分析、判断能力。

《临床医学习题集》严格按照教学大纲要求的知识点编写,不漏写、不超纲;严格按照考试以常见病、多发病为命题重点的特点编写,其内容精练、重点突出、淡化一般知识点。针对考生复习量大,复习时间紧的特点,突出内容结构的逻辑性,便于考生记忆和启发回忆,帮助考生在考前高效、快速掌握考试重点和难点。

《临床医学习题集》的出版发行得到贵阳市卫生学校薛花校长、陈树芳副校长及教务科李惠兰科长的关心和指导,在此对她们表示深深的谢意。由于编者水平及经验所限,习题集中难免出现不妥之处,恳请广大教师、学生及临床工作者提出意见、建议和要求,便于以后修订完善再版。

张　锐

2006年11月26日于贵阳

题型说明

本书采用选择题(包括 A 型题、B 型题、X 型题)、填空题、判断题、解释题、问答题、案例分析题等题型，现将各题型的答题说明分述如下：

一、选择题

1. A 型题

(1) A₁ 型题(单句型最佳选择题)

每一道试题后面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，从中选择一个最佳答案。

(2) A₂ 型题(病例摘要型最佳选择题)

每一道试题是以一个病例出现的，其后面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，从中选择一个最佳答案。

(3) A₃/A₄ 型题(病例组型/病例串型最佳选择题)

每个病例下设 2~3 个/3 个以上与病例有关的问题，每个问题下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，从中选择一个最佳答案。病例中提供了回答问题所需要的相关信息，必须根据病例回答问题，问题与问题之间是相互独立的。

2. B 型题(标准配伍题)

每道试题前面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，答题时如果这道题只与答案 A 有关，则答案就选择 A；如果这道题只与答案 B 有关，则答案就选择 B；依此类推，每个备选答案可以选择一次或多次，也可以一次都不选择。

3. X 型题(多项选择题)

每道试题后面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，从中选择一个或若干个答案，选择完全得分，少选或多选不得分。

二、填空题

将需要写的内容填写在划线的上方，注意其完整性和准确性。

三、判断题

认为正确的在题后括号内画“√”，认为错误的在题后括号内画“×”。

四、解释题

简明扼要解释并说明基本概念,基础知识。

五、简答题

抓住问题的实质,简明扼要阐述问题,注意突出重点,简短精练。

六、案例分析题

根据案例所提供的信息资料及要求,依次简明扼要回答问题。

目 录

内 科 学

诊断学	(1)
呼吸系统疾病	(5)
泌尿系统疾病	(9)
急性中毒	(11)
循环系统疾病	(13)
血液系统疾病	(18)
消化系统疾病	(20)
内分泌代谢疾病	(24)
神经系统	(26)

妇 产 科 学

女性生殖系统解剖	(29)
女性生殖系统生理	(33)
生理产科学	(38)
病理妊娠	(51)
妊娠合并症	(58)
异常分娩	(60)
分娩期并发症	(62)
产褥感染	(65)
妇科病史及检查的配合	(66)

女性生殖器官炎症	(68)
女性生殖器官肿瘤	(75)
滋养细胞疾病	(80)
月经失调	(83)
妇科其他疾病	(88)
妇科手术病人护理及护理技术	(90)
计划生育手术	(92)

儿 科 学

绪论及儿科医疗机构	(96)
儿科基础知识	(97)
儿科医疗机构组织特点	(101)
住院儿童的护理	(101)
小儿疾病的治疗	(103)
儿科常见症状的护理	(105)
新生儿及新生儿疾病的护理	(106)
营养性疾病患儿的护理	(109)
消化系统疾病患儿的护理	(111)
呼吸系统疾病患儿的护理	(114)
循环系统疾病患儿的护理	(116)
泌尿系统疾病患儿的护理	(117)
血液系统疾病患儿的护理	(119)
神经系统疾病患儿的护理	(120)

结缔组织疾病患儿的护理	(121)
内分泌系统疾病患儿的护理	(122)
急性传染病患儿的护理	(123)
小儿结核病的护理	(124)

五官科学

眼科学	(126)
【眼科应用解剖生理】	(126)
【眼科检查】	(132)
【眼科疾病】	(135)
耳鼻咽喉科学	(151)
【耳鼻咽喉科应用解剖生理】	(151)
【耳鼻咽喉科检查】	(157)
【耳鼻咽喉科病人的护理】	(162)
口腔科学	(177)
【口腔颌面部的应用解剖生理】	(177)
【口腔科检查】	(179)
【口腔科病人的护理】	(180)

预防医学

绪论	(187)
人和环境	(188)

自然环境与健康	(190)
社会环境与健康	(191)
健康测量指标及评价	(193)
疾病的发生要素与预防原则	(194)
流行病学调查分析	(196)
环境卫生	(199)
劳动卫生	(202)
学校卫生	(204)
传染病防治	(205)
地方病防治	(208)
营养基础知识	(209)
合理营养与平衡膳食	(212)
健康人群的营养	(214)
常见疾病的营养治疗	(216)
临床膳食疗法	(217)

传染科学

总论	(218)
病毒感染性疾病病人的护理	(222)
细菌感染性疾病病人的护理	(228)
钩端螺旋体疾病病人的护理	(231)
原虫感染性疾病病人的护理	(232)

内科学

诊断学

一、选择题

(一) A₁型题

1. 发热 38.1℃ ~ 39℃ 时称为()。
A. 微热 B. 低热 C. 高热
D. 中度热 E. 超高热
2. 正常血压值不超过()。
A. 21.3/12.0 kPa(160/90 mmHg)
B. 20.0/13.3 kPa(150/100 mmHg)
C. 18.7/12.0 kPa(140/90 mmHg)
D. 21.3/12.6 kPa(160/95 mmHg)
E. 20.0/10.6 kPa(150/80 mmHg)
3. 正常人体的基本叩诊音不包括()。
A. 清音 B. 鼓音 C. 实音
D. 浊音 E. 过清音
4. 关于昏迷, 错误的是()。
A. 大小便失禁 B. 对疼痛刺激有反应
C. 吞咽, 咳嗽, 反射存在 D. 对光、声刺激无反应
E. 大声呼叫, 可睁眼, 但不能回答
5. 黄疸首先出现于()。
A. 手掌 B. 面部 C. 额头
- D. 颈部 E. 巩膜和软腭黏膜
6. 检查贫血病人皮肤黏膜苍白应当检查的部位是()。
A. 舌头 B. 手掌 C. 面部
D. 软腭黏膜 E. 眼结膜、口唇、甲床
7. 皮肤红色充血性皮疹与皮肤表面平, 约 3~4 mm 直径大小, 压之退色, 松手复又出现, 这是()。
A. 斑疹 B. 丘疹 C. 斑丘疹
D. 玫瑰疹 E. 蕊麻疹
8. 胃癌多转移到()。
A. 颈部淋巴结 B. 腋窝淋巴结
C. 腹股沟淋巴结 D. 右锁骨上淋巴结
E. 左锁骨上淋巴结
9. () 是麻疹黏膜斑。
A. 颊黏膜红肿 B. 颊黏膜出血斑
C. 口腔黏膜点状白膜 D. 颊黏膜蓝色色素沉着斑
E. 对着第二臼齿颊黏膜上针尖大小白点, 圈以红晕
10. 正常肺部叩诊音呈()。
A. 清音 B. 实音 C. 鼓音
D. 浊音 E. 过清音
11. 下列病史语颤增强的是()。
A. 气胸 B. 肺气肿 C. 肺不张
D. 肺实变 E. 大量胸腔积液

12. 一侧胸廓饱满,呼吸消失,叩诊呈实音,语颤消失,气管向对侧移位,应考虑()。
 A. 气胸 B. 肺气肿 C. 肺不张
 D. 肺实变 E. 大量胸腔积液
13. 肺气肿病人的胸廓呈()。
 A. 扁平胸 B. 鸡胸 C. 桶状胸
 D. 漏斗胸 E. 正常胸
14. 可导致吸气性呼吸困难的是()。
 A. 支气管哮喘 B. 喉头水肿 C. 慢性支气管炎
 D. 阻塞性肺气肿 E. 左心功能不全
15. 胸骨右缘第二肋间是()。
 A. 三尖瓣听诊区 B. 二尖瓣听诊区
 C. 肺动脉瓣听诊区 D. 主动脉瓣第二听诊区
 E. 主动脉瓣第一听诊区
16. 二尖瓣狭窄心脏浊音界的改变,正确的是()。
 A. 心脏浊音界呈梨形
 B. 心脏浊音界呈靴形
 C. 心脏浊音界呈三角烧瓶形
 D. 心脏浊音界向左下扩大
 E. 心脏浊音界向两侧扩大
17. 急性纤维素性胸膜炎可听到的是()。
 A. 肝音 B. 大水泡音 C. 捻发音
 D. 小水泡音 E. 胸膜摩擦音
18. 心尖搏动向左下移位见于()。
 A. 心包炎 B. 左心室增大 C. 右心室增大
 D. 心包积液 E. 左心房增大
19. 正常成人心率为()。
 A. 30~50 次/分 B. 60~100 次/分
 C. 100~120 次/分 D. 120~150 次/分
 E. 150~200 次/分
20. 心尖区听到舒张期“隆隆”样杂音提示()。
 A. 二尖瓣狭窄 B. 二尖瓣关闭不全
 C. 主动脉瓣狭窄 D. 主动脉瓣关闭不全
 E. 三尖瓣关闭不全
21. 胸骨右缘第二肋间触及收缩期震颤,提示()。
 A. 肺动脉瓣狭窄 B. 二尖瓣关闭不全
 C. 主动脉瓣狭窄 D. 动脉导管未闭
 E. 主动脉瓣关闭不全
22. 心尖搏动在第6肋间左锁骨中线外2cm处,其原因为()。
 A. 右心室扩大 B. 左心室扩大
 C. 左侧卧位 D. 瘦长体形者悬垂心
 E. 左肺不张、右侧胸腔积液
23. 心尖搏动减弱或消失的原因,下列错误的是()。
 A. 肥胖 B. 心包积液 C. 左侧肺气肿
 D. 左心室肥大 E. 左侧胸腔积液
24. 心腰部饱满,心浊音界呈梨形是由于()。
 A. 右心房大,主动脉球缩小
 B. 右心房大,肺动脉段缩小
 C. 左心房扩大,主动脉球缩小
 D. 左心房扩大,肺动脉段扩大
 E. 左心房扩大,主动脉球扩大
25. 产生第一心音的主要机理是()。
 A. 心室舒张期之初,二、三尖瓣的开放
 B. 心室舒张期之初,主、肺动脉瓣的关闭
 C. 心室收缩期之初,主、肺动脉瓣的开放
 D. 心室收缩期之初,二、三尖瓣的开放
 E. 心室收缩期之初,主、肺动脉根部的震动
26. ()标志心脏有器质性病变。
 A. 第四心音 B. 第二心音分裂
 C. 心前区触到震颤 D. 心率>100次/分
 E. 心尖区2/6级收缩期杂音
27. 不是周围血管征的是()。
 A. 奇脉 B. 枪击音
 C. 水冲脉 D. 毛细血管搏动
 E. 颈动脉搏动明显增强,节律性的点头运动
28. 正常情况下,肠鸣音的频率是()。
 A. 1~2次/分 B. 4~5次/分 C. 6~9次/分
 D. 10次/分以上 E. 1~2次/5~10分
29. 腹部检查移动性浊音阳性表示()。
 A. 肠梗阻 B. 微量腹水 C. 胃肠胀气
 D. 中等量腹水 E. 卵巢囊肿
30. 腹部有反跳痛提示()。
 A. 腹水 B. 肠胀气 C. 肠痉挛
 D. 内脏肿大 E. 腹膜壁层受炎症累及
31. 空腹检查时,上腹部有振水音时最大的可能是()。
 A. 腹水 B. 肠梗阻 C. 幽门梗阻
 D. 胸腔积液 E. 饥饿状态
32. 病理反射不包括()。
 A. 僵阵挛 B. 巴彬斯基征 C. 霍夫曼氏征
 D. 布鲁金斯基征 E. 奥本海姆氏征
33. ()是脑膜刺激征。
 A. 戈登征 B. 克尼格征 C. 腹壁反射
 D. 跟腱反射 E. 奥本海姆氏征
34. 做心电图检查时,黑色线应接()。
 A. 右上肢 B. 右下肢 C. 左上肢

- D. 左下肢 E. 心尖部
35. 在心电图纸上最小一格横向代表时间()。
A. 0.2 秒 B. 0.02 秒 C. 0.4 秒
D. 0.04 秒 E. 1 秒
36. 有一患者心电图 QRS 波呈“”该波命名为()。
A. Qr B. RS C. rS D. qR E. R
37. X 线不具有的特性是()。
A. 荧光作用 B. 感光作用 C. 肉眼可看见
D. 对人体有害 E. 有很强的穿透性
38. 成年女性血红蛋白的正常值是()。
A. 30 ~ 80 g/L B. 120 ~ 160 g/L C. 110 ~ 150 g/L
D. 170 ~ 200 g/L E. 110 ~ 120 g/L
39. 上消化道出血可见()。
A. 腹血便 B. 黄褐色大便 C. 米泔样大便
D. 柏油样黑便 E. 白陶土样大便
40. 判断深昏迷正确的是()。
A. 可以唤醒 B. 对任何刺激无反应
C. 回答问题答非所问 D. 神志恍惚但可回答问题
E. 唤不醒对疼痛刺激有反应
41. 慢性咳嗽伴随大量脓痰多见于()。
A. 上呼吸道感染 B. 支气管哮喘
C. 支气管肿瘤 D. 支气管扩张
E. 支气管内膜结核
42. 粉红色泡沫样痰多见于()。
A. 急性支气管炎 B. 急性肺水肿
C. 肺炎球菌肺炎 D. 支原体肺炎
E. 克雷白杆菌肺炎
43. 低热是指口腔温度()。
A. 低于 37.5℃ B. 37.5℃ ~ 38℃
C. 38.1℃ ~ 39℃ D. 39.1℃ ~ 41℃
E. 超过 41℃
44. 大量咯血是指日咯血量为()。
A. 100 ~ 200 mL B. 200 ~ 300 mL
C. 300 ~ 400 mL D. 400 ~ 500 mL
E. 500 mL 以上
45. 左室增大时心浊音界()。
A. 呈梨形 B. 呈烧瓶形 C. 向两侧扩大
D. 向左下扩大 E. 向左侧扩大
- (二) B 型题
- (1 ~ 5 题共用备选答案)
- A. 腋窝淋巴结肿大 B. 腹股沟淋巴结肿大
C. 颈部淋巴结肿大 D. 右锁骨上窝淋巴结肿大
E. 左锁骨上窝淋巴结肿大
1. 胃癌多转移到()。
2. 鼻咽癌多转移到()。
3. 宫颈癌多转移到()。
4. 乳腺癌多转移到()。
5. 肺部癌肿多转移到()。
- (三) X 型题
1. 可确诊为关节脱位的临床表现是()。
A. 疼痛 B. 肿胀 C. 瘢痕
D. 功能障碍 E. 关节盂空虚
2. 类风湿性关节炎的手部特征改变是()。
A. 平手 B. 垂腕 C. 爪形手
D. 杵状指 E. 梭形关节
3. 锥体束损害时可出现的体征是()。
A. 阵挛 B. 腱反射亢进
C. 霍夫曼氏征 D. 巴彬斯基氏征
E. 布鲁金斯基氏征
- 二、填空题
1. 在健康史采集时, 准备与计划阶段要做的准备是 _____、_____、_____、_____。
2. 护理评估资料来源的途径有 _____、_____。
3. 按马斯洛需要层次理论, 人的需要分为 _____、_____、_____、_____、_____。
4. 体格检查的基本方法 _____、_____、
_____、_____、_____。
5. 简要现病史包括的内容为 _____、_____、
_____、_____、_____。
6. 体形分为 _____、_____、
_____ 3 型。
7. 现病史内容包括 _____、_____、
_____、_____、_____。
8. 一般项目问诊的内容包括 _____、_____、
_____、_____、_____、_____、
_____、_____。
9. 生命体征包括 _____、_____、_____、
_____。
10. 体温的正常范围是口温 _____, 腋温 _____, 肛温 _____, 24 小时内体温波动范围不超过 _____。

- _____。
11. 正常成人的收缩压为_____，舒张压为_____，脉搏_____，呼吸_____。
12. 意识障碍分为_____、_____、_____、_____。
13. 营养状态分为_____、_____、_____。
14. 体位分为_____、_____、_____。
15. 局部淋巴结肿大的原因有哪些_____、_____、_____。
16. 甲状腺肿大分度：I 度_____，II 度_____，III 度_____。
17. 桶状胸常见于_____；鸡胸常见于_____。
18. 气胸叩诊为_____；大量胸腔积液叩诊为_____；肺气肿叩诊为_____。
19. 正常呼吸音有_____、_____、_____ 3 种。
20. 肺泡呼吸音听诊特点为_____；支气管呼吸音听诊特点为_____。
21. 肺部听到湿啰音提示_____。
22. 正常成人心尖搏动的位置在_____。
23. 左室肥大时心尖搏动向_____移位，右室肥大时心尖搏动向_____移位。
24. 二尖瓣听诊区位于_____，三尖瓣听诊区位于_____，主动脉瓣听诊区位于_____，胸主动脉瓣听诊区位于_____。
25. 正常成人心率_____次/分。
26. 心脏听诊的内容包括_____、_____、_____、_____、_____。
27. 腹膜刺激征包括_____、_____、_____。其提示_____。
28. 反跳痛提示_____。
29. 当触诊肿大的肝脏时，应注意肝脏的_____、_____、_____、_____。
30. 胆囊触痛征阳性提示_____。
31. 浅反射包括_____、_____、_____、_____。
- 深反射包括_____、_____、_____、_____。
32. 病理反射包括_____、_____、_____、_____、_____、_____。
33. 脑膜刺激征包括_____、_____、_____。
34. 过早搏动每分钟超过_____次称为频发早搏。
35. 临床咯血最常见的四大疾病是_____、_____、_____、_____。
36. 消化道出血，黑便提示出血量为_____，呕血提示出血量为_____。
37. 上消化道大出血的三大表现是_____、_____、_____。
38. 心电图 I 导联主波向上 III 导联主波向上，则电轴_____，I 导联主波向下 III 导联主波向上则电轴_____。
39. 如果一病人心电图 R-R 间距为 0.6 秒，则心率为_____次/分。
40. X 线照片检查是利用了 X 线的_____、_____特性。
41. 正常人血液中白细胞为_____，中性粒细胞_____，淋巴细胞_____。
42. 正常男性血液中红细胞为_____，血红蛋白_____。
43. 酚红排泄试验是检查_____功能。
44. 正常人血浆总蛋白为_____，白蛋白为_____，球蛋白为_____。
45. 心源性水肿最先开始的部位是_____；肾源性水肿最先开始的部位是_____。

三、判断题

1. 为减轻痛苦，病人所采取的体位为强迫体位。（ ）
2. 发现病人呼吸由浅慢逐渐变为深快，然后由深快变为浅慢至呼吸暂停，这种情况周而复始称库式呼吸。（ ）

四、解释

1. 主诉
2. 稽留热
3. 交替脉
4. 潮式呼吸
5. 被动体位
6. 二尖瓣面容
7. 紫癜

8. 脉搏短绌
9. 贫血面容
10. 巴彬斯基征阳性
11. 肝 - 颈静脉回流征阳性
12. 黄疸

五、简答题

- 试述第一心音与第二心音的区别。
- 简述功能性杂音和器质性杂音的区别
- 说出下列某女性(28岁)月经史各项数字代表的意义。

14岁 $\frac{3\sim5\text{天}}{28\sim30\text{天}}$ 2006.8.25

- 简述呕血与咯血的区别。

- 简述肺实变体征(按望、触、叩、听顺序)。
- 说出心房纤维颤动的听诊特点。

六、案例分析题

- 一病人体温40°，面颊潮红，兴奋不安，呼吸急促，痛苦呻吟，且有定向力消失，感觉错乱，乱语躁动，问：
 ①该病人是哪种面容？
 ②有无意识障碍，是哪一种？
- 按马斯洛人类需要层次理论，中国第一人造美女——郝璐璐整容手术成功，满足了她哪些层次的需要，简要说明。

(刘贵书)

呼吸系统疾病

一、选择题

(一) A₁型题

- 慢性支气管炎急性发作期最主要的治疗措施是()。
 A. 补液 B. 吸氧 C. 解痉平喘
 D. 祛痰止咳 E. 控制感染
- 慢性支气管炎最主要的致病菌是()。
 A. 奈瑟球菌 B. 肺炎球菌 C. 大肠杆菌
 D. 甲型链球菌 E. 金黄葡萄球菌
- 根据支气管哮喘病人居室环境要求，在室内()是允许的。
 A. 放置鲜花 B. 使用羽毛枕头

- C. 铺垫全毛地毯 D. 饲养猫狗等宠物
 E. 悬挂化纤布窗帘
- 在支气管哮喘发作与心源性哮喘发作的鉴别有困难时，可用治疗的药物为()。
 A. 吗啡 B. 氨茶碱 C. 地高辛
 D. 异丙肾上腺素 E. 溴化异丙阿托品
- 肺炎病人一般不出现()的护理诊断。
 A. 疼痛 B. 体温过高 C. 气体交换受损
 D. 心输出量减少 E. 清理呼吸道无效
- 肺炎球菌肺炎治疗的首选抗生素是()。
 A. 青霉素 B. 红霉素 C. 庆大霉素
 D. 螺旋霉素 E. 先锋霉素
- 慢性纤维空洞型肺结核大咯血抢救的首要措施是

- ()。
- 止血
 - 吸氧
 - 输血
 - 注射安定
 - 保持呼吸道通畅
8. 成人肺结核最常见的类型是()。
- 原发型肺结核
 - 浸润型肺结核
 - 结核性胸膜炎
 - 血性播散型肺结核
 - 慢性纤维空洞型肺结核
9. 诊断慢性支气管炎时,患病时间是()。
- 每年至少2个月,持续2年以上
 - 每年至少3个月,持续2年以上
 - 每年至少2个月,持续3年以上
 - 每年至少3个月,持续3年以上
 - 每年至少2个月,持续1年以上
10. 慢性肺源性心脏病首要的治疗措施是()。
- 改善呼吸
 - 积极控制感染
 - 控制心力衰竭
 - 控制呼吸衰竭
 - 纠正电解质紊乱
11. 护理支气管哮喘持续状态患者时,错误的是()。
- 半坐位
 - 专人护理
 - 禁用吗啡
 - 限制水分摄入
 - 持续低流量吸氧
12. 支气管扩张患者咳痰液为()。
- 黄色脓痰
 - 铁锈色痰
 - 白色泡沫痰
 - 无色泡沫痰
 - 大量脓痰,放置后可分层
13. 早期诊断肺结核,并能判断病变的性质、范围和部位的方法是()。
- X线
 - B超
 - 心电图
 - 痰液检查
 - 结核菌素试验
14. 肺结核病人痰液最简单的消毒方法是()。
- 用火焚烧
 - 酒精消毒
 - 来苏尔消毒
 - 紫外线照射
 - 消毒灵浸泡
15. 哮喘发作患者应进食()。
- 高蛋白、低盐饮食
 - 高脂肪、低盐饮食
 - 高蛋白、高脂肪饮食
 - 低蛋白、低脂肪饮食
 - 营养丰富、高纤维素清淡饮食
16. 大咯血患者应()。
- 多饮水
 - 暂禁食
 - 进食少量饮食
 - 多食含纤维素食物
 - 宜进食温或凉的流质
17. 支气管哮喘患者缓解期的护理,不正确的是()。
- 适当锻炼
 - 鼓励多饮水
 - 用哮喘菌苗
 - 室内空气新鲜
 - 定期服用抗生素控制感染
18. 慢性呼吸衰竭根据()进行分类。
- A. 病因 B. 起病缓急 C. 是否代偿
D. 有无二氧化碳潴留 E. 病理生理和临床特点
19. 对慢性呼吸衰竭失代偿性呼吸性酸中毒的处理原则,最重要的是()。
- 增加通气量
 - 治疗原发病
 - 积极控制感染
 - 持续低流量给氧
 - 补充碳酸氢钠纠正酸中毒
20. 肺炎球菌肺炎铁锈色痰出现在()。
- 水肿期
 - 充血期
 - 消散期
 - 红色肝变期
 - 灰色肝变期
21. 对早期结核的杀菌作用最强的药物是()。
- 异烟肼
 - 利福平
 - 链霉素
 - 吡嗪酰胺
 - 乙氨丁醇
22. 诊断早期肺心病的主要的依据是()。
- 肺气肿体征
 - 心悸气促症状
 - 右心衰竭体征
 - 肺动脉高压体征
 - 慢性支气管炎病史

(二) A₂型题

1. 患儿男性,10岁,常突然喷嚏、咳嗽、喘息,双肺满布哮鸣音,15~30分钟后自行缓解,最可能的诊断是()。
- 过敏性肺炎
 - 毛细支气管炎
 - 外源性支气管哮喘
 - 内源性支气管哮喘
 - 急性喘息性支气管炎
2. 在护理咯血患者,如观察病人表情恐怖,两手乱抓、抽搐、牙关紧闭、紫绀、烦躁不安,提示出现()。
- 气胸
 - 窒息
 - 休克
 - 意识障碍
 - 窒息先兆
3. 某肺心病患者近3日来呼吸困难加重,血气分析示 PaO₂ 52 mmHg,PaCO₂ 67 mmHg,此时给氧宜采用()。
- 间歇给氧
 - 高压给氧
 - 酒精湿化给氧
 - 低浓度持续给氧
 - 高浓度持续给氧
4. 患者男性,68岁,近日咳嗽、咳痰、气急明显,又出现神志不清,紫绀入院。既往有肺气肿病史。动脉血气分析 pH 7.31,PaO₂ 52 mmHg,PaCO₂ 61 mmHg,病人目前最可能出现的是()。
- 肺炎
 - 肺癌
 - 肺心病
 - 左心衰
 - 呼吸衰竭

(三) A₃型题

(1~2题共用题干)

患者男性,42岁,4年前呼吸道感染后出现咳嗽伴胸闷,此后反复发作,伴喘鸣,多于呼吸道感染后出现,缓解期正常。3天前发热,咳泡沫痰,昨日出现气急,呼吸30次/分,口唇微发绀,两肺叩诊过清音,可闻及哮鸣音,心率110次/分,律齐。

1. 其最可能的诊断是()。

- A. 外源性哮喘
- B. 内源性哮喘
- C. 心源性哮喘
- D. 喘息性支气管炎
- E. 慢性支气管炎,肺气肿继发感染

2. 此时测定肺功能,最可能的发现是()。

- A. 弥散功能障碍
- B. 限制性通气功能障碍
- C. 阻塞性通气功能障碍
- D. 混合性通气功能障碍
- E. 阻塞性通气功能障碍伴肺气肿

(3~5题共用题干)

患者男性,68岁,近日因咳嗽,咳黄色脓痰且不易咳出就诊,体温36.7℃,胸部听诊可闻及湿啰音,X线胸片示侧肺有絮状阴影。既往有慢支病史10年。

3. 该病人目前最主要的护理诊断是()。

- A. 体温过高
- B. 体液过多
- C. 气体交换受损
- D. 有感染的危险
- E. 清理呼吸道无效

4. 护士对该病人应采取的护理措施不包括()。

- A. 予以机械吸引
- B. 指导病人有效咳嗽
- C. 用超声雾化吸入湿化气道
- D. 咳嗽时可配合进行胸部叩击
- E. 督促病人每日饮水1500mL以上

5. 病人咳嗽时,护士应予以纠正的动作是()。

- A. 咳嗽前先深呼吸数次
- B. 排痰后用清水充分漱口
- C. 病人为省力每次连续轻咳数次
- D. 连续咳嗽数次是使痰到咽部附近,再用力咳出
- E. 病人取坐位,两腿上置一枕顶住腹部

(四)B型题

(1~4题共用备选答案)

- A. 黄色
- B. 草绿色
- C. 灰黑色
- D. 无色透明
- E. 红棕色胶冻状

1. 肺炎杆菌感染时病人的痰液常为()。

2. 尘肺病人的痰液常为()。

3. 化脓菌感染时病人的痰液常为()。

4. 绿脓杆菌感染时病人的痰液常为()。

(五)X型题

1. 休克性肺炎的主要表现有()。

- A. 血压下降
- B. 烦躁不安
- C. 面色苍白,出冷汗
- D. 体温不升,脉搏细速
- E. 白细胞计数可不高,中性粒细胞增高

2. 肺炎球菌肺炎典型的病理分期有()。

- A. 潜伏期
- B. 充血期
- C. 消散期
- D. 红色肝样变期
- E. 灰色肝样变期

3. 控制肺结核流行的重要措施是()。

- A. 将所有肺结核患者隔离
- B. 对未受感染者接种卡介苗
- C. 对接触肺结核的人进行预防服药
- D. 结核菌素试验阳性者均给抗痨治疗
- E. 主动发现活动性肺结核患者并彻底治疗

4. 呼吸衰竭的表现有()。

- A. 紫绀
- B. 呼吸困难
- C. 精神神经症状
- D. 早期血压升高,晚期血压下降
- E. 血液黏稠度增加,可诱发右心衰

二、填空题

1. 急性上呼吸道感染的主要病因是_____感染。

2. 慢性支气管炎主要的临床特点是_____、_____、_____、_____。

3. 感染与慢性支气管炎的发生、发展密切相关,最常见的细菌有_____、_____、_____、_____。

4. 支气管哮喘的主要症状是_____,主要的体征是_____。

5. 目前治疗支气管哮喘最有效的药物是_____。

6. 肺气肿主要的症状是_____。

7. 慢性肺源性心脏病最常见的病因是_____。

8. 慢性肺源性心脏病发病的主要病因是_____,最终导致_____。

9. 慢性肺源性心脏失代偿期的主要表现是_____、_____。

10. 肺炎球菌肺炎主要的症状是_____、_____、_____、_____,发病1~2天后痰液呈_____。

11. 休克性肺炎是指_____。

12. 支气管扩张症的主要表现是_____、_____、_____。

13. 肺结核主要的传染源是_____,传播途径是_____,为了加强易感人群的免疫力,可接种_____。

14. 结核杆菌侵入人体后_____周,机体组织才对结核杆菌发生变态反应。

15. 肺结核主要的全身症状是_____、_____、_____、_____，呼吸系统的症状有_____、_____、_____、_____。
16. 肺结核的临床类型有_____、_____、_____、_____、_____。
17. 原发综合征包括_____、_____、_____。
18. 原发病灶好发于_____。
19. 浸润性肺结核的病灶多位于_____。
20. _____是诊断肺结核的最可靠的依据。
21. 结核菌素试验的观察时间是_____。
22. 抗结核化学药物治疗的原则是_____、_____、_____、_____、_____。
23. 肺结核大咯血病人最重要的潜在护理诊断是_____。
24. 慢性呼吸衰竭可分为：I型呼吸衰竭，指_____；II型呼吸衰竭，指_____。
25. 呼吸衰竭的诊断标准是： $\text{PaO}_2 < \text{_____}$, $\text{PaCO}_2 > \text{_____}$ 。
26. I型呼吸衰竭患者的氧疗方法是_____；II型呼吸衰竭患者的氧疗方法是_____。
27. 呼吸衰竭最早出现的症状是_____。
28. 肺心病患者外周血中红细胞及血红蛋白常_____。
29. 导致肺心病患者死亡的首要原因是_____。
- ### 三、判断题
- 急性上呼吸道感染的病原体大多是细菌。()
 - 慢性支气管炎反复发作最终可导致慢性阻塞性肺气肿和慢性肺源性心脏病。()
 - 肺结核病人用过的餐具应煮沸1分钟后再洗涤。()
 - 肺心病首要的治疗措施是纠正心衰。()
 - 护理哮喘持续状态病人，应限制水、钠摄入。()
 - 肺心病的心衰以右心衰为主。()
 - 支气管哮喘的主要表现为吸气性呼吸困难。()
 - 典型肺炎球菌肺炎的痰液呈粉红色。()
 - 浸润性肺结核是临幊上最常见的类型，是最主要的传染源。()
 - 肺结核各类型鉴别的主要依据是胸部X线检查。()
 - 慢性支气管炎反复发作最终可导致支气管肺癌。()
 - 精神神经症状是慢性呼吸衰竭最早最突出的症状。()
 - 应鼓励呼吸系统病人进行耐寒锻炼和呼吸功能锻炼，以增强体质。()
 - 急性血行播散性肺结核在X胸片上表现为“三不均”，即大小不等、分布不均、密度不一致的粟粒阴影。()
 - 成人结核菌素试验(+)表明患者正在患结核病。()
 - 治疗肺炎球菌肺炎，若体温降至正常即可停药。()
 - 慢性呼吸衰竭患者应高浓度吸氧，以尽快纠正缺氧。()
 - 对肺炎剧烈胸痛患者，可在深吸气末用宽胶布固定患侧胸廓。()
 - 哮喘持续状态是指哮喘严重发作持续48小时仍不缓解者。()
 - 预防肺结核的重要措施是彻底治疗肺结核患者。()
 - 呼吸衰竭都有动脉血氧分压降低和二氧化碳分压升高。()
- ### 四、解释题
1. 休克性肺炎
 2. 原发综合征
 3. 慢性肺源性心脏病
 4. 呼吸衰竭
- ### 五、简答题
1. 列出慢性支气管炎的临床分型和分期。
 2. 对慢性支气管炎患者主要的两个护理诊断列出护理计划。
 3. 如何对慢性支气管炎病人进行健康教育？
 4. 列出支气管哮喘的主要护理诊断。
 5. 肺结核病人有哪些护理问题？