

脈訣指掌病式圖說
雲岐子七表八裏九道脈訣論并治法



雲岐子七表八裏九道脈訣論并治法

張璧撰

中華書局

叢書集成初編

脈訣指掌病式圖說（及其他一種）

中華書局出版發行

（北京王府井大街三十六號）

秦皇島市資料印刷廠印刷

一九九一年北京第一版

開本：七八七乘一〇九二毫米三十二分之二

統一書號：ISBN7-101-00894-1/K·367

雲岐子七表八裏九道脈訣論并治法

此據濟生拔萃方
本影印初編各叢
書僅有此本

雲岐子七表八裏隨證藥目錄

小柴胡湯

地骨皮散 紫熱

調中湯 腹脹

七聖散 瀉痢

加減桅鼓湯 吐乳上

豬苓湯 乳下

瀉黃湯 乳中

犀角地黄湯 血在上

抵當湯 血在下

加減桃仁承氣湯 血在中

加減大柴胡湯 實熱

大承氣湯 秘澀

半夏湯 留逆

小柴胡湯 加桂 表寒

附子四逆湯 下焦寒

養老半夏散 胃壅

涼膈散 實熱

太附湯 小便不禁

黃連瀉心湯 狂病

小承氣湯 狂語

芍藥湯 脾痛

桂枝芍藥湯 腹下痛

麻黃湯

發表

調中湯

蘇胃

澤瀉散

小便澀

已上屬上表

香薷湯

血崩

當歸芍藥湯

補血

補肺散

勞嗽

八物湯

沉吟

半夏丸

痰實

橘皮半夏湯

胃痛

枳木湯

中痞

羌活湯

風傷衛

七氣湯

脾濕

桂枝加乾薑湯

緩寒

龍骨丸

失精

桔梗湯

氣澀

五補丸

補中

木附湯

土勝

桂枝加附子湯

腰痛甚

五臟寬中散

腸痹

生薑棗湯

破腹

地骨皮散

渾身壯熱

加減小柴胡湯

常熱

人參黃耆湯代脉

八物湯

劑中無荆

解肌湯

主表

已上傷寒九道脉

雲岐子七表八裏隨證藥目錄

雲岐子七表八裏九道脈訣論并治法 目錄

四

雲岐子七表八裏九道脈訣論并治法濟生拔粹方卷四

七表脈變例論

七表脈者是客邪來傷也乃陰乘陽也其證若身熱惡寒是外陽而內陰見也七表脈但熱而不惡寒者是內外皆陽也

如七表證自汗惡風却得八裏脈者當用麻黃桂枝各半湯

如八裏證自汗惡風得七表脈亦用麻黃桂枝各半湯

如有汗不惡風者黃耆白朮黃芩湯

如無汗不惡風者葱豉湯

脈如浮滑而長爲三陽裏禁不可發汗經曰陽盛陰虛汗出而死仲景曰脈浮當汗二陽當汗者謂陽中有陰夫表者是陽分也脈浮亦陽分也浮脈客陰也故當發汗且陽中有陰者陽乃榮衛之分客陰自外入者之故宜耗出而發去之經

曰在上者因而越之此說非謂陽中有跡形之陰是陽中客邪之陰居其表也夫三陽之表是三陽標也無形經絡受客陰乃表之表也爲陽中陽分也宜發去客陰之邪故前說陽中有陰當汗若是三陽之裏是三陽本也主有形受邪膀胱與胃是也既受在有形之處唯宜利小便下大便則愈此乃陽中之陰也此說言主前說言客若不窮主客邪正之理必傷人命三陰當下者三陰者藏也外有所主內無所受所主者皮毛血脈肌肉筋骨也無所受者無所受盛也在三陰經絡中有邪者是爲無形乃陰中之陽可汗而已是經絡無形受客邪當發汗去之爲三陰標之病也三陰本者癥也癥則終歸于胃是有形病也當自各經絡中藥入胃下去之此乃三陰當下也是爲陰中之陰可下而愈此爲主之陰非是客

邪之陰也夫客主共論陰中有陽當去之者陰中者主也
有陽者客邪也言陰經中受陽邪染於有形物中不得出者
可下略說八裏乃陽乘陰也其證身涼四肢厥惡熱是外陰
而內陽也但寒不熱不渴者是內外皆陰也仲景云厥深熱
亦深厥微熱亦微口傷爛亦因發汗得之夫七表八裏發汗
吐下治傷寒必當子細論之七表八裏互相變乃壞證來
理脉中一說六脉交變浮滑長爲三陽乃陽中有陰沉濇短
爲三陰乃陰中有陽當審察表裏分其內外以辨虛實治從
標本萬舉萬當夫標本者太陽有標本之化少陰亦然太陽
標熱而本寒從此生七表少陰標寒而本熱從此生八裏太
陰標本皆陰少陽標本皆陽惟陽明與厥陰不從標本從乎
中也此舉六氣之標本也叔和所載者是七表八裏九道脉

計二十四道脈之標本也有皆從標從本從乎中假令太陽少陰各有標本之化太陽脈浮少陰脈沉此乃浮沉交內經曰若從標本論之是爲長短交長以發汗短以下長曰陽明短曰大陰長者陽明當解表利小便短者太陰當下土鬱則奪之下令無雍礙故長脈發之短脈下之者是滑與澀交滑居寸而熱瀦居尺而寒滑居尺而熱瀦居寸而寒瀦脈居尺寸皆損氣血滑居尺寸皆助陰陽內經曰滑脈曰生瀦脈曰死此是三陰二陽變化表裏略舉數端隨脈條下盡窮其理有不盡者於各部脈說內詳之

七表脈

一浮 一沉 二滑 四實 五弦 六緊 七洪

雲岐子云左寸三部寸關尺受非謂主位之脈皆客邪之脈也

浮者陽也指下尋之不足舉之有餘再尋之狀如太過曰浮主欬嗽氣促冷汗自出背膊勞強夜卧不安

按之不足舉之有餘陰不足陽太過寒則傷形熱則傷氣故

肺傷欬嗽氣促宜

柴胡 黃芩 五味子 製半夏 各半兩

白芍藥 人參 桑白皮 各則分半

右咬咀每服一兩水二盞生薑七片煎至七分去滓溫服食後

按之不足舉之餘再尋之指下浮者中積以寒者熱飲可生

精要補虛

藏中積冷按之不足榮中有熱舉之有餘陽有餘陰不足也

治之宜

人參 地骨皮 柴胡 黃耆 生地黃 各半兩

白茯苓

半兩知母

壹兩石膏

兩

右咬咀每服一兩水二盞生薑七片煎至七分去滓細溫服連夜頓服生精補虛地黃丸

寸浮中風頭熱痛

主脈浮客脈又浮客主同宮主太陽中風頭痛有汗脈浮緩桂枝湯無汗脈浮緊麻黃湯風在上焦如太陽頭痛汗出轉陽明頭痛白虎湯少陽頭痛小柴胡湯太陽頭痛羌活湯

關浮腹脹胃虛空

主脈弦客脈浮風寒熱相合致胃中虛寒何謂胃虛夫浮脈者風邪也弦者肝脈也以木能克土致胃中虛寒理中丸主之風在中焦子能令母實而變為寒也東垣去乾姜加厚朴陳皮是為龍膽散

製厚朴

陳皮去白製半夏各壹兩

白木壹兩半

人參

五升甘草炙叁升

右咬咀每服一兩水二盞生薑七片煎至七分去滓溫服食前
尺部見之風入肺大便乾澀故難通

腎脉沉反見浮脉爲風火所乘肺氣虛而不能生水浮脉行
於水中知水反不勝火浮主諸風之脉尺部見之是陰虛陽
盛之意也風入肺者何也是金水之虛水既衰弱金無所恃
是木火之實火助木而生風腎氣虛故風入肺肺燥使津液
內竭故大腸乾澀而燥內經曰侮所勝已乘所勝也火侮其
水而勝其金薄其子而囚其母治之以龍腦風在下焦

檳榔

木香

羌活

川芎

桂各半兩

太黃

郁里仁各壹兩

右爲細末蜜九桐子大每服三十九漸加之微利爲度生姜湯下

一乳者陽也指下尋之兩頭即有中間全無曰乳主淋瀝氣入小腸乳主失血弦浮無力手足太陽皆血多氣少故主病淋瀝氣入小腸脫血病者皆從太陽在寸則吐血在下瀉血在中者緩之

乳脈在上加減

乳子四个字

香豉半兩

先以水二升煮乳子仁至七分入豉煮三五沸去滓溫服得吐止

乳脈在中宜

藟葉 山梔子仁

甘草各半 防風參兩

石膏 壹兩

右咬咀水二盞煎一兩細細服無時

乳脉在下宜

猪苓

滑石

澤瀉

阿膠 炒各等分

右咬咀水二盞先用煎味煎至一盞去滓後入阿膠化開食

前溫服

指下尋之中且虛邪風透入小腸居患時淋瀝兼疼痛大作湯

九必自除

雲岐云乳主血凝而不流凡人之十二經絡以應溝渠是禁

衛血氣不散不能盈滿經絡故見乳脉主淋瀝小便濃及血

當大作湯丸也 四物湯地黃丸補之桃仁承氣湯瀉之一

云大柴胡湯如秘加大黃