


高级中学课本

代数

DAISHU

(暂用本)

第二分册



人民教育出版社

高级中学课本

代 数

(暂用本)

第二分册

北京市书刊出版业营业许可证出字第2号

人民教育出版社编辑出版(北京景山东街)

•

北 京 出 版 社 重 印

(北京东单座线胡同3号)

北京市书刊出版业营业许可证出字第096号

新 华 书 店 发 行

北京东单印刷厂印刷

•

统一书号: K 7012·800 字数: 99 千

开本: 787×1092 毫米 1/32 印张: $4\frac{3}{4}$

1963 年第一版

第一版 1965 年 6 月第四次印刷

北京: 41,401—61,400 册

•

定价: 0.32 元

目 录

第六章 排列、組合和二項式定理·····	1
I 排列、組合·····	1
II 二項式定理·····	15
第七章 复数·····	33
第八章 不等式·····	66
第九章 高次方程·····	120

本书即原高級中学課本代数第三冊.

第六章 排列、組合和二項式定理

I 排列、組合

63. 排列 从三个先进工作者張、王、李里面, 选出一个人当組长、一个人当副組长, 可以有下面的 6 种选法:

組 长: $\{張\} \{王\} \{李\}$
副組长: $\{王\} \{李\} \{張\}$

从三个不同的数字 4、7、9 里, 每次取出两个不同的数字排列起来, 可以得到下面的 6 个两位数:

47; 49; 74; 79; 94; 97.

从 m 个元素(人、数字或者其他)里, 每次取出 n 个元素, 按照一定的順序摆成一排, 叫做从 m 个元素里每次取出 n 个元素的排列.

在本书中, 只研究从 m 个各不相同的元素里每次取出 n 个 ($1 \leq n \leq m$) 各不相同的元素的排列, 以后所說的从 m 个元素里每次取出 n 个元素的排列, 都是指这样的排列. 例如, 从 3 个元素 a, b, c 里每次取出 2 个元素的排列, 就是指下面的 6 种排列:

$ab; ac; ba; bc; ca; cb.$

根据排列的定义可以知道: 如果两种排列里所含的元素不完全一样, 例如, ab 和 ac , 那末就是不同的排列; 如果所含的元素完全一样, 而排列的順序不同, 例如 ab 和 ba , 那末也是不同的

从 m 个元素里每次取出 n 个元素所有不同的排列的种数,

通常用符号 A_m^n 表示.*

現在我們來研究計算 A_m^n 的公式.

設有 m 个元素: $a, b, c, d, \dots, k, l$.

从这 m 个元素里每次取出 1 个元素所有的排列的种数, 很明显地是 m . 就是

$$A_m^1 = m.$$

要得出从 m 个元素里每次取出 2 个元素所有的排列, 我們可以先作出从 m 个元素里每次取出 1 个元素所有的排列, 然后在每一种这样的排列的后边, 都排上其余的 $m-1$ 个元素里的每个元素. 例如我們先取出 a , 再把 $b, c, d, \dots, k, l$ 逐一地排在它的后边; 然后取出 b , 再把 $a, c, d, \dots, k, l$ 逐一地排在它的后边; 等等. 这样就得:

$$\begin{array}{l} m \text{ 列} \left\{ \begin{array}{ll} ab, ac, ad, \dots, ak, al; & (m-1 \text{ 个排列}) \\ ba, bc, bd, \dots, bk, bl; & (m-1 \text{ 个排列}) \\ \dots\dots\dots & \\ la, lb, lc, \dots, lk. & (m-1 \text{ 个排列}) \end{array} \right. \end{array}$$

因为从 m 个元素里每次取出 1 个元素的排列一共有 m 种, 对于这样的每一种排列, 把其余的 $m-1$ 个元素逐一地排在它的后边, 都可以得出 $m-1$ 种从 m 个元素里每次取出 2 个元素的排列, 所以一共就可以得出 $m(m-1)$ 种从 m 个元素里每次取出 2 个元素的排列, 并且其中沒有两种是相同的. 就是

$$A_m^2 = m(m-1).$$

* A 是拉丁字 Arrangement 的第一个字母.

要得出从 m 个元素里每次取出 3 个元素所有的排列，我們可以先作出从这 m 个元素里每次取出 2 个元素所有的排列，然后在每一种这样的排列的后边，排上其余的 $m-2$ 个元素里的每一个元素。例如我們先取出 ab ，再把 $c, d, \dots, k, l$ 逐一地排在它的后边；然后取出 ac ，再把 $b, d, \dots, k, l$ 逐一地排在它的后边；等等。这样就得：

$$m(m-1) \text{ 列 } \left\{ \begin{array}{ll} abc, abd, \dots, abk, abl; & (m-2 \text{ 个排列}) \\ acb, acd, \dots, ack, acl; & (m-2 \text{ 个排列}) \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \\ lka, lkb, \dots\dots\dots & (m-2 \text{ 个排列}) \end{array} \right.$$

因为从 m 个元素里每次取出 2 个元素的排列一共有 $m(m-1)$ 种，对于这样的每一种排列，把其余的 $m-2$ 个元素逐一地排在它的后边，都可以得出 $m-2$ 种从 m 个元素里每次取出 3 个元素的排列，所以一共就可以得出 $m(m-1)(m-2)$ 种从 m 个元素里每次取出 3 个元素的排列，并且其中没有两种是相同的，就是

$$A_m^3 = m(m-1)(m-2).$$

同样我們可以求得：

$$A_m^4 = m(m-1)(m-2)(m-3),$$

$$A_m^5 = m(m-1)(m-2)(m-3)(m-4).$$

一般來說：

$$A_m^n = m(m-1)(m-2)\dots[m-(n-1)],$$

就是 $A_m^n = m(m-1)(m-2)\dots(m-n+1).$

这就是說，从 m 个元素里每次取出 n 个元素所有的排列的种数，等于 n 个連續自然数的积，其中最大的一个数是 m 。

从 m 个元素里每次取出 m 个元素的排列叫做全排列. m 个元素所有的全排列的种数, 通常用符号 P_m 表示.*

在上面的公式里, 設 $n=m$, 就得:

$$\begin{aligned} P_m &= A_m^m = m(m-1)(m-2)\cdots(m-m+1) \\ &= m(m-1)(m-2)\cdots\cdots 3\cdot 2\cdot 1. \end{aligned}$$

就是 $P_m = m(m-1)(m-2)\cdots\cdots 3\cdot 2\cdot 1$.

也就是 $P_m = 1\cdot 2\cdot 3\cdots\cdots (m-2)(m-1)m$.

这就是說, m 个元素所有的全排列的种数等于自然数 1 到 m 的积.

自然数 1 到 m 的积 $1\cdot 2\cdot 3\cdots\cdots (m-2)(m-1)m$ 通常用 $m!$ (或者 $\underline{m}$, 讀作“ m 的阶乘”)表示, 所以 m 个元素所有的全排列的种数的公式可以写成下面的形式:

$$P_m = m!.$$

例 1 求证: $A_{16}^8 = 2A_8^4$.

证 $A_{16}^8 = 16 \times 15 \times 14 = 2 \times 8 \times 3 \times 5 \times 2 \times 7$
 $= 2 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 = 2A_8^4$.

例 2 解方程: $A_{2n+1}^4 = 140 \cdot A_n^3$.

解 $A_{2n+1}^4 = 140 \cdot A_n^3$,

$$(2n+1)(2n)(2n-1)(2n-2) = 140n(n-1)(n-2),$$

$$4n(2n+1)(2n-1)(n-1) = 140n(n-1)(n-2).$$

因为 $n \geq 3$, 所以可以把方程的两边都除以 $4n(n-1)$, 得

$$(2n+1)(2n-1) = 35(n-2).$$

整理后, 得

* P 是拉丁字 Permutation 的第一个字母.

$$4n^2 - 35n + 69 = 0.$$

解这个二次方程,得

$$n_1 = 3; \quad n_2 = \frac{23}{4}.$$

因为 n 必须是正整数, 所以把 $n_2 = \frac{23}{4}$ 舍去.

$$\therefore \quad n = 3.$$

例3 用 1、2、3、4 四个数字可以組成多少个沒有重复数字的四位数?

解 很明显, 所求的四位数的个数等于 4 个元素的全排列的种数.

$$P_4 = 4! = 24.$$

答: 可以組成 24 个沒有重复数字的四位数.

例4 某人有 9 本不同的书, 把其中的 5 本排在书架上, 一共有多少种不同的排法?

解 很明显, 排法的种数等于从 9 个元素里每次取出 5 个元素所有的排列的种数.

$$A_9^5 = 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 = 15120.$$

答: 一共有 15120 种不同的排法.

例5 用 0 到 9 这 10 个数字可以組成多少个沒有重复数字的三位数?

解 从这 10 个数字里每次取出 3 个数字所有的排列, 除去其中第一个数字是 0 的, 都是所說的三位数. 因为从这 10 个数字里每次取出 3 个数字所有的排列的种数是 A_{10}^3 , 而其中第一个数字是 0 的排列的种数, 等于从 0 以外的 9 个数字里每次取出

2个数字所有的排列的种数, 就是 A_2^3 , 所以所求的三位数的个数是 $A_{10}^3 - A_2^3$.

$$A_{10}^3 - A_2^3 = 10 \times 9 \times 8 - 9 \times 8 = 648.$$

答: 可以組成 648 个沒有重复数字的三位数.

例 6 6个儿童站成一排, 其中某一个儿童不站在排头, 也不站在排尾, 一共有多少种站法?

解 6个儿童站成一排, 如果沒有限定什么条件, 那末可以有 P_6 种站法. 如果限定某一个儿童必須站在排头, 那末可以有 P_5 种站法; 同理, 如果限定这一个儿童必須站在排尾, 那末也有 P_5 种站法. 从 P_6 减去 $2P_5$ 就得出所求的站法的种数.

$$P_6 - 2P_5 = 6! - 2 \times 5! = (6-2) \times 5! = 4 \times 120 = 480.$$

答: 有 480 种站法.

64. 組合 从三位先进工作者張、王、李里面, 选出两位代表去北京参加會議, 代表团的組成可以有下列 3 种:

張、王; 張、李; 王、李.

从不在一条直綫上的三个点 A, B, C 里面, 每次取出两个点連結成一条直綫, 可以得到下面的三条直綫:

$AB; AC; BC.$

从 m 个元素里, 每次取出 n 个元素, 不管怎样的順序并成一组, 叫做从 m 个元素里每次取出 n 个元素的組合.

在本书中, 只研究从 m 个各不相同的元素里每次取出 n 个 ($1 \leq n \leq m$) 各不相同的元素的組合, 以后所說的从 m 个元素里每次取出 n 个元素的組合, 都是指这样的組合. 例如, 从 3 个元素 a, b, c 里每次取出 2 个元素的組合, 就是指下面的 3 种組合:

$ab; ac; bc.$

根据組合的定义可以知道：如果两种組合里所含的元素不完全一样，例如， ab 和 ac ，那末就是不同的組合；但是如果两种組合里所含的元素完全一样，只是排列的顺序不同，例如 ab 和 ba ，那末仍是相同的組合。

由此可知，組合和排列是不同的。排列和元素排成的顺序有关系，但是組合和这种顺序没有关系。例如， ab 和 ba 是两种不同的排列，但是它們只是一种組合。

从 m 个元素里每次取出 n 个元素所有不同的組合的种数，通常用符号 C_m^n 表示。*

現在我們来研究計算 C_m^n 的公式。

設有 m 个元素： $a, b, c, \dots, k, l$ 。

从这 m 个元素里每次取出 1 个元素所有的組合的种数，很明显地是 m ，这和从 m 个元素里每次取出 1 个元素所有的排列的种数是相等的。就是

$$C_m^1 = A_m^1.$$

現在我們来研究从 m 个元素里每次取出 2 个元素所有組合的种数。我們可以把它和从这 m 个元素里每次取出 2 个元素所有排列的种数相比較。我們已經知道，从 m 个元素里每次取出 2 个元素所有排列的种数是 A_m^2 。由于每 P_2 种 (2 种) 这样的排列 (例如 ab, ba)，都对应于一种組合 (ab)，所以，从这 m 个元素里每次取出 2 个元素所有排列的种数就等于从这 m 个元素

* C 是拉丁字 Combinaison 的第一个字母。

里每次取出 2 个元素所有組合的种数的 P_2 倍。就是

$$A_m^2 = C_m^2 \times P_2,$$

因此

$$C_m^2 = \frac{A_m^2}{P_2}.$$

再来研究从 m 个元素里每次取出 3 个元素所有組合的种数。把它和从这 m 个元素里每次取出 3 个元素所有排列的种数 A_m^3 相比較。由于每 P_3 种 (6 种) 这样的排列 (例如 $abc, acb, bac, bca, cab, cba$), 都对应于一种組合 (abc), 所以, 从这 m 个元素里每次取出 3 个元素所有排列的种数等于从这 m 个元素里每次取出 3 个元素所有組合的种数的 P_3 倍。就是

$$A_m^3 = C_m^3 \times P_3,$$

因此

$$C_m^3 = \frac{A_m^3}{P_3}.$$

同样我們可以求得:

$$C_m^4 = \frac{A_m^4}{P_4},$$

$$C_m^5 = \frac{A_m^5}{P_5}.$$

一般來說:

$$C_m^n = \frac{A_m^n}{P_n} = \frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-n+1)}{1\cdot 2\cdot 3\cdots n}.$$

这就是說, 从 m 个元素里每次取出 n 个元素所有組合的种数, 等于从 m 个元素里每次取出 n 个元素所有排列的种数除以 n 个元素的全排列数。

如果我們把上面公式里右边的分式的分子和分母都乘以 $1\cdot 2\cdot 3\cdots(m-n)$, 就得:

$$C_m^n = \frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-n+1)\cdot(m-n)\cdots 3\cdot 2\cdot 1}{1\cdot 2\cdot 3\cdots n\cdot 1\cdot 2\cdot 3\cdots(m-n)},$$

• 8 •

就是
$$C_m^n = \frac{m!}{n! (m-n)!}. \quad (1)$$

在这个公式里把 n 换成 $m-n$, 就得:

$$C_m^{m-n} = \frac{m!}{(m-n)! [m-(m-n)]!} = \frac{m!}{(m-n)! n!}. \quad (2)$$

把(1)和(2)加以比较, 可以得到:

$$C_m^n = C_m^{m-n}.$$

这就是说, 从 m 个元素里每次取出 n 个元素所有组合的种数, 等于从 m 个元素里每次取出 $m-n$ 个元素所有组合的种数.

这个公式也可以从组合的定义直接得出. 因为从 m 个元素里每次取出 n 个元素, 就剩下 $m-n$ 个元素, 两次取出的 n 个元素如果完全一样, 那末两次剩下的 $m-n$ 个元素也就完全一样, 所以从 m 个元素里取出 n 个元素的每一种组合, 都对应对着从 m 个元素里取出 $m-n$ 个元素的唯一的一种组合. 反过来也是一样. 因此, 从 m 个元素里每次取出 n 个元素所有组合的种数等于从 m 个元素里每次取出 $m-n$ 个元素所有组合的种数.

在 $n > \frac{m}{2}$ 的时候, 利用这个公式可以把计算 C_m^n 的过程化简.

例1 求 C_7^3, C_{100}^{97} .

解
$$C_7^3 = \frac{7 \times 6 \times 5}{1 \times 2 \times 3} = 35,$$

$$C_{100}^{97} = C_{100}^3 = \frac{100 \times 99 \times 98}{1 \times 2 \times 3} = 161700.$$

例2 求证: $C_m^n + C_m^{n-1} = C_{m+1}^n$.

$$\begin{aligned}
 \text{证 } C_m^n + C_m^{n-1} &= \frac{m!}{n!(m-n)!} + \frac{m!}{(n-1)![m-(n-1)]!} \\
 &= \frac{m![(m-n+1)+n]}{n!(m-n+1)!} = \frac{m!(m+1)}{n!(m-n+1)!} \\
 &= \frac{(m+1)!}{n![(m+1)-n]!} = C_{m+1}^n.
 \end{aligned}$$

例3 学校开运动会，一共有8个篮球队参加篮球比赛。如果每队都要和其他的队比赛一次，那末全校一共要比赛篮球多少次？

解 很明显，所求的比赛的次数就是从8个元素里每次取出2个元素所有组合的种数。

$$C_8^2 = \frac{8 \times 7}{1 \times 2} = 28.$$

答：一共要比赛篮球28次。

例4 平面内有12个点，没有3个点在一条直线上。以每3个点为顶点作三角形，一共可以作出多少个三角形？

解 很明显，所求的三角形的个数就是从12个元素里每次取出3个元素所有组合的种数。

$$C_{12}^3 = \frac{12 \times 11 \times 10}{1 \times 2 \times 3} = 220.$$

答：一共可以作出220个三角形。

例5 课外科学研究小组共有13个人，其中男同学8个人，女同学5个人。从这13个人里选出3个人准备报告，在选出的3个人里至少要有有一个女同学，一共有多少种选法？

解1 从这13个人里选出3个人，其中恰有1个女同学、恰有2个女同学、恰有3个女同学的选法分别有 $C_8^1 C_5^2$ 、 $C_8^2 C_5^1$ 、 C_5^3

种, 因此至少有一个女同学的选法有 $C_5^1 C_8^2 + C_5^2 C_8^1 + C_5^3$ 种.

$$C_5^1 C_8^2 + C_5^2 C_8^1 + C_5^3 = 5 \times 28 + 10 \times 8 + 10 = 230.$$

解 2 从 13 个人里选出 3 个人, 共有 C_{13}^3 种选法, 在这些选法里, 3 个人全是男同学的选法有 C_8^3 种, 因此至少有一个女同学的选法有 $C_{13}^3 - C_8^3$ 种.

$$C_{13}^3 - C_8^3 = 286 - 56 = 230.$$

答: 共有 230 种选法.

习 题 二 十

1. 写出:

(1) 从 4 个元素 a, b, c, d 里每次取出 2 个元素的所有排列;

(2) 从 4 个元素 a, b, c, d 里每次取出 3 个元素的所有排列.

2. 计算:

(1) A_{10}^4 ;

(2) $A_8^4 - 2A_8^3$;

(3) $\frac{A_{15}^9}{A_9^9}$;

(4) $\frac{A_9^5 + A_9^4}{A_{10}^8 - A_{10}^5}$.

3. 计算:

(1) P_8 ;

(2) $P_{10} - 9P_9 - 8P_8$;

(3) $\frac{P_{10}}{P_6 \cdot P_4}$;

(4) $\frac{A_7^5 - P_6}{6! + 5!}$.

4. 求证:

(1) $A_2^2 + A_3^2 + A_4^2 = A_5^2$;

(2) $P_{n+1} - P_n = n^2 P_{n-1}$;

(3) $A_m^n = \frac{m!}{(m-n)!}$;

(4) $A_m^n + n A_m^{n-1} = A_{m+1}^n$.

5. 解方程:

(1) $A_x^2 = 30$;

(2) $A_x^3 = xP_3$;

(3) $A_{2x}^3 = 10A_x^3$;

(4) $\frac{A_x^5 + A_x^4}{A_x^3} = 4$.

6. (1) 从多少个元素里每次取出 2 个元素所有排列的种数是 56?

(2) 已知从 n 个元素里每次取出 2 个元素所有排列的种数等于从 $(n-4)$ 个元素里每次取出 2 个元素所有排列的种数的 7 倍, 求 n .

7. 5 个人坐在一条长凳上, 有多少种坐法?

8. 从 40 本不同的书中取出三本, 送给三人, 每人一本, 有多少种方法?

9. (1) 由数字 1, 2, 3, 4, 5, 6 可以組成多少个沒有重复数字的五位数?

(2) 由数字 0, 1, 2, 3, 4, 5 可以組成多少个沒有重复数字的五位数?

(3) 由数字 1, 2, 3, 4, 5 可以組成多少个沒有重复数字的自然数?

(4) 由数字 1, 2, 3, 4, 5 可以組成多少个沒有重复数字并且比 13000 大的自然数?

10. 7 个人并坐照相:

(1) 如果某一人必須坐在中間, 有多少种坐法?

(2) 如果某两人必須坐在两端(左右不限), 有多少种坐法?

(3) 如果某一人不坐在中間, 也不坐在两端, 有多少种坐法?

11. (1) 求在由 2, 3, 4, 5 所組成的所有沒有重复数字的四位数里, 各个数字的和.

(2) 求由 2、3、4、5 所組成的所有沒有重复数字的四位数的和.

12. 写出:

(1) 从 4 个元素 a, b, c, d 里每次取出 2 个元素的所有組合;

(2) 从 4 个元素 a, b, c, d 里每次取出 3 个元素的所有組合;

并且和第 1 題的結果相比較.

13. 計算:

(1) C_{15}^3 ;

(2) C_{200}^{197} ;

(3) $C_7^3 - C_6^2$;

(4) $C_5^1 + C_5^2 + C_5^3 + C_5^4 + C_5^5$.

14. 求证:

(1) $C_6^3 = 2C_5^3$;

(2) $C_{10}^3 = 2A_5^3$;

(3) $C_m^{n+1} \div C_m^n = \frac{m-n}{n+1}$;

(4) $C_{m+1}^n = C_m^{n-1} + C_{m-1}^n + C_{m-1}^{n-1}$.

15. 解方程:

(1) $C_x^3 = A_x^2$;

(2) $11C_x^3 = 24C_{x+1}^2$;

(3) $C_{x+2}^x + C_x^{x-2} = C_6^3 + C_3^3$;

(4) $xC_x^{x-3} + A_x^3 = 4C_{x+1}^3$.

16. (1) 10 个人相遇, 每两个人握手一次, 一共握了几次?

(2) 每两个人握手一次, 一共握了 10 次, 有多少个人?

17. 某工作队有 12 个队员, 从这里面打算选出 5 个人去做一件工作, 一共有多少种选法?

18. 从 9 个字母 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, a_9$ 里面, 每次取出不同的 4 个相乘, 可以組成多少种不相恒等的积?

19. (1) 平面内有 8 个点, 沒有三个点在一条直线上, 过每两个点作一条直綫, 一共可以作出多少条直綫?

(2) 空間有 10 个点, 沒有四个点在一个平面內, 过每三个

点作一个平面，一共可以作出多少个平面？

20. 求下列凸多边形的对角线的数目：

(1) 五边形； (2) n 边形。

21. 平面内有 10 个点，其中有某三个点在一条直线上，此外没有三个点在一条直线上。过这 10 个点里的每两个点可以连多少条直线？

22. 8 个学生参加学校里举办的象棋比赛，每个学生应当和其他的学生每人比赛 3 次，那末一共比赛多少次？

23. 从 $m+1$ 个元素 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_m, a_{m+1}$ 里面，每次取出 n 个元素 ($1 \leq n \leq m$)：

(1) 可以组成多少个组合？

(2) 在这些组合里，有多少个是不含有 a_1 的？

(3) 在这些组合里，有多少个是含有 a_1 的？

(4) 从上面的结果，可以得出一个怎样的公式？

24. 从全班 52 个人当中挑出 5 个人参加某种课外活动：

(1) 如果班长和副班长必须在内，有多少种挑法？

(2) 如果班长和副班长必须有一个人并且只能有一个人在内，有多少种挑法？

(3) 如果班长和副班长都不在内，有多少种挑法？

(4) 如果班长和副班长至少有一个人在内，有多少种挑法？

25. 有 6 件东西，从它们中间取出一件、两件、三件、四件、五件或者六件，一共有多少种取法？

26. 设有 m 个字母 $a, b, c, \dots, k, l$ ：

(1) 每次取出两个相加，可以得到多少个不相恒等的和？

(2) 每次取出两个相减，可以得到多少个不相恒等的差？

27. 由 2、3、5、7、11 里面，每次取出两个数，分别做为一个分数的分子和分母，一共可以组成多少个分数？其中有多少个