

国家执业医师资格考试丛书

最新

国家执业医师资格考试

2003 临床助理医师考试 全真模拟及精解

(第二版)

《临床助理医师考试全真模拟及精解》专家组 编

◎ 以国家临床执业助理医师资格考试大纲为依据

◎ 内容涵盖资格考试的主要考点

◎ 专家出题 全真模拟

◎ 考前冲刺 实战训练



北京大学医学出版社

1 [A] [B] [C] [D] [E]
2 [A] [B] [C] [D] [E]
3 [A] [B] [C] [D] [E]
4 [A] [B] [C] [D] [E]
[A] [B] [C] [D] [E]
[A] [B] [C] [D] [E]
[A] [B] [C] [D] [E]
[A] [B] [C] [D] [E]

国家执业医师资格考试

临床助理医师考试全真模拟及精解

(第二版)

《临床助理医师考试全真模拟及精解》专家组 编

北京大学医学出版社

LINCHUANG ZHULI YISHI KAOSHI QUANZHEN MONI JI JINGJIE

图书在版编目 (CIP) 数据

临床助理医师考试全真模拟及精解/《临床助理医师考试全真模拟及精解》专家组编.—2版.—北京:北京大学医学出版社,2003

国家执业助理医师考试辅导教材

ISBN 7-81071-427-9

I. 临… II. 临… III. 临床医学—医师—资格考核—解题 IV. R4—44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 010749 号

从 2003 年 3 月第 1 次印刷起,封面无防伪标不准销售

北京大学医学出版社出版发行

(100083 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内 电话:010-62092230)

责任编辑:冯智勇

责任校对:王怀玲

责任印制:郭桂兰

莱芜市圣龙印务书刊有限责任公司印刷 新华书店经销

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:13.5 字数:330 千字

2003 年 3 月第 1 版 2003 年 3 月第 1 次印刷 印数:1—10000 册

定价:25.00 元

版权所有 不得翻印

第二版前言

出版这套丛书的动机源自执业医师（助理医师）资格考试后的座谈会，与会的考生及有关人士一致认为执业医师资格考试是成功的，试题内容涉及作为合格医师必须掌握的基本理论、基本技能和相应的法规知识，对提高我国医师队伍的总体素质将起到积极的作用。但也有不少考生反映医学课程门类多，内容广泛，虽然经过较长时间的复习，临考前仍感到“心中无底，思路不清”；还有些考生对题意理解偏差而未能答对，尤其工作了多年的考生，对现行的试题题型不熟悉。基于此，为了帮助考生复习，增强应考信心；为了帮助考生熟悉试题题型，避免无谓的失误；为了帮助考生熟悉考试过程和自我测试，加强临考前的“冲刺”练习；我们组编了这套试题精解及全真模拟丛书，包括临床、口腔、公卫医师及助理医师共6册，与医师资格考试的门类相一致。正式出版以来，深受广大考生的欢迎，予以好评。

国家医师资格考试委员会于2001年12月组织有关专家，对《国家执业医师（助理医师）资格考试大纲》进行了全面的修订，为了适应新《大纲》的要求，满足广大考生的需要，我们组织相关专家对这套丛书进行了相应的更新与修订，以使本套丛书与当前的考试大纲、考试内容、考试形式相一致，达到全真模拟的效果。

每本书的主要内容：①国家执业医师资格考试试题题型介绍与答题技巧；②三套全真模拟国家执业医师（助理医师）资格考试试卷，按照以往考试的试卷，在试题所侧重的知识点、各学科试题在试卷中的比重、各类题型的比例以及考试的时间要求等方面进行了全真模拟。

祝愿本书读者顺利通过国家执业医师资格考试！

编 者

目 录

考试题型介绍与答题技巧	(1)
临床执业助理医师全真模拟试卷 (一)	(4)
第一单元	(4)
第二单元	(22)
答题卡	(41)
试卷 (一) 答案及试题分析	(45)
第一单元	(45)
第二单元	(59)
临床执业助理医师全真模拟试卷 (二)	(73)
第一单元	(73)
第二单元	(91)
答题卡	(109)
试卷 (二) 答案及试题分析	(113)
第一单元	(113)
第二单元	(127)
临床执业助理医师全真模拟试卷 (三)	(141)
第一单元	(141)
第二单元	(159)
答题卡	(177)
试卷 (三) 答案及试题分析	(181)
第一单元	(181)
第二单元	(195)

考试题型介绍与答题技巧

国家医师资格考试采用的题型有 A 型题和 B 型题。A 型题中，A1、A2、A3、A4 型题均出现了；B 型题中只出现了 B1 型题。现分别介绍如下（所列例题均选自历届临床助理医师资格考试试卷）：

一、A1 型题

A 型题属于最佳选择题类型。A1 型题为单个最佳选择题，每道题由 1 个题干和 5 个备选答案组成（见例题 1）。要求应考者找出 1 个符合题干要求的最佳或恰当的答案，此为正确答案，其余 4 个则为干扰答案。5 个备选答案之间往往具有比较意义，干扰答案或是完全不符合题干要求，也可以是部分符合题干要求，因此答题时应审慎选择，以排除似乎有理而实际是不合适的答案。有时在备选答案中出现“以上都不是”（见例题 2），这有两种情况：①“以上都不是”作为正确答案，其他 4 个答案均是干扰答案，而且是绝对不符合题干要求的，真正的正确答案没有出现；②5 个备选答案中已含有正确答案，而“以上都不是”只是 1 个干扰答案而已，答题者应慎之！A1 型题中还有一种否定型形式，试题有多个正确答案或涉及不止 1 个相关问题时常采用否定型形式（见例题 3）。题干中有 1 个特别标注的（用黑体或加着重号标注）否定词（不、不是、不能、除外、错误、无关等），要求应试者在 5 个备选答案中选出符合题干要求的答案，而答案的内容与题干的主旨陈述是相悖的，或者是最不合适的，或者是例外的，或者是用得最少的。

例题 1 去甲肾上腺素对心血管的作用主要是

- A. 舒张血管
- B. 升高血压
- C. 心率加快
- D. 强心
- E. 增大脉压

正确答案：B

例题 2 患者从事每天日常活动即出现心悸、气短症状，休息后即缓解。其心功能分级应为

- A. 心功能 I 级

- B. 心功能 II 级
- C. 心功能 III 级
- D. 心功能 IV 级
- E. 以上都不是

正确答案：B

例题 3 有关胸内压的叙述，错误的是

- A. 一般情况下是负压
- B. 胸内压 = 肺内压 - 肺回缩力
- C. 胸内压有利于静脉回流
- D. 使肺维持一定的扩张程度
- E. 产生气胸时负压增大

正确答案：E

二、A2 型题

A2 型题是病历摘要型最佳选择题，多用于考查临床学科的知识与技能（见例题 4），但基础医学与其他学科也常采用（见例题 5）。试题由一个叙述性的简要病历（或其他主体）

作为题干和 5 个备选答案组成。也有否定型和“以上都不是”型。

例题 4 一位亚急性细菌性心内膜炎患者，下床活动后出现意识逐渐模糊至昏迷，并有右侧偏瘫。其最可能的原因为

- A. 肺动脉栓塞
- B. 脑动脉栓塞
- C. 冠状动脉栓塞
- D. 右上、下肢动脉栓塞
- E. 右上、下肢静脉栓塞

正确答案：B

受检者屈曲的肘部，并用左前臂托住受检者的前臂，将左手拇指按在受检者肘窝部肌腱上，然后右手持叩诊锤叩击检查者的左拇指，正常反应为肘关节快速屈曲，此反射为

- A. 腓肠肌反射
- B. 肘反射
- C. 肌腱反射
- D. 肱三头肌反射
- E. 肱二头肌反射

正确答案：E

例题 5 受检者端坐位，检查者用左手托住

三、A3/A4 型题

A3 型题为病历组型最佳选择题。此类题的结构是先叙述一个临床病例，然后在病例下提出若干道考题，每道考题均与病例有关，但测试点不同，各考题之间相互独立（见例题 6）。每道考题备有 5 个备选答案，要求选择 1 个最佳的答案，其余的答案可以是错误的，也可以是部分正确的，但只能有 1 个最佳的答案。此类型也有否定型形式。A3 型题多用来考查临床学科的知识技能，但也有可能在此类试题中提出某个问题来考查基础医学或其他学科的知识技能。

A4 型题为病历串型最佳选择题，试题的结构类似 A3 型题，也是先叙述 1 个临床病例，然后提出若干个相关的问题，与 A3 型题不同的是当病情逐渐展开时，可逐步增加新的信息（见例题 7）。每个问题均与开始叙述的临床病例有关，又与随后增加的信息有关，所以回答这样的试题一定要仔细考虑两者的要求。A4 型题中的每个问题也有 5 个备选答案，要求找出 1 个最佳的答案，其余的备选答案可以是部分正确，也可以是错误的。A4 型题也有否定型形式，否定词下常用着重号标出以提醒应试者。

例题 6 (1~2 题共用题干)

女性，24 岁，近日发现左膝关节疼痛，行走困难，休息缓解，自觉左小腿上内侧似有肿块，压痛。查体：左膝关节活动稍受限，胫骨上端内侧肿胀，压痛。X 线片可见左胫骨上端内侧有一肥皂泡样阴影，膨胀性生长。

1. 本例最可能的诊断是

- A. 骨结核
- B. 骨髓炎
- C. 骨坏死

D. 骨巨细胞瘤

E. 骨软骨瘤

2. 本例适当的治疗方法是

- A. 休息、营养
- B. 广谱抗生素治疗
- C. 手术治疗
- D. 抗结核治疗
- E. 物理治疗

正确答案：1.D；2.C

例题 7 (1~5 题共用题干)

某矿工, 男性, 40 岁, 因塌方事故时被泥土、矿石压埋致伤。当时不能站立, 腰部疼痛无力, 双下肢不能自主活动, 双腹股沟以下感觉消失, 急送医院。

1. 正确的搬运方法是

- A. 搂抱
- B. 一人背
- C. 一人抬头, 一人抬足
- D. 三人用手平直托起, 保持躯干平直
- E. 两人抬上肢, 两人抬下肢

2. 到医院检查, 发现病人腰背有后突畸形, 应首先考虑的诊断是

- A. 胸腰段棘突骨折
- B. 胸腰段横突骨折
- C. 胸腰段椎体骨折
- D. 肋骨骨折
- E. 局部血肿

3. 此时首选的检查方法为

- A. CT 检查

- B. MRI 检查
- C. X 线片检查
- D. 肌电图检查
- E. 核素检查

4. 假设患者经一周卧床观察后双下肢瘫痪明显恢复, 应考虑

- A. 脊髓震荡
- B. 脊髓受压
- C. 脊髓横断
- D. 马尾神经损伤
- E. 神经根损伤

5. 假设 X 线片显示椎体单纯压缩性骨折, 压缩不到 1/3, 其首选治疗方法是

- A. 仰卧于木板床上
- B. 两桌法过牵复位
- C. 手术脊椎融合
- D. 手术内固定
- E. 石膏背心外固定

正确答案: 1.D; 2.C; 3.C; 4.A; 5.A。

四、B1 型题

B 型题为配伍题。B1 型题是标准配伍题, 试题的形式为开始是 5 个备选答案, 其后提出至少 2 道试题, 要求应试者为每一道试题从备选答案中选出与其关系最密切的答案 (见例题 8), 每个备选答案可以被选用 1 次、多次或不被选用。

例题 8 (1~3 题共用备选答案)

- A. 腹股沟斜疝
- B. 腹股沟直疝
- C. 股疝
- D. 脐疝
- E. 切口疝

1. 多见于老年人的是

2. 多见于中年女性的是

3. 多见于儿童及青壮年的是

正确答案: 1.B; 2.C; 3.A

临床执业助理医师全真模拟试卷（一）

第一单元

第一节

A1型选择题（1~41题）

答题说明

每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 关于新生儿硬肿症，下列哪项错误
A. 生后一周内的新生儿多见
B. 多发生于夏季
C. 先发生于小腿、大腿外侧
D. 常并发肺炎、败血症
E. 临终前常发生 DIC
2. 符合萎缩的描述正确的是
A. 萎缩器官实质细胞数减少或体积缩小
B. 萎缩器官的间质细胞减少
C. 萎缩器官功能正常
D. 萎缩器官的细胞量无明显变化
E. 萎缩属不可复性改变
3. 子宫峡部的特点是
A. 非孕期长约 2cm
B. 孕晚期伸展达 6cm
C. 上端为解剖学内口，下端为组织学内口
D. 解剖学内口为子宫内膜转化为宫颈内膜处
4. 手术后的体位以下哪项是错误的
A. 全麻未清醒前去枕平卧头偏向一侧
B. 腰麻术后去枕平卧 6 小时
C. 胸腹术后血压平稳后取半卧位
D. 臂部手术后需取半卧位
E. 四肢手术后抬高患肢
5. 关于休克型肺炎的治疗，下列哪项是不正确的
A. 抗休克治疗
B. 控制感染
C. 慎用糖皮质激素
D. 防止心肾功能不全
E. 支持疗法和监护
6. 婴幼儿每日维生素 D 的需要量为
A. 400 ~ 800IU

- B. 800 ~ 1000IU
C. 1000 ~ 5000IU
D. 5000 ~ 1 万 IU
E. 1 万 IU 以上
7. 早期妊娠最常见的临床表现是
A. 乳房增大
B. 尿频
C. 子宫增大
D. 停经
E. 频繁呕吐
8. 原发性肝癌最常见的主要体征是
A. 黄疸
B. 腹胀
C. 肝区疼痛
D. 肝不规则肿大
E. 移动性浊音
9. 神经系统实现其调节功能的基本方式是
A. 兴奋和抑制
B. 感受和处理信息
C. 记忆与思维
D. 条件反射与非条件反射
E. 正反馈与负反馈
10. 关于 DNA 的二级结构（双螺旋结构），正确的是
A. 两条同向的多核苷酸链
B. 两条反向的多核苷酸链
C. 腺嘌呤和鸟嘌呤配对
D. 碱基之间以共价键连接
E. 磷酸骨干在双螺旋之中
11. 右心功能不全的体征不包括
A. 右心室增大，心浊音界向左、右两侧扩大
B. 颈静脉充盈
C. 心尖部舒张期奔马律
D. 肝脏肿大
E. 肝颈静脉回流征阳性
12. 产生药物副作用是由于
A. 剂量过大
B. 用药时间过久
C. 药物在体内蓄积
D. 药物作用的选择性低
E. 机体对药物的敏感性高
13. 肝昏迷病人前驱期（I 期）最早的表现是
A. 扑翼样震颤
B. 性格改变
C. 脑电图异常
D. 定向力理解力障碍
E. 锥体束征阳性
14. 关于小儿静脉补钾浓度，哪项正确
A. 1%
B. 3%
C. 5%
D. 10%
E. 0.1% ~ 0.3%
15. 弥散性血管内凝血，下述哪项实验室检查不正确
A. 出血时间延长
B. 凝血时间延长
C. 血小板计数正常
D. 血块收缩不佳
E. 束臂试验阳性
16. 血胸的治疗下列哪项是错误的
A. 不足 500ml 的血胸不需特殊处理
B. 胸腔积血较多者应及早胸腔穿刺或闭式引流
C. 胸腔穿刺抽血每次一般不超过 1000ml
D. 凝固性血胸应在数日内剖胸清除积血和血块
E. 机化性血胸一般应在伤后 3 个月以后

行手术治疗

17. 构成医疗事故的要件之一是
- A. 直接故意
 - B. 间接故意
 - C. 过失
 - D. 意外事件
 - E. 紧急避险
18. 以下哪项不是肾小管性蛋白尿的常见病
- A. 间质性肾炎
 - B. 急性肾盂肾炎
 - C. 肾小球肾炎
 - D. 药物中毒
 - E. 重金属中毒
19. 产后心脏负担最重的时期是
- A. 产后 72 小时内
 - B. 产后饱餐后
 - C. 产后因口渴, 饮大量流食可加重心脏负担
 - D. 产后大量水钠排泄可加重心脏负担
 - E. 子宫收缩增加回心血量加重心脏负担
20. 关于标准差, 下面哪个说法是正确的
- A. 标准差可以是负数
 - B. 标准差必定大于或等于零
 - C. 标准差无单位
 - D. 同一资料的标准差一定比均数小
 - E. 同一资料的标准差一定比均数大
21. 急性心梗的常见先兆症状是
- A. 心悸
 - B. 气短
 - C. 心绞痛
 - D. 烦躁
 - E. 乏力
22. 新生儿缺氧缺血性脑病主要原因是
- A. 围产期窒息
 - B. 新生儿败血症
 - C. 新生儿肺炎
 - D. 新生儿硬肿症
 - E. 新生儿黄疸
23. 引起垂体前叶功能减退的最常见原因是
- A. 产前产后大出血
 - B. 感染
 - C. 垂体手术
 - D. 颅内动脉血栓
 - E. 脑动脉硬化
24. 下列哪项是骨折的晚期并发症
- A. 血管损伤
 - B. 神经损伤
 - C. 骨筋膜室综合征
 - D. 创伤性关节炎
 - E. 脂肪栓塞
25. 与血栓形成关系密切的疾病是
- A. 感冒
 - B. 冠状动脉粥样硬化
 - C. 风湿性心包炎
 - D. 大叶性肺炎
 - E. 急性普通型肝炎
26. 关于上尿路结石治疗中不正确的是
- A. 结石直径大于 0.4cm, 均不能采用非手术治疗
 - B. 应大量饮水, 适当活动
 - C. 应根据结石性质调整尿液 pH 值
 - D. 有感染时同时抗感染治疗
 - E. 体外震波碎石, 使碎石随尿液排出或内窥镜取出
27. 人体内 O_2 、 CO_2 进出细胞膜是通过
- A. 单纯扩散
 - B. 易化扩散
 - C. 主动转运
 - D. 入胞作用

- E. 出胞作用
28. 脑出血最常见的部位是
- A. 丘脑
 - B. 内囊
 - C. 中脑
 - D. 小脑
 - E. 脑桥
29. 施行麻醉前的禁食时间
- A. 4 小时
 - B. 6 小时
 - C. 12 小时
 - D. 18 小时
 - E. 24 小时
30. 关于系统性红斑狼疮, 错误的是
- A. 先累及一个系统, 以后扩展至各系统
 - B. 过敏性疾病
 - C. 青年多见
 - D. 女性多见
 - E. 男女之比为 1: (7~10)
31. 心力衰竭细胞是指肺淤血时
- A. 肺泡吞噬粉尘的巨噬细胞
 - B. 肺泡内增生脱落肺泡上皮
 - C. 血管内皮细胞
 - D. 肺泡内吞噬含铁血黄素巨噬细胞
 - E. 肺泡内巨噬细胞
32. 心功能分级是根据
- A. 胜任一般活动所持续的时间
 - B. 对体力活动的耐受性
 - C. 出现症状的轻重
 - D. 活动后心电图的改变
 - E. 活动后心率、血压的变化
33. 下列哪项不是成分血制品
- A. 红细胞悬液
 - B. 新鲜冰冻血浆
 - C. 浓缩血小板
 - D. 免疫球蛋白
 - E. 右旋糖酐
34. 关于胸腔漏出液的描述, 下列不正确的是
- A. 外观无色透明或淡黄色
 - B. 比重 < 1.018
 - C. 粘蛋白定性试验阳性
 - D. 蛋白定量 < 20~30g/L
 - E. 细胞数常 < $100 \times 10^6/L$, 以淋巴细胞和间皮细胞为主
35. 下列关于血液组成的叙述, 错误的是
- A. 血液由血浆和血细胞组成
 - B. 血浆中水分的含量约占 90%
 - C. 血浆中电解质含量与组织液基本相同
 - D. 血浆中蛋白质浓度高于组织液
 - E. 与抗凝剂混匀的血液待血细胞沉降后, 上面的液体部分称为血清
36. 贫血概念是指单位容积外周血液中
- A. 血红蛋白、红细胞数低于正常
 - B. 红细胞压积、血红蛋白低于正常
 - C. 血红蛋白、红细胞数、红细胞压积低于正常
 - D. 红细胞数低于正常
 - E. 红细胞压积低于正常
37. 早期发现直肠癌最重要的检查方法是
- A. 直肠指检
 - B. 内窥镜检查
 - C. X 线钡剂灌肠
 - D. 便常规检查
 - E. CEA 测定
38. 不属于甲亢临床表现的有
- A. 月经过多
 - B. 窦速
 - C. 怕热多汗

- D. 腹泻
- E. 突眼

39. 卵巢肿瘤并发症哪项错误

- A. 卵巢肿瘤蒂扭转
- B. 卵巢肿瘤破裂
- C. 卵巢肿瘤并发感染
- D. 卵巢良性肿瘤恶性变
- E. 卵巢肿瘤嵌顿

40. 认识活动的最基本的心理过程是

- A. 感觉

- B. 思维
- C. 情感
- D. 知觉
- E. 意志

41. 新斯的明最强的作用是

- A. 兴奋胃肠道平滑肌
- B. 兴奋膀胱平滑肌
- C. 兴奋骨骼肌
- D. 缩小瞳孔
- E. 增加腺体分泌

A2 型选择题 (42 ~ 57 题)

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

42. 男性儿童,10 岁,身高 1m,智力低下。

应考虑为哪一种内分泌激素分泌障碍

- A. 生长激素
- B. 甲状腺激素
- C. 肾上腺皮质激素
- D. 胰岛素
- E. 性激素

43. 1 岁男孩,持续高热 5 天,伴咳嗽,喘

憋,精神差,嗜睡,发病 4 天后肺部可闻中小水泡音,血象 WBC $7 \times 10^9/L$,中性粒细胞 40%,淋巴细胞 60%。肺部 X 线片示:左肺大片密度增高影。可能的诊断为

- A. 衣原体肺炎
- B. 金黄色葡萄球菌肺炎
- C. 腺病毒肺炎
- D. 合胞病毒肺炎
- E. 支原体肺炎

44. 患者,男性,32 岁,被开水烫伤,伤及

双手和右臂部,左手自腕以远属 II 度烧伤,右手自腕以远为 II 度烧伤,右臂部为 I 度烧伤,则该患者烧伤面积为

- A. 9%
- B. 7%
- C. 5%
- D. 3%
- E. 1%

45. 女性,31 岁,因月经量多及不孕就诊,经检查为子宫肌瘤,单个肿瘤,子宫如孕 3 个月大小、活动。首选治疗是

- A. 服中药消瘤观察
- B. 子宫全切术
- C. 子宫次全切术
- D. 子宫肌瘤剔除术
- E. 次广泛子宫切除术

46. 患儿 2 岁,发热、咳嗽、喘 3 天入院。

入院当天患儿剧烈哭闹后突然喘憋加重,烦躁,紫绀,心率 164 次/分,右肺

叩诊鼓音，听诊呼吸音减低，胸片示纵隔向左移位。最可能的诊断为

- A. 肺炎合并脓胸
- B. 肺炎合并气胸
- C. 肺炎合并心衰
- D. 肺气肿
- E. 重症肺炎

47. 男性，60岁，慢性咳嗽、咳痰12年，气急3年，呈逐渐加重。胸片示肋间隙增宽，双肺透亮度增加，两下肺纹理紊乱。最可能的诊断是

- A. 支气管扩张
- B. 慢性支气管炎
- C. 慢性支气管炎、肺气肿
- D. 机化性肺炎
- E. 支气管哮喘

48. 女性，45岁，发现子宫肿大近一年，逐渐增大。手术见子宫壁有一圆形肿物，大小约10cm×9cm，界清，无明显包膜，切面呈浅灰白色，编织样，无出血坏死，组织学显示肿瘤细胞相似于正常平滑肌。送病理检查诊断此病为良性平滑肌瘤。下列各项中哪条是主要诊断根据

- A. 肿瘤细胞似平滑肌
- B. 肿瘤细胞为纤维及平滑肌组织
- C. 肿瘤细胞似正常平滑肌无明显异型性，核分裂像很少
- D. 无出血坏死，似平滑肌组织
- E. 无明显浸润，无转移

49. 女性，30岁，常感低热、乏力，近一周明显腹痛、腹胀，大便不规律。查体：心肺阴性，腹膨隆，移动性浊音阳性。实验室检查血沉30mm/h，腹水为黄色渗出液，分类淋巴细胞90%。该患者最大可能是

- A. 结核性腹膜炎
- B. 肝硬化腹水

- C. 腹膜转移癌
- D. 胃癌
- E. 多发性浆膜炎

50. 女性，中年，肝炎史多年，血清A/G倒置，因为

- A. 肝合成清蛋白减少
- B. 清蛋白水解增多
- C. 清蛋白从尿中排出
- D. γ 球蛋白合成增多
- E. γ 球蛋白破坏减少

51. 男性，40岁，阵发性腹痛，腹胀，呕吐，肛门停止排气、排便4天。3年前曾作阑尾切除术。右侧腹部较左侧膨胀，具有明显压痛、反跳痛和肌紧张，肠鸣音减弱。最可能的诊断是

- A. 麻痹性肠梗阻
- B. 粘连性绞窄性肠梗阻
- C. 粘连性肠梗阻
- D. 低位单纯性肠梗阻
- E. 粘连性高位肠梗阻

52. 男性，25岁，3天前体检偶然发现血压150/90mmHg，尿蛋白(++)，红细胞0~1个/HP，眼底正常。拟诊应考虑

- A. 慢性肾炎
- B. 高血压病肾损害
- C. 隐匿性肾小球疾病
- D. 慢性肾盂肾炎
- E. 急进性肾炎

53. 男性，60岁，近1个月来进食哽噎，间断反复发作，消瘦，临床疑为食管癌，下列哪项检查对诊断意义不大

- A. CT检查
- B. 纤维食管镜检查
- C. 胸部超声检查
- D. 食管钡餐检查
- E. 核素 ^{32}P 扫描

54. 患者“冠心病心衰”病史3年,经适当治疗目前心率、血压正常,一般活动不受限制,日常活动不引起症状,此时心功能分级应是
- A. 心功能正常
 - B. 心功能不全Ⅰ级
 - C. 心功能不全Ⅱ级
 - D. 心功能不全Ⅲ级
 - E. 心功能失代偿期

55. 女性,54岁,右拇指根部疼痛半年余,患指疼痛、弹响、屈伸活动受限,近1个月来常绞锁于屈拇位。查体:右掌指关节掌指侧可触及绿豆大小结节随屈伸移动,有摩擦感和弹响压痛等,应诊断为
- A. 类风湿性关节炎
 - B. 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎
 - C. 拇长屈肌腱狭窄性腱鞘炎
 - D. 拇长屈肌腱断裂
 - E. 第一掌骨病理性骨折

56. 女性,20岁,贫血2年,平时月经量较

多,自感乏力,活动后心慌气短,血常规:血红蛋白75g/L,红细胞 $3 \times 10^{12}/L$,网织红细胞0.008,用硫酸亚铁治疗1周后,自觉症状有所改善,血红蛋白无变化,网织红细胞0.036。患者可能的诊断为

- A. 急性失血性贫血
- B. 营养性巨幼细胞贫血
- C. 缺铁性贫血
- D. 再生障碍性贫血
- E. 溶血性贫血

57. 孕38周初产妇,于夜间发现阴道大量出血,无腹痛,查宫底剑下3指,软无压痛,臀先露,高浮,胎心好,常采用的诊断方法是

- A. 腹部CT检查
- B. B型超声检查
- C. X线软组织腹部检查
- D. 阴道扪诊
- E. 阴道镜检查

B1型选择题 (58~71题)

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(58~60题共用备选答案)

- A. 营养性缺铁性贫血
- B. 巨幼红细胞性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 白血病
- E. 溶血性贫血

58. 慢性钩虫病可致

59. 单纯羊奶、母乳喂养易发生

60. 双胞胎易发生

(61~63题共用备选答案)

- A. 切口分类及愈合记录为“Ⅰ/甲”
- B. 切口分类及愈合记录为“Ⅲ/丙”
- C. 切口分类及愈合记录为“Ⅱ/甲”
- D. 切口分类及愈合记录为“Ⅱ/乙”
- E. 切口分类及愈合记录为“Ⅲ/甲”

61. 甲状腺腺瘤切除术,切口愈合良好

62. 右尺桡骨开放性骨折, 切口有血肿

63. 胃大部切除术, 切口愈合良好

(64~66 题共用备选答案)

- A. 从事医师执业活动
- B. 中止医师执业活动
- C. 申请执业医师注册
- D. 不予医师执业注册
- E. 注销执业医师注册

64. 取得医师资格的可以

65. 受吊销医师执业证书行政处罚, 自处罚之日起不满二年的

66. 医师注册后受吊销医师执业证书行政处罚的

(67~69 题共用备选答案)

- A. 慢性支气管炎合并阻塞性肺气肿

B. 肺炎球菌肺炎

C. 原发型肺结核

D. 中叶综合征

E. 肺栓塞

67. 可发生肺脓肿

68. 可发生 I 型呼吸衰竭

69. 可发生 II 型呼吸衰竭

(70~71 题共用备选答案)

A. 窦房结

B. 心房肌

C. 心室肌

D. 房室交界

E. 浦肯野纤维

70. 自律性最高的是

71. 传导速度最慢的是

A3/A4 型选择题 (72~80 题)

答题说明

以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息, 在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(72~74 题共用题干)

患者孕 37 周, 孕期多次检查各项均正常, 近 1 周来出现食欲不振, 全身皮肤发黄, 恶心呕吐, 乙肝表面抗原阳性。

72. 最可能的诊断为

- A. 急性肝炎
- B. 丙型肝炎
- C. 药物性肝损伤
- D. 妊娠期肝内胆汁淤积症

E. 妊娠期急性脂肪肝

73. 首选的治疗方案是

- A. 严格隔离, 保肝治疗, 继续妊娠
- B. 严格隔离, 保肝治疗, 症状好转后终止妊娠
- C. 卧床休息继续妊娠
- D. 口服保肝药等待自然分娩
- E. 产后为防止感染可选用多种抗生素

74. 该类患者在妊娠晚期最易出现下列哪种情况

- A. 妊娠晚期可致阴道出血
- B. 妊娠晚期易并发妊高征
- C. 多发性凝血功能障碍
- D. 易发生早产及死胎
- E. 易致急性肝坏死

(75~76题共用题干)

女性, 70岁, 患“风湿性心脏病二尖瓣狭窄伴关闭不全”10年, 长期口服地高辛。近日出现尿少、周身浮肿、恶心呕吐、频发多源室早、嗜睡、黄视等改变。

75. 最可能的诊断是

- A. 心衰加重
- B. 感染性心内膜炎
- C. 肾衰
- D. 消化道溃疡
- E. 洋地黄中毒

76. 最佳的治疗方案为

- A. 抗炎治疗
- B. 加大洋地黄用量
- C. 纠正肾功能异常
- D. 停洋地黄, 用苯妥英钠
- E. 加用利尿剂

(77~78题共用题干)

男性, 60岁, 肠梗阻3天。查体血压70/40mmHg, 血钠125mmol/L, 血钾3.2mmol/L, 血气分析pH7.31。

77. 治疗时首先应

- A. 补钾
- B. 给予升压药
- C. 扩容
- D. 纠正酸中毒
- E. 急诊手术解除梗阻

78. 该患者 $[\text{HCO}_3^-]$ 最少高于多少时, 不需补充碱剂

- A. 10~12mmol/L
- B. 12~14mmol/L
- C. 14~16mmol/L
- D. 16~18mmol/L
- E. 18~20mmol/L

(79~80题共用题干)

女孩, 6个月, 1998年10月因吐泻3天入院。大便10~15次/日, 呈蛋花汤样, 无腥臭味, 尿量极少, 前囟、眼窝凹陷, 皮肤弹性极差, 脉细弱, 四肢厥冷, 大便偶见白细胞, 血清钠125mmol/L。

79. 最可能的诊断是

- A. 中度低渗性脱水
- B. 重度等渗性脱水
- C. 中度等渗性脱水
- D. 重度低渗性脱水
- E. 重度高渗性脱水

80. 最可能的病原是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 产毒大肠杆菌
- C. 白色念珠菌
- D. 耶尔森菌
- E. 轮状病毒