

980

一味中药祛顽疾

YIWEI ZHONGYAO QU WANJI

(第二版)

编著 李世文 康满珍 李 亿

人 民 军 医 出 版 社

People's Military Medical Publisher

北 京

图书在版编目(CIP)数据

一味中药祛顽疾/李世文,康满珍,李亿编著. —2版. —北京:人民军医出版社,2003.1

ISBN 7-80157-468-0

I. 一… II. ①李… ②康… ③李… III. 中草药-临床应用
IV. R282

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 004847 号

人民军医出版社出版

(北京市复兴路 22 号甲 3 号)

(邮政编码:100842 电话:68222916)

潮河印刷厂印刷

春园装订厂装订

新华书店总店北京发行所发行

*

开本:850×1168mm 1/32·印张:18.25·字数:644 千字

2003 年 1 月第 2 版 (北京)第 7 次印刷

印数:25001~28000 定价:35.00 元

(购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换)

内 容 提 要

本书共精选中草药 236 种,对每种药的成分、性味、归经、用法,特别是药理作用及主治病症作了详细介绍。治疗的病症包括内、外、妇、儿、五官、皮肤和肿瘤等 20 余类 300 余种。作者在继承中医药传统理论和临证经验的基础上,广泛收集近年来各医学期刊报道的单味中药药理研究和临床应用成果,精心整理编排,出版后受到了读者的广泛好评。本版与第一版比较,新增中草药 45 种及相应的新内容,同时删除了 43 种不常用及疗效欠佳的药物,使全书内容更新颖实用。

本书是学习、应用中药颇有价值的参考书,适于各级临床医师、基层医务人员、医学院校师生、中药开发研究人员和中医药爱好者阅读参考。

责任编辑 杨磊石 王 敏

第一版前言

余览医书,多见一味中药治病之散载。近 20 多年来,在中医期刊报道中,为一味中药祛病回春之妙所吸引,故欣然编著《一味中药祛顽疾》,以弘扬中药学术思想,继往开来,承前启后,供医患所急需。

为编著本书,余查阅文献甚众,纳精汇萃,广采博引,务求其真谛。在编著中,深深感到,一味中药防治疾病是极受医患欢迎的;一味中药治病的临床疗效是有口皆碑的;一味中药治病的副作用极为少见;一味中药治病的科研成果捷报频传,是与日俱增的。本书妙就妙在它寓医理于其中,内容翔实,条目井然,用法简便,广泛易行,既有很高的实用价值,也有研究和文献价值。手此一册,如读书刊千万种。阅毕使人耳目一新,大有裨益。

本书共收集中草药 234 种,融内、外、妇、儿、耳鼻咽喉、口腔、皮肤及肿瘤等科于一体,不仅能使临床医生有所裨益,而且可供中药厂家开发新药参考。综观全书,的确是一部反映一味药治病之专著,也是我国中药百花园中的一朵绚丽多彩的奇葩。

由于作者水平有限,遗漏、错误和不足之处恐难避免,敬请专家学者和同道批评斧正。

李世文 康满珍

1995 年 1 月于湖南新化

第二版前言

本书第一版出版已有 6 年,深受广大读者厚爱,已连续印刷 5 次,发行 20 000 余册。我们这次根据“新颖、实用、价廉、高效”的原则,对其进行了较大幅度的修订。

首先,新增补中草药 45 种,同时删除了“丁公藤”等 43 种疗效不太确切、不太常用的药品。

其次,在修订时,删除了【别名】、【来源】和【临床病症与用药分类】。

最后,本版在【主治】一栏中,增加了自 1996 至 2001 年发表在国内医学期刊上的新作,使全书内容更加新颖实用。

中医诊疗讲究辨证施治。本书所介绍的中药,尤其是有毒副作用的药,宜在医生指导下使用,切忌滥用,以防发生不测。

中药已受到世界各国的广泛关注,成为新世纪人们预防、保健和医疗的亮点。但中(成)药出口,我国仅占世界份额的 2%,日本却占 80%,与中药鼻祖——中国这样一个泱泱大国太不相称。本书的出版,如果能得到药学工作者的重视,从中吸取一些营养,制成新药问世、出口,造福于人类,这就是令作者最欣慰的。

中药多学科的研究突飞猛进,文献资料浩如烟海,我们虽作了巨大努力,但限于条件和水平,错漏之处殊难避免,诚望读者提出宝贵意见,以便在本书再修订时改进。

本书按中药名称首字笔画顺序编排,以便读者查阅。

李世文 康满珍

2002 年 1 月 18 日

目 录

一画

一叶萩	(1)
一枝黄花	(2)

二画

丁香	(4)
七叶一枝花	(7)
人参(附人参叶、人参芦)	(9)
人乳汁	(12)
九节茶(肿节风)	(13)
了哥王	(15)

三画

三七	(18)
干地黄	(22)
大戟	(26)
大蒜	(27)
大蓟	(34)
大黄	(36)
大枣	(45)
大青叶	(47)
土茯苓	(49)
土鳖虫	(51)
山药	(52)

山楂	(53)
山茱萸	(55)
山豆根	(56)
山慈菇	(58)
川芎	(59)
川乌头	(64)
小蓟	(66)
马齿苋	(68)
马钱子	(73)
女贞叶	(76)

四画

元胡	(78)
天麻	(80)
天南星	(81)
天花粉	(84)
王不留行	(85)
木瓜	(90)
木贼	(91)
木鳖子	(93)
无花果	(95)
五味子	(96)
五倍子	(98)
车前子	(102)
车前草	(104)

升麻	(105)
毛茛	(107)
毛冬青	(109)
牛膝	(113)
牛蒡子	(114)
乌梅	(116)
乌柏叶	(119)
乌贼骨	(120)
乌梢蛇	(123)
丹参	(124)
水蛭	(132)
巴豆	(136)

五画

玉竹	(139)
艾叶	(140)
甘草	(144)
甘遂	(149)
石灰	(151)
石膏	(153)
石榴皮	(157)
石菖蒲	(159)
田螺	(162)
生姜	(163)
代赭石	(167)
仙人掌	(169)
仙鹤草	(171)
白及	(174)
白矾	(178)
白果	(183)
白术	(185)
白芷	(187)

白芍	(189)
白芥子	(191)
白僵蚕	(194)
白头翁	(197)
白花蛇	(199)
白茅根	(200)
白花蛇舌草	(202)
半夏	(205)
半枝莲	(209)
龙葵	(210)
龙骨	(212)
龙胆	(214)

六画

地榆	(216)
地骨皮	(219)
芒硝	(222)
百部	(227)
肉桂	(229)
当归	(232)
血余	(238)
血竭	(239)
全蝎	(240)
刘寄奴	(244)
冰片	(245)
决明子	(248)
灯盏细辛	(250)
红花	(252)

七画

麦芽	(256)
芫花	(257)

花椒	(259)
苍术	(261)
苍耳草	(263)
苍耳子	(265)
芦根	(267)
芦荟	(268)
赤芍	(270)
赤小豆	(272)
连翘	(274)
吴茱萸	(276)
何首乌	(279)
牡蛎	(282)
牡丹皮	(284)
皂荚	(285)
皂角刺	(287)
灵芝草	(289)
鸡子黄	(292)
鸡血藤	(294)
鸡内金	(296)
鸡屎藤	(298)
陆英	(301)
附子	(301)

八画

青蒿	(304)
青黛	(307)
青木香	(310)
青风藤	(312)
枇杷叶	(313)
板蓝根	(315)
苦参	(319)
苦瓜	(325)

苦楝子	(326)
苎麻	(328)
刺猬皮	(330)
刺五加	(331)
岩白菜	(333)
昆布	(334)
昆明山海棠	(336)
虎杖	(338)
虎耳草	(343)
侧柏叶	(344)
金银花	(347)
金樱子	(348)
金钱草	(349)
金盏银盘	(351)
鱼腥草	(353)
泽泻	(359)
泽兰	(361)
泽漆	(362)
贯众	(365)
细辛	(367)

九画

珍珠	(372)
柳叶	(373)
柿叶	(374)
柿漆	(376)
栀子	(376)
枸杞子	(379)
胡椒	(380)
茴香	(383)
荔枝核	(385)
砂仁	(386)

牵牛子	(387)
威灵仙	(388)
鸦胆子	(391)
骨碎补	(396)
香附	(397)
穿山龙	(399)
穿山甲	(401)
韭菜	(404)
孩儿茶	(406)
钩藤	(409)

十画

桉叶	(411)
桃叶	(415)
桔梗	(416)
栝楼	(418)
夏枯草	(420)
秦艽	(424)
莱菔	(425)
莱菔子	(427)
鸭跖草	(429)
柴胡	(431)
积雪草	(434)
射干	(436)
臭牡丹	(437)
徐长卿	(439)
狼毒	(441)
益母草	(444)
桑叶	(449)

十一画

菝葜	(451)
----------	-------

菟丝子	(452)
黄芩	(454)
黄连	(458)
黄瓜	(465)
黄藤	(466)
黄大豆	(467)
黄柏	(469)
黄药子	(474)
蚯蚓	(476)
蛇蜕	(482)
野百合	(483)
野菊花	(484)
猪胆	(488)
商陆	(493)
淫羊藿	(495)

十二画

斑蝥	(500)
博落回	(504)
酢浆草	(505)
紫草	(506)
蛴螬	(512)
番泻叶	(513)
鹅不食草	(516)

十三画

槐花	(518)
槐角	(519)
榆白皮	(521)
蓖麻	(522)
蒺藜	(525)
蒲公英	(527)

雷公藤	(531)
硼砂	(536)
蜈蚣	(538)
蜂蜜	(541)
鼠妇	(544)

十四画以上

槟榔	(546)
辣椒	(548)
辣蓼草	(551)
豨莶草	(552)

樱桃叶	(554)
醋	(555)
薏苡仁	(556)
墨旱莲	(559)
藜芦	(561)
藕节	(562)
藤黄	(563)
壁虎	(565)
鱗鱼	(567)
蟾蜍	(568)
蟾酥	(570)



一 叶 萩

【成分】 叶含一叶萩碱,开花期间含量最高,结果时最低,干叶中含量为0.2%~0.3%。嫩茎及成熟果实亦含一叶萩碱,含量不及叶高。叶中尚含芸香甙、鞣质、少量别一叶萩碱、二氧一叶萩碱及一叶萩碱醇A、一叶萩碱醇B、一叶萩碱醇C等。根含多量别一叶萩碱,少量一叶萩碱及别一叶萩碱的甲氧基化合物。

【药理】

(1)对中枢神经系统,一叶萩碱有土的宁样作用。对中枢神经系统特别是脊髓具明显的兴奋作用,小量时提高反射的兴奋性,缩短反射的潜伏期,大量时则产生土的宁样惊厥。一叶萩碱与二氢一叶萩碱,均可引起这种惊厥。一叶萩碱能显著提高肌肉张力,但对神经肌肉标本并无直接兴奋作用,对胆碱酯酶和单胺氧化酶均无抑制作用,故是作用于中枢的结果。对大脑皮质的作用是使条件反射加强,潜伏期缩短,脑电图表现为快波增加,慢波减少。一叶萩碱还能增加大脑、脊髓、肝、肾、骨骼肌的氧消耗量。

(2)麻醉动物静脉注射一叶萩碱可使血压升高,心收缩力加强,呼吸兴奋,但对离体兔耳血管灌流并无收缩血管作用。

(3)体内过程。给动物口服或注射一叶萩碱,绝大部分在体内很快地被吸收,仅很小部分经尿排出。经猴口服大量一叶萩碱,48小时内经尿排出者不到1%。一叶萩碱虽可在消化道内吸收,亦可在肠道受到破坏。此药在体内代谢迅速,可能与肝脏及红细胞内含有代谢一叶萩碱的酶体系有关,其他组织亦能代谢一叶萩碱,但能力较弱。由于此药在体内代谢迅速,临床应用时可适当加大剂量,而不致引起毒性或蓄积反应。

【性味与归经】 辛,苦,温,有毒。

【传统功用】 活血舒筋,健脾益肾。用于治疗风湿腰痛、四肢麻木、偏瘫、阳痿、面神经麻痹及小儿麻痹后遗症。

【用法与用量】 口服,煎汤,9~15g。

【毒性】 一叶萩碱中毒能引起脊髓性惊厥,但较土的宁为弱,引起猫惊厥的量约为土的宁的10.5倍,而引起死亡量为土的宁的100倍,故治疗宽度较土的宁大。连续较长时间给硝酸一叶萩碱,对动物的生长、发育、肝、肾

功能及红细胞均未见明显影响。

【主治】

(1)更年期综合征:每天口服一叶萩碱片3次(每片含一叶萩碱4mg),每次2片,治疗40例,症状全部消失或基本消失15例,症状部分消失21例,症状基本无改变者4例。均以20天治疗计算疗效。


(2)小儿麻痹后遗症:应用一叶萩碱治疗小儿麻痹后遗症,可改善患肢血液循环,局部温度增高,肌力增加,功能改进。方法为以硝酸一叶萩碱行穴位注射,按年龄体重不同,剂量为4~14mg(0.2~0.4mg/kg),每天1次,10~15天为1个疗程。

(3)慢性再生障碍性贫血:每天肌注硝酸一叶萩碱注射液8~24mg,疗程为半个月至半年余。治疗期间,除用支持疗法外,不用其他中西药物。结果:123例中,基本治愈及缓解18例,明显进步40例,无效65例,总有效率为47.1%。一叶萩碱治疗本病原理尚不清。

(4)面神经麻痹:有人用一叶萩碱治疗面神经麻痹患者,效果显著。用法:在患侧面面部穴位注射,每天1次,12次为1个疗程,休息1~2天再开始第2个疗程。穴位可选9个,分为3组轮流注射,每天1组,每穴每次注入一叶萩碱0.8~1.2mg。笔者用一叶萩碱治疗面神经麻痹患者15例,其中治愈者12例,显著好转者2例,有效率为100%。用法同上。一般用药1个疗程见效,2个疗程即可获得显效,治程中无副作用。

参 考 文 献

- 1 陆汉忠.一叶萩碱治疗更年期综合征40例.中医杂志,1980;21(8):608
- 2 一叶萩碱治疗慢性再生障碍性贫血协作组.一叶萩碱治疗慢性再生障碍性贫血123例疗效分析.中华内科杂志,1983;22(12):764
- 3 陈新谦,金有豫.新编药理学.第14版.北京:人民卫生出版社,1998:141



一枝黄花

【成分】全草含酚性成分、鞣质、挥发油、皂甙、黄酮类等。酚性成分中有绿原酸、咖啡酸。黄酮类中有槲皮素、槲皮甙、芸香甙、山奈酚葡萄糖甙、矢车菊双甙等。

【药理】

(1)抑菌作用:本品煎剂在试管内对金黄色葡萄球菌、肺炎球菌、绿脓杆菌及舒氏、宋氏痢疾杆菌均有不同程度的抑菌作用。

(2)止血作用:对急性肾炎(出血性)有止血作用,可能与其含的黄酮类或绿原酸、咖啡酸有关。外用可治疗创伤,可能与本品所含挥发油或鞣质有关。

【性味与归经】 辛,苦,凉。归肝、胆二经。

【传统功用】 清热解毒,祛风消肿。用于感冒、百日咳、黄疸、小儿惊风、痈肿、跌打损伤、鹅掌风等疾病。

【用法与用量】 口服:煎汤,9~15g(鲜品,20~30g)。外用:捣敷或煎水洗。

【主治】

(1)五官科疾患:包括角膜炎、角膜外伤感染、耳软骨膜炎、急性中耳炎、耳道疳、副鼻窦炎、鼻疖、口腔溃疡、牙周脓肿、急性咽炎等。以本品配大青叶制成黄青注射液,肌肉注射,每次2ml(含生药3.6g),每天2次。治疗结果:用上药治疗五官科疾患400例,有效率94%。

(2)晚期甲状腺癌:一枝黄花选配抗癌药:半枝莲、银花、凤尾草、南天竹、猫人参、紫花地丁、山豆根、野百合、莪术、木瓜、黄药子。化淤软坚药:夏枯草、蒲公英、花蕊石、牡蛎、醋鳖甲、威灵仙、三棱、没药、象贝母、皂角刺、僵蚕、山慈菇。上述二类药交替配伍应用,随证加减。治疗结果:以一枝黄花为主治疗晚期甲状腺癌患者2例,经手术、化疗无效,改用上药治疗,分别存活9年及5年。

(3)小儿急性扁桃体炎:一枝黄花30~60g(鲜品,或干品15~30g),水煎,代茶饮。另取鲜品适量,捣烂绞汁,加食盐、醋少许搅拌均匀,徐徐含咽。治疗结果:用一枝黄花治疗小儿急性扁桃体炎300例,痊愈者297例,无效者3例。服药1~2剂痊愈者204例,4~6剂痊愈者93例。

(4)手足癣:一枝黄花的煎液在试管内对红色癣菌有杀灭作用。对病程5~10年的手足癣患者6例,采用一枝黄花药液洗涤5~6次,均全部治愈。

参 考 文 献

- 1 陈庆全,张俊荣.实用临床草药.广州:暨南大学出版社,1991;3
- 2 涂鑫.黄青注射液在五官科的临床运用.湖南中医杂志,1985;(4):45
- 3 朱长生.中药治疗晚期甲状腺癌两例.上海中医药杂志,1982;(4):16
- 4 赵伟强.一枝黄花治疗小儿急性扁桃体炎.四川中医,1990;8(1):48



丁香

【成分】 花蕾含挥发油即丁香油。油中主要含有丁香油酚、乙酰丁香油酚、 β -石竹烯。以及甲基正戊基酮、水杨酸甲酸、葑草烯、苯甲醛、苧醇、间甲氧基苯甲醛、乙酸苧酯、胡椒酚、d-衣兰烯等。也有野生品种中不含丁香油酚(平常丁香油中含64%~85%),而含丁香酮和番樱桃素。花中还含三萜化合物如齐墩果酸、黄酮和对氧萘酮类鼠李素、山奈酚、番樱桃素、番樱桃素亭、异番樱桃素亭及其去甲基化合物异番樱桃酚。

【药理】

(1)抗菌作用:含有1%浓度的丁香的乙醚浸出液、水浸液或含8%浓度的丁香煎剂的沙伯培养基,对许兰黄癣菌、白色念珠菌等多种致病性真菌均有抑制作用。较高浓度时对新型隐球菌也有抑制作用。醇浸出液与醚浸出液相似,但水浸出液较差,丁香油及丁香油酚在1:8000~1:16000时,对致病性真菌即有抑制作用。煎液1:20~1:640浓度时,对葡萄球菌、链球菌及白喉、变形、绿脓、大肠、痢疾、伤寒等杆菌有抑制作用。丁香对流感病毒PR₈株也有抑制作用(体外实验)。

(2)驱虫作用:水或醇提取液在体外对猪蛔虫有麻痹或杀死作用。感染蛔虫的狗口服丁香油0.5~1.0g/kg,有驱虫作用,但1次服用并不能将蛔虫全部驱除。丁香油较煎剂为优。

(3)健胃作用:丁香为芳香健胃剂,可缓解腹部气胀,增强消化能力,减轻恶心呕吐。5%丁香油酚乳剂可使胃黏液分泌显著增加,而酸度则不增强;丁香油的作用稍差,连续应用,可使黏液耗竭,而仅分泌非黏液性的渗出物;36小时后方可能部分恢复反应(分泌黏液),完全恢复,需数月以后。

(4)止牙痛作用:丁香油(少量滴入)可消毒龋齿腔,破坏其神经,从而减轻牙痛。

【性味与归经】 辛,温。入胃、脾、肾经。

【传统功用】 温中,暖肾,降逆。用于治疗呃逆、呕吐、反胃、痢疾、疝气、癰症。

【禁忌】 热病及阴虚内热者忌服。

【主治】

(1)癬:取丁香 15g,加入 70%乙醇至 100ml,浸 48 小时后去渣。每天外搽患处 3 次。经用上法治疗体癬及足癬患者 31 例(病史在 2 年以上),一般在治疗 1 天后症状即见消退,2 天后患处有皮屑脱落,经 3~5 天即能治愈。但有 20%左右治愈后仍反复复发。

(2)呃逆:将丁香 1g 左右(10~15 粒),细嚼(嚼时有大量唾液分泌,切勿将其吐出),徐徐咽下。待药味尽,将口内剩余药渣吞下,呃逆立止。30 分钟如不止,可续用 2~3 次,方法同上。口里尚遗味可用温开水漱口。忌用冷水漱口及食生冷食物。结果:治疗呃逆患者 238 例,全部获愈。其中立效者 230 例,30 分钟以上呃逆者 8 例。未见副作用发生。

(3)麻痹性肠梗阻:取丁香 30~60g,研成细末加入 75%乙醇调和,对乙醇过敏者,可用开水调和,敷于脐及脐周,直径约 6~8cm。其上以纱布及塑料薄膜覆盖,周围胶布固定,以减少乙醇挥发。对胶布过敏者可用绷带固定。治疗结果:治疗 20 例,用药 1 次 15 例,用药 3 次 5 例,用药 2 小时后可听到肠鸣音,4~8 小时排便、排气,效果满意。

(4)睾丸鞘膜积液:取母丁香 40g,研为细末后过筛,制成粉状,装瓶备用。将丁香粉 2g 放入患者肚脐中(高于皮肤 0.2cm),然后盖上敷料 1 块,用胶布十字固定,每隔 2 天换药 1 次,20 天为 1 个疗程。间隔 5~10 天进行第 2 个疗程。治疗结果:治疗 243 例,痊愈 148 例,显效 72 例,有效 20 例,无效 3 例。有效率为 98.8%。未见副作用发生。

(5)口腔溃疡:用丁香 9~15g,打碎,放入杯或小瓶中,用冷水浸过药面,约经 4 小时后,取药液涂于口腔溃疡表面,每天 4~8 次。采用丁香治疗口腔溃疡患者,一般 2~3 天即获痊愈,明显优于碘甘油。

(6)口臭:丁香、厚朴各 2 份,薄荷 1 份。将上药馏取挥发油,密封贮存备用,或每次取丁香、厚朴、薄荷,按 4:4:2 的比例,开水浸泡 15 分钟,滤去药渣后使用。用于治疗口臭时,以温开水 50ml,加入上药液 0.5~1ml,摇匀后含漱。王亚楠等用上方治疗口臭患者 32 例,牙痛 15 例,全部获得治愈。

(7)麦粒肿:取丁香 7 粒,大枣 1 枚去核,与丁香粉拌匀制成花生米大小药丸,纳鼻中(左眼病纳右鼻腔,右眼病纳左鼻腔),每天 1 颗。一般用药 3~5 天即可见效。许水玉用本方治疗麦粒肿患者 156 例,其中显效者 94 例,有效者 57 例,无效者 5 例。总有效率为 96.79%。

(8)治疗早泄:丁香、细辛各 20g,75%乙醇 100ml。将两药浸泡于乙醇内半个月即可。使用时,用浸出液涂搽阴茎之龟头部位,经 1.5~3.0 分钟后即行房事。周午平采用上方治疗早泄患者 156 例,对精神因素所致的早泄效果较好,单用本药即有效。若兼有其他原因所致者,可配合辨证加用内服药,能

明显提高疗效。

(9)乳头皲裂:刘绍兴采用公丁香治疗乳头皲裂患者 20 例,其中哺乳期 18 例,非哺乳期 2 例,双侧乳头皲裂者 15 例,共计 35 个乳头,全部获得痊愈。治疗方法:将公丁香 5g 研为细末,红糖 5g。取两味药放铁勺内加白酒 1 小杯,置于火上炒至干枯,研细后用菜油或麻油调敷患处。哺乳时洗去,哺乳后涂药。

(10)小儿腹泻:尤文俊采用本药治疗小儿腹泻患者 321 例,其中痊愈者(用药 1~2 次后症状完全消失,大便恢复正常)221 例,有效者 92 例,无效者 8 例。总有效率为 97.5%。治疗方法:取丁香 30g,炒车前子 20g,萆薢 10g,胡椒、肉桂各 5g。将前药共研为极细末后装入瓶内备用。用时,取药末 100~300mg,置于脐窝内。若脐突出者,则用示指轻轻按下,使之陷下后再放药,并以脐布固定;1~2 天换药 1 次。但脐部发炎或过敏者忌用本品。

(11)镇痛:丁香、肉桂等量,研为极细末,外敷穴位,治疗胃痛、食管炎、肝炎、腰痛、胆囊炎 200 多例,均获得良好效果。

(12)烧伤瘢痕增生及创面瘙痒症:丁艾油:丁香 50g,艾叶 30g,加水 1 000ml 蒸馏提取挥发油 300ml;红花 20g,用 70%乙醇 100ml,浸泡渗滤;在醇液中加入冰片 6g 溶化。3 种滤液按 1:1:1 混合后密封备用。用法:用时,先取复方艾叶煎液(由艾叶、威灵仙各 15g,老松皮 30g,红花 10g,加水浸泡 1 小时,1 剂煎 2 次,合并 2 次煎液约 3 000ml)浸敷创面,腿部、躯干、面部用干净毛巾或纱布浸药液外敷,四肢末端可将创面浸泡于药液中,每次半个小时,早晚各 1 次。浸泡后抹于患处,再外搽丁艾油,每天数次。治疗结果:用上法防治烧伤瘢痕增生及创面瘙痒症患者 56 例(其中创面修复后即用法防治者 25 例,出院后创面出现瘢痕增生求诊者 18 例,创面愈合,瘢痕增生 >1 年者 13 例),临床治愈(瘢痕得到控制或消失,痒、痛消失)9 例,显效(瘢痕充血减退,呈糠屑样脱落,痒痛消失)25 例,有效(痒痛减轻,瘢痕无变化)19 例,无效 3 例,总有效率为 94.7%。

(13)麻痹性肠梗阻:有人用丁香敷脐治疗麻痹性肠梗阻患者,效果卓著。治疗方法:取丁香 30~60g,研为极细末,加入 75%乙醇调和,对乙醇过敏者可用开水调和,然后敷于脐及脐周,直径约 6~8cm,用纱布及塑料薄膜覆盖,周围以胶布固定(以减少乙醇的挥发)。治疗结果:用上法治疗 20 例,其中用药 1 次获效者 15 例,3 次者 5 例。一般用药 2 小时后可听到肠鸣音,4~8 小时排便、排气,若属于机械性肠梗阻,则不宜应用本法治疗。

参考文献

- 1 张崇尧.公丁香治疗呃逆.山东中医杂志,1986;(4):53

- 2 李世祥,李鼎建.丁香敷脐治疗麻痹性肠梗阻.中医杂志,1988;29(11):55
- 3 索寿臣.母丁香治疗睾丸鞘膜积液.广西中医药,1992;(15),增刊:186
- 4 雷戟权,等主编.中华临床中药学.北京:人民卫生出版社,1998
- 5 尤文俊.丁香敷脐治疗小儿泄泻 321 例.广西中医药,1988;11(1):13
- 6 刘谋升.复方艾叶熏浸洗法防治烧伤瘢痕增生及创面瘙痒症 56 例小结.湖南中医杂志,1990;6(5):8—9
- 7 李世祥.丁香敷脐治疗麻痹性肠梗阻.中医杂志,1988;29(11):55

七叶一枝花

【成分】 根状茎含甾体皂甙的称为蚤休甙及蚤休士宁甙,后者水解后生成薯蓣皂甙元。还含有生物碱和氨基酸。

【药理】

(1)抑制病毒、细菌和消炎作用:对亚洲甲型病毒有较强的抑制作用。对痢疾杆菌、副伤寒杆菌、沙门菌、副大肠杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌和脑膜炎双球菌等均有抑菌作用。煎剂对于右旋糖酐所致“无菌性炎症”有对抗作用。

(2)镇静、镇咳作用:蚤休甙可使小鼠的自由活动减少,与戊巴比妥钠有显著协同作用,并有镇痛作用;煎剂对小鼠实验性咳嗽有明显的镇咳作用。

(3)收缩平滑肌:七叶一枝花所含皂甙对离体兔耳血管平滑肌有直接收缩作用;其煎剂及皂甙对豚鼠的离体回肠均有兴奋作用。

(4)促肾上腺功能:给大白鼠灌胃,能明显减低大鼠肾上腺素内维生素 C 的含量,促进肾上腺功能,但对幼鼠胸腺重量影响不大。

【性味与归经】 苦,微寒,有小毒。归肝经。

【传统功用】 清热解毒,消肿止痛,凉肝定惊。用于疗肿痛肿、咽喉肿痛、毒蛇咬伤、跌扑伤痛、惊风抽搐、小儿高热、流行性腮腺炎。

【用法与用量】 汤剂:6~15g;散剂:3g 冲服;外用适量,捣敷或酊剂或磨水或研末以醋调外搽。

【主治】

(1)毛虫皮炎、蜂蜇:用七叶一枝花酊治疗毛虫性皮炎 21 例,均在用药 10 次后立即止痛止痒,皮疹随之消退而痊愈。治疗蜂蜇皮炎 16 例,外用 10% 七叶一枝花酊,有效 15 例,无效 1 例。本品作用机制可能与解毒或中和毒素有关。

(2)宫颈糜烂:用七叶一枝花根状茎研细末,调甘油搽患处,每天 2 次,