

治

蠱

新

方

路順德 纂
繆福照 重訂

中
華
書
局

序

昔大禹鑄鼎象物，使民知神姦而爲之備。後世賴焉。然此皆有形有質，故得按圖而稽之。未若近世蠱之害人，其爲毒也無形，其中人也至烈，而其來也一發不可復制。嗚呼！豈不痛哉！蓋南方地氣卑下，溼氣薰蒸，乘其氣者，毒每倍于他方。加以瘠苗雜處，俗尙巫鬼，凡諸幻術，皆非意計所及。蓋蠱之由來久矣。余中年爲親負米，浮湘之粵，渡彭蠡以歸。凡洞庭南北，象郡西東，及滇閩邊界，足跡幾遍。計自戊寅迄甲午十七年，往來疊烟瘴雨中，無日不臨深履薄。予雖幸免斯毒，而竊悲染此毒者，思有以治之而未得也。壬午春，道出南寧，於旅肆中得鈔本治蠱新方一書。其言半雜融縣土音。其所抄錄，亦魯魚殆半。猝猝未暇訂正也。乙酉丙戌間，客博白之大嶺埠，埠介山澤間，莠民之以蠱流毒者，指不勝屈。其地荒僻，鮮醫藥，余心憫焉。爲之按方施藥，應手輒愈。乃取是書，通其語言，訂其謬舛，郵寄同人，廣爲流布。今已倦歸故里，桑梓熙恬，民淳物阜，無復中蠱之患。然回思前此求治諸人，呼號匍匐，如在目前，痛定思痛，愈滋疚焉。因復取而校之，而誌其緣起如此。嗚呼！毒之生于天者，吾無如何矣。安得良有司者，取人之所爲蠱而禁之，而化之哉？是則所謂功不在禹下者矣。道光乙未花朝後三日，澄江漁者繆福照介夫氏序。

治蠱新方

清 路順德纂

繆福照重訂
順德字繼侯融縣人
福照字介夫江陰人

蘇荷湯

能治一切蠱症。凡蛇蠱疳蠱。腫脹癰狂痢症。以及一切感冒咳嗽氣逆沖上。肚皮緊急。審係內伏實火。小便黃赤。或服補藥而病加重者。用此湯方加減治之。百發百中。

紫蘇一兩

南薄荷一兩

條參八錢

連翹八錢

生黃芪七錢

當歸一兩

生首烏一兩

白芷一兩

川芎五錢

決明子五錢

槐花一兩

生白芍五錢

柴胡六錢

青蒿一兩

生元版八錢

右十五味爲一劑。水煨服。服三四劑後。病漸減者。加燒酒二兩。同水久煨服。取效更速。又此方每劑加田州三七二錢。更驗。又初服藥不可太急。急則內毒翻跳。病人不安。或大吐大瀉。病愈固速。而病人頗畏。至服藥五六劑。則無妨也。

右服藥一二劑後。內火炎上。大便結秘。口舌熱爛者。去當歸。白芷。川芎。紫蘇。薄荷。加黃柏。黃芩。茯苓。元參。天門冬。澤瀉。石膏。各五錢。酒一茶杯。同水久煨服。小便赤。火盛者。加元參。梔子。茯苓。各五錢。帶熱嗽。或咳血者。審係內有實火。紫蘇。薄荷。暫停不用。並除當歸。白芷。川芎。加三七。百合。麥門冬。各一兩。

水煨服。時而傷寒，帶寒嗽者，仍用焦薑、陳皮、洋參、丁香、當歸、川芎、杏仁、半夏、炙黃耆、首烏、炙甘草，寒在裏，則加肉桂等藥一二劑，以治其標。嗽漸愈，復用蘇荷湯加減以治其本。或人弱帶病者，去條參、連翹、槐花、柴胡、生芪、青蒿、生地、紫蘇、薄荷、決明子、加百合、附子、扁豆、淮山藥、砂仁、白朮、乾薑、各三錢。洋參、丁香、木香、各一錢。水煨服。又服蘇荷湯已久，蠱毒將淨，火退腰痛者，去條參、連翹、生芪、槐花、柴胡、青蒿、生地、決明子、生芍藥、紫蘇、薄荷、加廣陳皮、五錢，或加熟地五錢、肉桂二錢、焦薑五錢、丁香三錢、炙甘草三錢、杜仲二錢、炒白朮三錢、酒炒芍藥三錢、茯苓一錢。水煨服。或病人脾胃虛寒，後復中蠱，或服蘇荷湯已久，蠱毒既淨，五臟虛寒，則蘇荷湯不可用，宜用溫補行氣之藥，詳見後篇。

忌喫諸物

狗肉、雞、鴨、雉雞、魚、蚌、螺、蝦等物，愈後尙要戒一二年。川山甲有鱗等物，愈後要戒四年。蛤、戒十年。蛇終身不可吃。糖、甘蔗、紅棗、黑棗，一切生蟲招疳之物，服藥時宜戒，愈後可喫。蘿蔔菜，蘿蔔菜不可喫。又蘿蔔菜惟中疳者宜戒，愈後可喫。

以上宜戒之物，務要嚴爲戒口，服藥方驗，稍不謹慎，病必復翻。

宜喫諸物

筍、豆腐、莧菜、青菜、白菜、菠菜、每碗放一茶杯。蒜、蓮藕、紫蘇、薄荷、芥藍、芡實、苦瓜、細粉、木耳、薑、茨菇、芋苗、豆角、每碗放一茶杯。筍、同菜煮吃妙。韭、夏月田內有之，殺蛇解毒，瀉脾胃之火。茨菇菜、解毒。龍眼、宜成類。

元眼肉恐有糖
參·戒之·

荔子病重時·惟此
二味可喫·

柑 柚 橙 橘 李

藕 棠梨

石榴

葛薯

西瓜

醋

茶

羊肉 猪肉

馬肉

藥前喫·恐作渴·

若未服·

水內之物·

緊惟此可喫·

鵝

以上可吃之物。或一吃此物。則病潮者。必在此物內中毒。暫戒之。愈後可喫。

浸筍水法

凡筍皆可浸。惟味苦而豔者尤妙。筍用淨刀淨砧板。切片。放瓦罈內。用午後水浸之。不可吃葷犯嫩。糠水將浸過筍。不可多。後添生筍則添生水。

巴豆驅毒散

凡中蛇蠱者。肚內或皮內既變蛇。或變肉。蟹肉。龜。或變虻蟲。凡遇肚痛時。大便結秘。少出。治方用巴豆一味。八歲以上小兒用二粒。十二歲以上用三粒。大人用六粒。將巴豆研末。水煨。菖蒲。瀝。斟其湯。着茶杯內。俟其湯將涼。帶溫。放巴豆末入湯內。攪開。令病人連湯並末吞喫。靜坐片刻。作瀉。俟其肚內之物瀉盡。方可飲食。但此藥至奇。喫後有瀉十餘次者。最後屙出如雞蛋清。則不瀉矣。若未屙出雞蛋清。遽飲茶水。瀉即止。則毒未淨。後必復作。但服此藥。恐太虧人。先買真菜豆。細粉四兩。煮熟。待瀉後。即將菜豆粉喫。此粉能解巴豆毒。或用滾水開蜂蜜喫更妙。若喫後又作吐。再調稀粥喫必愈。服此後。仍將蘇荷湯等方。加減服數劑。洗淨餘毒可也。愈後仍戒雞鴨魚蝦等物數年。

按巴豆一個剝開有三粒。兩頭尖者能殺人。不可用。此方楊生光熊世傳。醫愈蛇蠱者數十人。藥少價

廉收效又速。又試蛇蠱法。一凡身上皮肉刺痛。或腹內刺痛。喫筍水卽暫愈者。或將馬兜鈴一兩。水煨湯服。而病卽減者。定是中蠱。血氣健旺者。用巴豆方治之。頗捷。人弱者忌用。孕婦忌用此方。

加減蘇荷湯

紫蘇五錢 南薄荷五錢 當歸七錢 川芎五錢 甘草五錢 澤蘭二錢 白芷五錢 首烏五錢

生芪五錢 百合五錢 陳皮二錢 三稜二錢 莪朮二錢 鬱金一錢 木香一錢 丁香一錢

五茄皮五錢

以上十七味爲一劑。生薑三片爲引。水煨服。

凡中一切蠱者。血氣平和。不受得生地。元參。黃柏。連翹。槐花。青蒿。生芍藥。柴胡等寒涼之劑。又不受得桂附等溫熱之味。用此方服驗。若服此湯後。大便秘結者。仍服蘇荷湯較安。

蛇蠱

蛇蠱者。方書謂之桃生毒。傳聞山谷間獐婦或歹人。於端午日。取毒蛇。蜈蚣。蝦蟇。同放一器內。令其自相吞噬。用其生者研末。同黃泥作丸。包放竹筒內。其泥極腥。放出竹筒外。則見生蛇無數。能少能多。能短能長。能小能巨。能有形能無形。常用生雞蛋飼之。收入則成泥。或將少許蛇泥放路上。人踏過則蛇上人身。或放於茶酒內。與人喫。若酒醉甚。中毒者。戒鹽服藥可愈。

一曰生蛇蠱

有初中蛇蠱如外感症。面帶青色。氣逆氣短。肚皮緊急。兼之咳嗽。小便黃赤。內伏實熱。大便祕結。夜不得臥者。有初中不覺。至數月後。或一年後。時而在兩脅皮內痛。時而在兩肩下皮內痛。或數月痛一次。或一月痛一次。或一月痛數次。永不出汗。怕寒。服蘇荷湯後。如有聲走入肚內者。有在肚內痛。會動會移。痛時則氣欲絕者。

有遍身如風走竄。臥則手脚跳起。靜聽身上有如蝨行者。

有初積爲氣鬱不順。久而結爲血塊。久而成形。或爲虻蟲。或爲肉蛇。肉蠶。肉龜。或爲有鱗有脚。小蛇。或聚散無常。亦有終身止爲痞積。血積。食積。有常處者。

有夜臥忽然皮內。或背。或腹。或肩。時有一處微痛。會吸人氣。靜聽之。氣行至其處。則欲絕者。

有吐虻蟲者。按此症亦有因溼熱食積而生者。與蛇蠱同治。

有在心上脹。口涎出。痛而不移。常觸虻蟲者。

有在路上踏著者。或即時肚痛極。或打冷顫。至數月後。小便常黃赤。人漸瘦弱。肚常作痛。凡遇肚痛時。行動則皮內或肚內有物堅實。夜臥以手按之。肚皮有物攏起長二三寸。微覺跳動。心煩涎溢。得喫肉則稍止。或移入左脅右脅。則飯食減少。或痛上心。則心脹欲作吐。又此毒在身。時有時無。至年餘。或四五年。則變成肉蠶。肉龜。肉蛇。以作咬者。至蛇老時。或在皮內肚內行咬。有日咬一二十次者。命在頃刻。此時內蛇翻動作咬。則額焦頭痛。通身發熱。如有髮刺蟻咬。夜則更甚。此乃蠱家之外蛇從風而至也。內蛇咬入臟

腑外蛇入毛孔。其蛇無形亦無數。急用雄黃四觔。分作四包。安於病人牀上四角。病人臥則開此四包。雄黃以禦外蛇。服藥方應。

一曰陰蛇蠱

初中時。或吐或瀉。以後則肚腹膨脹。不想飲食。口極腥。頭面上筋起。如蟲行。鼻內如有二蟲欲出。不出。乃毒氣沖上。非蟲也。或耳內如有一蟲。亦毒氣也。或肚內如蛇翻有聲。甚則額熱面紅。大便結秘。若酒醉後在酒中受毒者。不獨腸臟青黑。卽肺肝心脾俱染黑氣。急服解毒發毒之藥。受毒重則屎黑。輕則屎藍。若不知解藥。則因黑氣而變成黑星。黑星有十顆。則肚內跳動如針刺。有十餘顆。便開成蛇口。如蛇咬狀。咬上心。出恭瀉血。命在旦夕。聞蠱醫云。中此毒者。若不知醫。不出一月必死。又加以癩藥。則人多昏聩。又加以腫藥。則一耳常滿。塞一耳朵。頭少紅厚。如有蟲行狀。服解藥。則黑氣隨屎出。但看食物全不變。如喫菜則爛菜。甚至喫飯則爛成顆飯。則毒淨矣。自此後食物仍變。出恭轉黃。則全愈矣。又毒重頭眩頭痛者。戒葷鹽半月。每殮用茶油清水。煮豆腐加筍水一茶杯。同煮熟。淘飯喫乃驗。

炙黃耆三錢 杜仲三錢

當歸五錢

炙甘草五錢

大熟地三錢

乾薑三錢

茯苓一錢

川芎五錢

丁香一錢

製首烏三錢

陳皮三錢

生芍藥二錢

白芷五錢

蘇子三錢

炒白朮三錢

木香一錢

附子二錢

肉桂一錢

右十八味爲一劑。水煨服。

經驗

同姓某年二十餘。中蠱。初中時。常在心口。皮肉刺痛。繼又移上兩胸。上兩肩。下皮肉刺痛。繼又移下右脅。腰間。皮肉刺痛。初則數月痛一次。後則一月痛一次。歹人謂之剪刀蠱也。病處其皮攏起。約四五寸長。痛甚時則兼肚脹。不出恭時而愈。則如無病。常怕寒。永不出汗。越三年餘。因喫雞鴨魚蛤等物。遂大痛。右邊半身刺痛。腰間皮內痛更甚。氣逆欲絕。予令其家人取筍水一碗。煮熱與之吃。吃後痛卽止。予曰。此中蠱也。彼疑而不信。予用蘇荷湯加酒一兩。同水久煨服。服藥後。通身發汗。其病如失。予復用雄黃五錢。研末。蒜子二三兩。菖蒲二三兩。搗爛。放滾水盆內。令病人用手巾自頭至脚。通身處處洗過。以防外蛇。是夜其人臥靜。聽如有蛇頭近身。伸舌舐之。以手摸之。則無所得。遂大驚而哭。次日變成瘡疾。身上又略痛。復用前藥煨服。則如有物會叫。自右脅腰間痛處。走入肚內。痛漸減。瘡疾亦愈。連服藥數日。小便鉢內血珠止。有三四顆。淨。次早倒尿。則鉢底有小珠八九顆。大如粟。研開。珠內有血。再服藥。越二三日。則鉢內血珠止。有三四顆。再照前方服藥。越數日。則血珠全無。此乃毒氣積成惡血。服解藥。則毒隨小便出也。每兩日一劑。服藥一月而愈。後因同人歹人買肉醺飲。其病忽翻。肚內脹滿。通身刺痛。比前更甚。命在頃刻。照蘇荷湯取服。亦不見效。予思其故。或受歹人陰害。復中蠱也。因大加薄荷二兩。蘇子二兩。白芷二兩。田州三七二錢。當歸一兩。青蒿二兩。生地。生黃耆。柴胡。元參。川芎。槐花。條參。連翹。天門冬。天花粉。黃柏。各五錢。丁香一錢。木香

一錢。其十九味爲一劑。酒一茶杯。同水煨服。一服而愈。此人年二十餘。血氣頗健。故用此重劑。後又將此十九味浸酒。加減兩數。令其人每早晚飲藥酒三四小杯。病遂全愈。

按若在酒內中蠱。則宜喫水藥。斷不可用酒。犯酒必翻。

族子某。年十六。肚內左脅常痛。忽又移過肚內右脅痛。或五六日痛一次。或二三日痛一次。或一日痛二次。或走上心痛。則心脹頭熱。滿身發熱。痛時則並不出汗。得喫肉則暫停半日。身上常有蟄行。以手捉之。則無所得。予用蘇荷湯加三七一錢。酒一兩。同水煨服。兼服馬兜鈴二兩。爲一劑。水煨服。服一月。吐出黑星十餘顆。次日屙下虬蟲數條。自後肚亦不痛。但身上之蟄行仍然。予曰。此蛇蠱已愈。并蠱未盡淨也。此後但服蘇荷湯。一年全愈。

張某中陰蛇蠱。初時如感冒風寒。四股有蚓行蟻咬。氣逆沖上。誤聽俗醫。教其喫蛇一條。于是遍身有蟲走竄。肉大跳。臥則手脚大跳。夜不得臥。危極。肚鳴肚痛。予授以蘇荷湯。酒水煨服。夜即得睡。連服二劑。次夜病翻。不得臥。彼疑藥味寒涼。不肯服。因取洋烟尿泡水喫。夜暫得睡。而病仍未愈。窮於治術。復將蘇荷湯。每劑加田州三七一錢。三日一劑。服藥兩月而愈。

李某子年八九歲。吐虬蟲不止。夜不得睡。用南薄荷。紫蘇。白芷。當歸。川芎。連翹。青蒿。槐花。生黃耆。柴胡。元參。各二錢。丁香一錢。三七一錢。水煨服數劑而愈。按凡老人幼兒中蠱。常將三七一味。切碎。蒸豬肺。成豬肉喫。甚妙。

潘某妻年三十餘。中蛇蠱。肚痛極。頃刻難忍。其戚授以三七。白芷。菖蒲。蒜子等生咬爛。滾水送。喫得吐與瀉而愈。但毒未淨。後仍常常肚痛。人漸瘦黑。積三四年。肚內如有物。會動會移。時跳上心。則心脹口涎出。得喫肉則稍止。予以紫蘇。南薄荷。元參。生黃耆。當歸。白芷。柴胡。川芎。青蒿。槐花。連翹。條參等。各三錢。服藥二劑。其毒如拳大。走在左脅下。跳動。肛門如有蠱咬。又服藥三劑。其蟲亦化不見。但其毒仍在左脅下跳動。而通身四肢以及手足指盡皆脹痛。此乃蘇荷二味藥氣到處。追其惡血。瀉下大腸。將換新血。故脹痛也。又照前方服三劑。痛愈而下。身及兩腳浮腫。其夫疑之。予曰無妨也。蘇荷湯大半皆消腫之藥。但彼之受病已久。通身皆受毒氣侵染。變爲惡血。今藥力追到。通身之血瀉下。再換新血。其脹痛浮腫者。乃惡血初瀉。新血初生故也。再服前藥三劑。每劑加田州三七一錢。而浮腫亦消。但左脅之毒。仍然跳動。再照前方服藥。其毒亦漸小。漸化。服藥十餘劑。而愈。愈後不戒口。因吃鷄魚復變。心口痛。頭痛。脹滿。不思飲食。予復用生甘草。元參。紫蘇。南薄荷。當歸。川芎。生黃耆。連翹。白芷。白芍。條參。青蒿。槐花。各五錢。三七生地。各一錢。二服而愈。後因喫狗肉病翻。復用前方治之愈。

李某妻年四十餘。中蛇蠱。初中蠱時。常在左邊脅下。腰間皮內痛。痛時其處攢起。略跳動。日間則捲如螺。大夜則伸長。約二三寸。時而此物不見。則其病如失。時而痛移上心。則心脹。得喫肉則稍止。至五六年。變成一物。有頭尾足。在肚皮內。日咬三四十次。咬時則頭痛。遍身發熱。如有蟻咬。皮內如有髮刺。夜不得臥。予用紫蘇。南薄荷。生首烏。柴胡。槐花。白芷。當歸。生黃耆。連翹。生芍。川芎。各一兩。加燒酒二兩。同水久燉服。

服藥後。此物走入肚。跳入喉嚨。不能吐出。後復下肚皮內。走竄。病人垂危之極。夜不得臥。常思自盡。因用雄黃。如法放于床上四角。以禦邪氣。病人得睡。內服前方。兩日一劑。每餐用筍水一茶杯。養菜喫。其物咬亦漸少。時而忽翻。復用巴豆驅毒散治之。其蛇漸縮小。再用前方。加鬱金。木香各三錢。服藥十餘劑。其蛇遂化不見矣。愈後。不肯戒口。肚腹復痛。又服前方一二劑。而愈。越一年。因喫蛤。其夜病大翻。肚脹身上刺痛。不得臥。肚內如有蛤叫聲。復依前方。加田州三七二錢。酒水煨服。二劑而愈。

龍某妻。年三十餘。肚常痛。誤服川山甲。肚遂大痛。吐出虻蟲十餘條。不止。其鄉無藥。予急用紫蘇。薄荷。陳皮。槐花。田州三七等味。水煨服。蟲止不吐。令其家人出縣市藥。方用紫蘇。南薄荷。白芷。當歸。川芎。槐花。青蒿。連翹。生黃耆。柴胡。條參。元參。決明子。白芍。各五錢。木香二錢。酒同水煨服。數劑而愈。

女子及笄後。常得肚痛症。痛甚。則吐。予用田州三七五錢。洋參一錢。甘草一兩。紫蘇十兩。南薄荷一兩。酒一小杯。同水久煨服。即愈。再用生首烏一兩。白芷一兩。當歸一兩。川芎一兩。紫蘇一兩。南薄荷一兩。三七二錢。槐花五錢。連翹五錢。條參五錢。生甘草一兩。水煨服。十餘劑而病愈。永不復作。

楊某者。年四十餘。得外感症。面帶青色。臥則氣逆。沖上肚皮。緊急。兼之咳嗽。內有實熱。小便黃赤。夜不得臥。誤服補藥。肚愈脹。氣愈逆。嗽愈不止。予曰。此初中生蛇蠱也。用蘇荷湯。服數劑。病大減。予囑其常用田州三七。切碎。煨豬肺。或豬肉喫。並常用蘇荷加減服。服藥二月餘。全愈。又凡中蠱氣急氣喘。脅痛。用洋參一味。生咬喫。亦驗。

老嫗年七旬餘。先有氣弱咳嗽之症。忽加中蠱。年餘。肚常痛。會動會走。腹內翻攪。脹痛。上心氣逆欲絕。不想飲食。夜不得眠。靜聽面上。如有蟻行。治方用百合五錢。蘇子三錢。南荷三錢。當歸三錢。茯苓三錢。白芷三錢。白芍三錢。麥冬三錢。連翹二錢。水煨服。照方服二劑。毒漸墜下。心不上脹痛。仍然在下部腹內走竄。如錐刺狀。再服藥四劑。瀉下黃泥水。次日瀉止。痛頗減。飲食稍加。再服藥三劑。變成痢疾。但此嫗血氣雖虛。不可用寒涼峻利之藥。亦不得十分溫補。予用百合五錢。蘇子。南荷。茯苓。白芍。麥冬。各三錢。砂仁。白朮。各二錢。乾薑一錢。水煨服。服至七八劑。毒漸墜下。病大減。但飢時。則其毒仍在內走竄。因停藥五六日。毒忽跳起。心上脹痛。如有蟲咬。方用百合四錢。蘇子。南荷。當歸。茯苓。麥冬。連翹。白芷。白芍。川芎。各二錢。水煨服。服後。即大瀉數次。病亟如前。予思老人血氣太弱。服藥宜緩。此方錢分太重。兼過於寒涼。改用蘇子三錢。當歸三七。扁豆。川芎。廣陳皮。小茴香。蘿蔔子。各一錢。水煨服。服後得吐而病退。是夜得臥。蓋毒在上部則吐。毒在下則瀉也。次日復病。用蘇子五錢。百合四錢。赤芍。陳皮。各二錢。決明子。升麻。各一錢。水煨服。服後刺痛頗減。但一至飢時。吐內如有物咬。但照前方加白芷五錢。當歸二錢。服藥數劑。復變咳嗽。乃其常病也。依前方加減。蘇子五錢。百合四錢。升麻一錢。赤芍二錢。決明子一錢。白芷五錢。當歸二錢。麥冬一錢。去心。水煨服。一劑後。喉頗涼。仍然咳嗽。前方除麥冬。服二劑後。用前方。去升麻。赤芍。麥冬。加白芍二錢。陳皮二錢。羌花五錢。當歸五錢。用水煨服五六劑。病大減。人頗康健。若停藥數日。則肚內如蛇微翻狀。但不能跳上耳。新年誤犯雞湯。兼停藥數日。病復翻。氣逆冲上。咳嗽喉苦極辣。肚脹翻攪。用蘇子三錢。廣陳

皮二錢。生首烏三錢。生甘草二錢。水煨服。一劑。病略減。再服不甚效。轉用蘇子五錢。百合四錢。白芍二錢。廣陳皮二錢。決明子一錢。白芷五錢。當歸四錢。羌花二錢。常服此方。病大減而仍未全愈。蓋老人血氣既衰。而中蠱又久。通身之血皆爲毒氣侵染。又不能受得蘇荷槐等重劑。故難全愈也。四月內停藥不服。通身脹痛。肚內復有物動攪。方用蘇子五錢。廣陳皮三錢。生甘草三錢。川芎一錢。白芷五錢。羌活三錢。鬱金一錢。三七一錢。水煨服。病減。服二劑。牙跟口脣熱爛。如蟲蝕狀。以蘇子。川芎。性太發陽故也。改用三七一錢。百合三錢。當歸二錢。生甘草五錢。白芷三錢。桔梗三錢。麥冬三錢。水煨服。四五劑。又常食三七豬肺。而病減後停藥。復氣逆咳嗽。再加三七。照前方而不效。改用半夏三錢。當歸三錢。茯苓二錢。木香一錢。五味子二錢。廣陳皮三錢。生首烏三錢。生棗仁三錢。洋參一錢。服藥三劑。頗效。復加蘇子三錢。百合五錢。南荷一錢。服二劑。忽變白痢。且兼咳嗽。想此時蠱毒已淨。受得補藥矣。因買鴨一隻。苡米煨喫。病略減。改用炙黃耆五錢。炙甘草一錢。熟地三錢。小茴香一錢。白朮二錢。杏仁四錢。去皮尖。洋參一錢。薑汁炒。首烏一錢。杜仲三錢。當歸二錢。升麻五分。服藥一劑。病大減。再將此方加減服。而全愈矣。

男子年四十餘。脾腎虛寒。常服桂附歸朮耆地薑杞等藥。忽又中蠱。肚痛。身上如蚤咬。予用溫補兼行氣散氣之藥治之。大熟地五錢。當歸五錢。川芎三錢。炒白朮五錢。炙黃耆五錢。杜仲三錢。枸杞三錢。乾薑三錢。附子五錢。炙甘草五錢。陳皮二錢。丁香一錢。木香一錢。蘇子五錢。肉桂一錢。水煨服。數劑而愈。

按若心肝二經有伏火。照方加生芍三錢。茯苓三錢。又凡虛弱之人中蠱。審係內寒無火。卽用此方。

加減可也。若非脾腎虛寒，則附子肉桂二味，必不可用。孕婦忌用附子，似蠱非蠱辨。

有氣不順而非蠱者

童子十一歲，因先年冬染感冒，病愈後，次年得氣脫症。肚內氣走動不痛，行急則略痛。氣不順，氣少不接，飲食減少，口不渴。審係氣血兩虛，其父疑爲蠱病，服蘇荷湯不愈。忽變通身皮熱如火，肚腹脹滿，不思飲食。予用大懷熟五錢，製首烏五錢，炙黃耆五錢，製白朮五錢，北五味一錢，廣陳皮二錢，炙甘草二錢，全當歸三錢，炒山藥五錢，北枸杞五錢，杜仲五錢，附子五錢，乾薑五錢，水煨滾，加邊桂一錢，研末入湯調勻服，十餘劑而愈。

男子年四十餘，命門無火，寒極作嗽，口鼻流血，臥則肚內有物，隱隱升上，稍脹上心。此乃血脫氣脫之候，前方加杏仁一錢，服數十劑而愈。

童子十五歲，先得蠱症，既愈後，時而背心忽寒，或頂心忽寒，口不渴而口唇起泡，右手食指將指及無名指生疥瘡，經年腐爛不愈，亦服上方。附子加至七錢，數劑疥瘡暫愈，後又復翻，仍然手指腐爛，兼之氣短促不順，此氣血兩虛，兼之蠱病餘毒不盡。前方加田州三七一錢，白芷三錢，丁香一錢，數劑而愈。按果係脾腎虛寒，方用得此方。

有肚痛而非蠱者

近日有酒頂病七日必愈。雙頂十四日愈。將起病前三三日手脚酸脹。次則在肚臍下痛。痛在一處不移。大便氣絕不通。小便黃赤。飲食百物皆不下。氣力如常。行動則稍快。日夜不得臥。至七日則必愈。不用服藥。愈後二三日不可下水。下水則病復翻。亦有病後寒積食積作脹作痛。亦非蟲。按酒頂病大便不通。用槐花四兩研末。同水熬酒煨熱。泡藥末喫。得瀉即愈。若係病後寒積。則槐花決不可用。至親秦某得虛寒驚悸之證。命門無火。常將炙黃耆白朮當歸熟地肉桂等藥。浸酒喫。而愈。後因出外口渴。誤喫涼水。遂變寒嗽。用熟地首烏當歸白朮杏仁乾薑炙黃耆山藥附子杜仲枸杞各五錢。北五味肉桂各一錢。水煨服。而嗽大減。忽然出恭盡帶藍色。此乃脾腎無火。不能運化穀食也。再服數劑而愈。

有心口痛而非蟲者

男子李某。先數日生一癰於腎囊下。谷道前。並不發起。忽然身體沉重。欲作吐。四肢皆麻。兼之冷顫。神昏譫語。心頭有一塊大如碗口作痛。先日好喫滾熱之茶。次日茶亦不喜吃。予曰。此必內寒也。用大熟地當歸炙黃耆川芎各五錢。乾薑炙甘草各四錢。肉桂一錢。研末水煨服。服藥後即不冷顫。心頭亦不痛。忽然谷道前之癰發起。一炷香久即穿膿。再服數劑。前病全愈矣。

有肚鳴叫而非蟲者

童子年十三。手脚常酸脹。脚底常冷。肚常鳴叫。叫時則肚痛。大便溏滯。易飢。一喫茶則肚作叫。予診其六脈無力。乃血氣也。大熟地六錢。生甘草三錢。生山藥三錢。丹皮二錢。杜仲四錢。山萸肉三錢。炒白朮三錢。