

傷寒證脈藥截江網

陶華述

中華書局

傷寒證脈藥裁江網

此據古今醫統正脈
全書本排印初編各
叢書僅有此本

傷寒證脈藥截江網

傷寒

明 餘杭節菴陶 華述

傷寒之病，非比雜科，乃大方脈之首務也。其間脈理精深，良震無常，死生反掌，甚所難明。苟或有稱治傷寒者，未免羊質虎皮，然則名譽虛隆，而實德則病矣。余早年盲學，昏昏如蠅觸壁，後得漢長沙張仲景先師治法所得石函遺著，名曰遺芳嘉祕，玩而誦之，以聞茅塞，手足舞蹈，不自知也。數試數驗，豈不珍重哉！第恐吾老悖，亦猶前之昏學，臨病無措，故將遺旨應手得心訣法，纂以成集，名曰傷寒證脈藥截江網，存與朝夕備覽，以看省己之愚。原夫傷寒之脈，浮大動數滑爲陽，沉澁弱弦微爲陰。其弦緊浮滑沉澁六者，爲殘賊之脈，故諸脈作病，春弦、夏洪、秋毛、冬石，土緩爲四季之正脈。浮、沉、遲、數爲客主，左爲人迎，右爲氣口，呼出心肺爲陽，吸入腎肝爲陰。一呼一吸爲一息，寸口爲陽，尺澤爲陰，中爲關界。陽主氣，陰主血，血爲榮，氣爲衛。寒則傷榮，風則傷衛，理自然也。所謂傷寒之病，從淺入深，先以皮膚肌肉，次入筋骨腸胃，專以浮、中、沉、遲、數辨其陰陽寒熱，及表裏虛實，而斷之矣。諸浮爲在表，輕手于皮膚之上，便得之。曰浮，略重指于皮膚之下，肌肉之上，陰陽各半，得之。曰中，證屬半表半裏，諸沉爲在裏，重手于肌肉之下，筋骨之間，方得之。曰沉，屬陰，諸遲爲在臟，屬寒，諸數爲在腑，屬熱，陰陽寒熱虛實，用在有力無力中分。有力者爲陽，爲熱，爲實，無力者爲陰，爲寒，爲虛。雜病以弦爲陽，傷寒以弦爲陰。雜病以緩爲弱，傷寒以緩爲和。傷寒以大

爲病進。以緩爲邪退。緩爲胃脈。有胃氣曰生。無胃氣曰死。傷寒病中有神脈。如脈中有力。卽爲有神。神者氣血之先也。兩手無脈曰雙伏。一手無脈曰單伏。必有正汗也。寸口陽脈中。或見沉細者。但無力者。爲陽中伏陰。尺部脈陰中。或見沉數者。爲陰中伏陽。寸口數大有力。爲重陽。尺部微而無力。爲重陰。寸口細微如絲。爲脫陽。尺部細微無力。爲脫陰。寸脈浮而有力。主寒邪表實。宜汗。浮而無力。主風邪表虛。宜實。尺脈沉而有力。主陽邪在裏。爲實。宜下。無力。主陰邪在裏。爲虛。宜溫。寸脈弱而無力。切忌發吐。尺脈弱而無力。切忌汗下。初按來疾去遲。名曰內虛外實。去疾來遲。名曰內實外虛。尺寸俱同。名曰緩。緩者和而生也。汗下後。脈靜者生。躁亂身熱者死。乃邪氣勝也。溫之後。脈來歇止者。正氣脫而不復生也。純弦之脈。名曰負。負者死。按之解索。名曰陰陽離。離者死。陰病見陽脈者生。陽病見陰脈者死。

傷寒標本論治

病之有標本。猶草之有根苗。拔茅須連其茹。治病必求其本。標本不明。處方何據。所謂瞑目夜行。無途路而可見矣。原夫六氣爲本。三陰三陽經爲標。病氣爲本。臟腑經絡受病爲標。先受病爲本。次受病爲標。且如尺寸俱浮者。太陽受病也。其經標本。膀胱小腸也。膀胱寒水爲本。其脈循脊上連風府。故頭疼脊強。小腸爲標。主發熱。其正冬月時。在本者麻黃湯。在標者桂枝湯。餘月改用沖和湯也。尺寸俱長者。陽明受病也。其經標本。大腸與胃也。大腸爲標。燥金爲本。大腸與肺爲表裏。但發熱解肌湯。本脈絡鼻循目。故日痛鼻乾不眠。虛則汗解。實則大柴胡承氣選用。尺寸俱弦者。少陽受病也。其經標本。三焦與膽也。三焦相火

本也。遊行乎一身。故微熱。足臍標也。其脈循脇絡耳。故耳聾。脇痛。寒熱。嘔而口苦。緣臍無出入之路。故從中治。證用小柴胡和解散而愈。其經有三禁。汗下。是也。尺寸俱沉者。太陰受病也。其經標本。肺與脾也。肺標脈循咽。脾本濕土。故腹滿咽乾。當得本治。宜泄。大柴胡承氣也。尺寸俱微沉者。少陰受病也。其經標本心與腎。君火爲本。心苗舌。故舌燥。標腎脈循肺。主口乾。故口乾舌燥。故在標者。因身治。主姜附也。在本者。宜下。三乙承氣。看微甚而用之。尺寸俱微緩厥陰受病也。其經標本。肝與心包絡也。風本爲本。下循陰器。故囊縮。標心包絡。繫舌。故舌卷。大抵溫之。四逆輩。其四經并前三經中。若有陽分傳來者。下之。庶不誤也。

論傷寒正治逆治反攻寒熱辨

寒熱真假。不可不知。正治逆治。豈可不辨。假如熱病服寒藥。熱不退。後用熱藥。而熱方退。假如寒病服熱藥。而寒不退。後用寒藥。而寒方退者。此爲從治也。從治者。反攻也。治熱病以寒藥而愈。治寒病以熱藥而愈者。逆治也。逆治者。正治也。且反攻之法。人亦難曉者多。如寒病服寒藥而愈者。此陽極變陰。熱極反得水化也。熱病服熱藥而愈者。此陰極變陽。寒極反得火化也。蓋物極則反也。

論傷寒用藥法則

標本逆從之既明。五劑之藥。須用識。且如表汗用麻黃。無葱白不發。吐痰用瓜蒂。無豆豉不湧。去實熱用大黃。無枳實不通。溫經用附子。無乾姜不熱。甚則以泥清水加葱白煎之。竹瀝無姜汁。不能行經絡。蜜導

無皂角。不能通秘結。非半夏夏汁。不能止嘔吐。非人參竹葉。不能止虛煩。非小柴胡。不能和解表裏。非五苓散。不能通利小便。非天花粉乾葛。不能消渴解肌。非人參麥門冬五味。不能生脈補元。非犀角地黃。不能止上焦之吐衄。非桃仁承氣。不能破下焦之瘀血。非黃芪桂枝。不能實表開虛汗。非茯苓白朮。不能去濕助脾。非茵陳不能除黃疸。非承氣不能制定發狂。非枳桔不能除痞滿。非陷胸不能開結胸。非羌活神和。不能治四時之感冒身疼。非人參敗毒不能治春癰。非四逆不能救陰厥。非人參白朮不能化斑。非理中烏梅不能治蚘厥。非桂枝麻黃。不能除冬月之惡寒。熱隨汗解。非姜附湯。不能止陰寒之泄利。非大柴胡。不能去實熱之妄言。陰陽咳嗽。上氣喘急。用加減小青龍。分表裏而可汗下。此傷寒用藥之大法也。

傷寒統論受病之由

夫傷寒者。冬時天氣嚴寒。水冰地凍。而成殺厲之氣。正乃腎與膀胱。坎水用事。體虛觸冒之人。中而卽病。曰傷寒。不卽病者。乃寒毒藏于肌膚。此因腎水涸竭。春木無以發生。熱不能發泄。藏鬱于內。遇感而發。至春變爲溫病。至夏變爲熱病。熱病重於溫病也。雖曰傷寒。實爲熱病。非時行之氣。春應燠而反寒。夏應熱而反涼。秋應涼而反熱。冬應寒而反溫。此非其時而有其氣。是一歲之中。長幼病皆相似者也。是時行不正之氣。非暴厲之氣。暴厲者疫病也。疫病者乃春分至秋分前。天有暴寒。皆爲時行之寒疫也。又有四時之正氣者。春氣溫和。夏氣暑熱。秋氣清涼。冬氣凜冽。此四時之正氣也。然正氣亦能爲病。春傷于風。夏必殭泄。夏傷于暑。秋必瘧痢。秋傷于濕。冬必咳嗽。冬傷于寒。春必溫病。總曰傷寒病。自外而入。或入于陽。或

入于陰。非但始于太陽。終于厥陰。或有太陽傷者。或有傳至一二經而亡者。或有始終只在一經者。或有赴經而傳者。或有入太陽不作鬱熱。便入少陰。而成陰證者。或有直中陰經而成寒證者。緣經無明文。故多妄治。若三陽傳至三陰之陰證。外雖有厥冷。內有熱邪耳。若不發熱。四肢便厥惡寒者。此是直中陰經之陰證也。蓋先起三陽氣分。傳入三陰血分。則熱深厥亦深矣。此亢則害。承迺制者歟。熱極反兼寒化也。先熱後厥者。傳經陰證也。故宜四逆散。大承氣。看微甚而下之。如初病無熱便厥者。此直中陰經之寒證也。宜四逆湯溫之。

傷寒無陰證辨

傷寒無陰證。人傷于寒。則爲病熱。熱病乃汗病也。造化汗液皆陽氣也。冬時腎水用事。爲傷寒者。其風傷于榮衛。使人毫毛畢直。皮膚閉而爲熱。初入太陽。膀胱受證。頭疼惡寒發熱。腰脊強直。按至皮膚之上。下手便得。脈來浮緊有力。無汗爲傷寒表證。寒則傷榮血。冬用麻黃湯開發腠理。表汗除邪。脈來浮緩無力。有汗怕風爲傷風。風則傷衛氣。冬用桂枝湯充塞腠理。止汗散邪。其餘月時雖無惡寒爲重也。治三時感寒。無汗以羌活沖和。去地黃加紫蘇養香以發散之。有汗用加減羌活湯。如用桔梗湯止汗退邪。必加涼藥于中。免斑出黃生之患。此謂無伐天和也。若將冬時正傷寒之藥。通治非時暴感寒熱。定爲害矣。

論傷寒難拘日數辨

假如一日至十三日。若有一毫頭痛惡寒者。每日如此。不論日數多少。尚有表證未解。還用微汗。不可攻。

裏。若攻下之。則爲結胸等證也。

一二日惡寒皆除。便覺胸中滿悶疼痛。大便閉。渴而不惡寒。反怕熱。熱入裏也。大柴胡承氣下之。切不可拘于日數。并始太陽終厥陰之論也。

二三日邪傳陽明。身熱日痛。鼻乾不眠。按至皮膚之下。肌肉之間。脈來微洪而長者。屬半表半裏。渴而無汗。葛根湯。渴而有汗。人參白虎湯。微微惡寒者。桂枝湯。若無頭疼惡寒。而反怕熱。便閉。燥渴。狂言。譫語。揭去衣被。揚手擲足者。此爲熱邪傳入陽明之本。脈來沉數有力。正宜承氣湯下之。泄去胃中實熱。燥屎而愈也。

三四日邪傳少陽膽。胸脇痛而耳聾。寒熱。嘔而口苦。按至半陰半陽。及脈來弦數者。是半表半裏也。緣膽無出入之路。用小柴胡。其經有三禁。汗下吐也。蓋陽明與少陽三經不從乎中治也。中者半表半裏。兩陽交中。名曰少陽也。

四五日邪傳太陰脾。腹滿咽乾。口燥而渴。按至筋骨之間。脈來沉而有力者。桂枝大黃湯。若不渴自利。身無熱。脈來沉緩無力者。四逆湯溫之也。

五六日邪傳少陰腎。口乾口燥。重指按至筋骨之間。脈來沉而有力者。正用大柴胡承氣下之。若發渴自利。清水不多。腹脹者。亦當下之。俱是陽邪傳入陰經之陰證也。若有一時初起。不入太陽。竟入太陰。無頭疼身熱。便見四肢厥冷怕寒。或腹痛自利。小便清白。脈沉無力。或脈全無者。此是直中陰經之陰證也。非

是三陽傳來。急用附子理中湯溫之。脈沉有二。陰陽寒熱虛實。用在有力無力中分。有力爲熱。無力爲寒。又有少陰太陽二證相併。脈沉無力。當無熱。今反有熱。如不頭痛者。陰證反陽也。麻黃細辛湯。身發熱。脈當浮大。今反沉細。若有頭痛者。陽證反陰也。四逆湯主之。

六七日邪傳厥陰肝。煩渴。囊縮。舌卷。耳聾。身不熱。大便閉。按至筋骨之間。脈實絃而有力。正用承氣下之。此邪從三陽傳入三陰。外有厥冷。內有邪熱耳。如脈微而無力。腹痛自利。不渴。四肢厥冷。怕寒者。真陰寒證也。附子理中湯溫之。口中出沫流涎者。亦寒也。茱萸理中湯主之。

傷寒陽厥陰厥辨

陽厥。脈沉而有力。腹痛後重。大便稠粘。小便赤澀。或大便不通。必是先熱後發厥也。其四肢雖冷。上不過肘。下不過膝。此熱深陽厥也。承氣湯下之。陰厥。脈沉而無力。口不渴。四肢痛甚。及大便泄利。小便清白。而身怕寒。面如刀刮。四肢厥冷。上過乎肘。下過乎膝。此陰厥也。四逆湯治之。兩陽交盡。名曰厥陰也。大抵三陰無傳經。胃實熱。可下也。又有傷寒兩感者。病爲巨陽老陰也。

看傷寒識證內外須知

大抵傷寒先須識證。察得陰陽表裏。虛實寒熱。親切復審。汗吐下溫和解之法。治之庶無差誤。先看兩目。次看口舌。後以手按其心胸。至小腹。有無痛滿用藥。如目皆黃。必爲欲愈之病也。眼胞忽陷。目睛直視。必難治也。開目欲見人。屬陽。閉目不欲見人。屬陰。目睛不明。神水已竭。不能照物者。亦難治也。

次看口舌。上有白胎者爲熱。見黃胎者爲熱甚。見黑胎及生芒刺者必死。後按其心胸。有痛而滿悶者。亦未經下之。爲表邪尚在少陽部分。只用小柴胡湯。加枳殼桔梗爲的。如按其心下滿痛甚者。已經下矣。爲結胸。正用陷胸湯。看微甚而用之。陷胸宜從緩治。結胸證煩躁悉具者死也。

如小腹覺有硬痛。當按其痛。更問其小便通利若何。如通。則知畜血下焦。宜破瘀血。用桃仁承氣湯。盡黑物爲好。如小便不通。則知津液留結。宜五苓散。如木通山梔治之。

但覺發熱惡寒。頭痛。腰脊強。脈浮。不拘日數。即是太陽表證。浮緊有力。無汗。爲傷寒。宜發汗。浮緩無力。有汗。爲傷風。宜實表。

但見肢痛。咽乾而渴。身無熱。手足溫。脈沉有力。明是熱邪傳來太陰裏證。宜當下之。如肢痛。自利不渴。惡寒。手足厥冷。脈沉無力。此是太陰自受陰也。宜當溫之。

但見口燥。咽乾而渴。妄語。怕熱。大便閉。或微利清水而大渴。脈沉有力。明是熱邪傳來少陰裏證。不拘日數。即宜下之。如肢痛。泄利。嘔吐。怕寒。手足厥冷。不渴。脈沉無力。此是少陰直中。自受內寒。陰證。急用溫之。但見舌卷囊縮而渴。身不熱。外雖四肢微冷。內有實熱。脈來沉緩有力。或大便閉實。明是熱邪傳來厥陰之證。即宜下之。如肢痛。泄利。嘔吐。不渴。怕寒。四肢厥冷。小便清利。脈微無力。此是厥陰自中其寒證也。急宜溫之。俱照前六經中用藥。其一切躁渴。大便閉。發狂。譫語。腹滿。微厥。斑血證。脈來有力者。俱是從三陽

邪熱傳入三陰裏證。宜當下之。輕重用藥無疑。如寒當急溫之。不可緩也。有傷寒一日傳二經爲兩感。三日傳盡必死。再傳止于六日。夫兩感發于表者。麻黃葛根湯也。攻裏者。調胃承氣湯也。如未盡善。須問病者有無痛處。大小便通利。若胸痛者爲結胸。不痛者爲痞氣。乃因下早而成也。未經下者。非結胸也。乃表邪傳至胸中。症雖滿悶。尙有表邪未及乎腑。正屬少陽部分。用小柴胡湯加枳殼以治之。如未效。以本方加小陷胸湯服之而愈。痛甚者。大陷胸湯下之。

論傷寒傳足不傳手之誤

傷寒傳足不傳手。此謬言也。人之一身無非血氣。且風行水動。氣行血流。晝夜循還而運行不息。豈有不傳手經哉。何所據也。冬月腎水用事。天氣嚴寒。則是少陰太陰正司受傷。三經最多。其次是少陽厥陰。肝膽繼冬而施春令。蓋風木起于大寒之次。即正當十二月中。至春分。方行溫令。故風寒傷之。足陽明太陰脾胃中土。中土無定位。無成名。寄旺于四時。寒熱之氣。皆能傳也。其邪亦歸于胃。其手之經主于足。故不傷也。若言傷足不傷手。正理也。若言傳足不傳手。非理也。

論傷寒六經變正法

夫六經傳變所由。必須緊記。誦不釋手可也。且如鄭聲者。手足鄭重。冷而爲虛也。譫語有虛有實。虛則失血亡陽。實則內熱便閉。脾約者。大便秘而小便利。水穀不化。臟寒也。久利不止。曰腸澼。傷寒十三日不好。曰過經。吐長蛇。曰虵厥。陰厥發燥。曰陰燥。手足冷者。爲之厥。指頭微寒。情之縱。汗吐下溫不好。曰壞證。又

若何爲逆。逆而有四。或變爲溫病。或變爲風濕。或變爲溫毒。或變爲瘟疫。此四者是也。發汗出不止曰漏風。亦爲亡陽。大下損血爲亡陽。陽證汗出不止曰亡陽。大取汗發證者曰亡陽。大抵皆無汗。其有汗者曰亡陽。三月至夏方發爲晚發。冬感寒而春發者曰溫病。非時暴寒伏于少陰之經。咽痛下利。名曰腎傷寒。發汗後身灼熱者曰風溫。名中喝。感四時不正之氣。老幼相似者。爲疫癘。病瘥後必發者曰勞復。病瘥後多食而發者曰食復。病瘥後發熱者曰遺熱。吐利交作曰霍亂。鼻中出血曰衄。逆咳者曰嗽。乾嘔者曰噦。大便挾寒下利曰腸垢。大便堅硬曰鞭。心振寒而動曰悸。渴飲水而吐曰水逆。心中搖亂不安而悶者曰懣懣。皮膚不知痒痛者曰不仁。振握而動曰肉瞤。筋惕。脰下有動氣曰奔豚。上有吐者曰湧之。下利者曰洩之。手足攣搖者曰瘰癧。四肢風病曰未疾。厥而下利。當不食。及能食者曰除中。三陰無合病。三陽俱病者曰合病。二陽先病。後一陽自病曰併病。溲泄之所曰溲曰理。婦人之中二曰理也。

論傷寒見證識病法

傷寒之病。從表入裏。裏必達外。見證之由所屬。必相審。治庶無誤也。且如頭病項強者。太陽證也。頭搖者。裏病也。頭汗者。裏有瘀血必發黃也。面戴陽者。下虛也。面慘不光。傷寒也。面光不慘。傷風也。面上乍黑乍白。唇口生瘡。狐惑也。面如錦紋者。陽毒也。口難言。血少也。舌上有白胎黃胎。內熱也。或黑者。熱極也。鼻燥。漱水不下。或目瞑。溺血也。目睛黃。小腸熱也。懷懷者。胃虛也。喜惡如狂。畜血也。肉瞤筋惕。汗下虛也。身如被杖。陰毒也。一身盡痛。多眠。或微腫難轉者。風濕也。身目俱黃。濕熱疸病也。身如蟲行。表虛也。背惡寒。陰

勝寒也。不眠。因汗下多而神虛也。坐而伏者。短氣也。下利清穀。內寒也。咽中生瘡。上實下虛也。舌上生刺。熱盛也。利者熱盛也。又手冒心。因汗多而血虛也。腹滿手足溫者。邪入太陰也。舌卷囊縮。邪入厥陰也。

論傷寒有證見之必死法

夫傷寒死證。一一須明。生死不明。將何措手。非惟有干名節。亦且投藥無用。且赤斑者五死。五生。黑斑者十死。一生。陽證見陰脈者死。發少陽汗。連厥陰血者。厥竭而死。發左右通氣汗者死。發風濕者死。發陰陽毒過六七日死。太發濕家汗。成痼熱而瘥者死。發熱。發少陽汗。譫語者死。發溫家汗。爲重暍者死。兩感傷寒者死。有汗不爲汗衰。爲陰陽交者死。結胸證悉具。煩躁者死。狂言不食者死。發厥肌冷而發躁。無時得安者。口臟厥而死。結胸舌上生胎。爲臟結者死。咳逆不止者死。舌卷囊縮者死。少陰吐利煩躁。四逆者死。結胸證煩躁悉具者死。少陽與陽明合病。下利脈長大。名曰負。負者死。目亂無神氣。目無精者死。男子病新瘥。婦人與之交。曰陽易。婦人病新瘥。男子與之交。曰陰易。男子陰腫小腹痛。婦人裏急連腰股。眼昏四肢拘急。爲女勞復者死。厥利本不能食。反能食。爲除中者死。傷寒七八日大發熱。汗出不止。如貫珠。此本氣衰者死。爪甲青。爲陽衰者死。循衣摸床。喘而不休。衛氣絕者死。柔汗爲冷。汗出發黃者。乃脾絕也。死。唇吻反青。乃肝絕也。死。環口黎黑。脈絕也。死。直視搖頭。心絕也。死。面黑遺尿。腎絕也。死。聲如鼻鼾。肺絕也。死。身體如蠶。正氣脫也。死。喘而不休。邪氣勝也。死。水漿不下。胃氣絕也。死。形體不仁。榮衛不行也。死。乍靜乍亂者。死也。

論婦人傷寒與男子不同治法

曰夫天地陰陽各有分位。傷寒雜病。豈無各科。男婦何可同治也。男子調氣爲主。女子養血爲先。女子血畜。則血室不畜。二氣和平。一有凝結。水火相刑。凡氣口緊盛者。卽宜下。人迎緊盛者。卽宜汗。但婦人左關浮緊者。不可下。當發汗以救血室。榮衛得和。津液得行。浹然汗出而解。凡婦人經水適斷。晝則明了。暮則譫語。如見鬼狀。此爲熱入血室。無犯胃氣。及上中二焦。言無犯胃氣者。謂不可下也。以小柴胡湯主之。若行陽道。則熱入胃。令津液燥。中焦上焦不榮。成血結胸。須針期門可也。但婦人傷寒。發熱惡寒。四肢拘急。口燥舌乾。經脈凝滯。不得往來。以桂枝紅花湯。

若傷寒。口燥咽乾。不思飲食。以黃芩芍藥湯。

若傷寒喘急煩燥。戰而作寒。陰陽俱虛。不可下也。以小柴胡湯。

若傷寒經水適來。邪乘虛而入。晝則明了。暮則譫語。如見鬼狀。此爲熱入血室。無犯上中二焦胃氣者。宜小柴胡湯。

若傷寒瘧後。猶有餘熱不去。謂之遺熱。宜地黃湯主之。

論妊婦傷寒又與前證有易法

黃帝內經曰。有故無殞也。大積大聚。不可犯也。損其大半而止。過則殺也。且妊婦傷寒。保胎宜阿膠散。大抵妊婦傷寒。仲景無治法。最宜避忌諸藥。不可以尋常例視之。凡妊婦用安胎飲。散寒邪。以白朮湯。

妊婦增寒壯熱宜發其汗以芍藥湯。

妊婦或中時行洒淅寒熱作寒振慄而悸如嘔者宜蘇木湯。

妊婦傷熱嘔嘔欲眠不欲食脇下痛嘔逆痰氣及產後病傷風熱入胞宮寒熱如瘧并經水適來適斷病後勞復餘熱不解以黃龍湯。

妊婦頭目眩疼壯熱心躁以旋覆花湯。

妊婦發斑以梔子大青湯。

產後傷寒與胎前有別法

且產婦始生氣血俱虛外失衛護內無主持最宜調養設受風寒豈能救治故與胎前不同且產後十數日不解頭痛惡寒時時有熱心下堅乾嘔汗出以陽旦湯。

產婦忘津液大便多秘或譫語煩燥宜服神功丸。

產婦頭疼身熱兼腹內拘急痛疼以桂心牡蠣湯。

產婦傷風發熱面赤而喘頭痛以竹葉防風湯。