

傷

寒

心

要

鑑
洪
編

中
華
書
局

傷寒心要

此據古今醫統正脈
全書本排印初編各
叢書僅有此本

傷寒心要

元 都梁錫 洪編

傷寒心要論

夫傷寒者前三日在表法當汗。可用雙解散連進數服必愈。若不解者病已傳變。後三日在裏法當下。殊不知下之太早則表乘虛入裏遂成結胸虛痞懊憹斑疹發黃之證。輕者必危。危者必死。但當以平和之藥宣散其表和解其裏。病勢或有汗而未愈。或無汗而愈。當用二小柴胡涼膈天水三藥合而服之。

病若半在表半在裏法亦當和解。三小柴胡涼膈主之。

若裏熱微者則當微下。四大柴胡合解毒湯主之。熱勢未退。又以大柴胡合三一承氣下之。兩除表裏之熱。病至七八日裏證已甚。表熱漸微。脈雖浮數。則以三一承氣合解毒下之。

其病胸膈滿悶。或喘或嘔。陽脈緊甚者。可用瓜蒂散涌之。

汗吐下三法之後。別無異證者。涼膈散調之。

病熱已去。微熱者。以益元散服之。無令再病。此傷寒治法之大要也。

或傷風自汗。脈浮緩者。十雙解去麻黃以汗之。

其病半表半裏。十一白虎湯和解之。

病在裏。脈沉細者。無問風寒暑濕。或表裏證俱不見。或內外諸邪所傷。有汗無汗。心腹痛滿。譫語煩躁。畜熱內盛。但是脈沉者。並用十二承氣合解毒下之。

或中暑自汗。

解以白虎湯。直格云。夏至前爲溫。夏至後爲暑。是以至後不用白虎。宜乎局方云。立秋後不用白虎。子和云。若有白虎證。亦不用乎。却用詳審之耳。

白虎解後。

以五苓合天水調之。多進數服。無妨。或腹脹滿。脈沉者。

亦當承氣合解毒微下之。

或發汗之後。熱不解。脈尚浮者。十六白虎加蒼朮再解之。

或裏熱內盛。陽厥極深。皆因失下而成此證。以致身冷脈微。昏愒將死。切不可得。以寒藥下之。誤下卽死。又一輩庸醫。妄言是陰厥。便欲易換。用玄武四逆溫熱之劑投之。下咽立死。殊不知此證。乃陰耗陽竭。陰氣極弱。謂之耗陽厥。極深謂之竭。畜熱怫鬱。將欲絕者。當此之證。寒劑熱劑。俱不可投。但進涼膈解毒。十七以養陰退陽。宣散畜熱。脈氣漸生。得大汗而愈。有無汗氣和而愈者。

未愈。却解毒令承氣十八下之。次以解毒涼膈天水合而爲一。十九調和陰陽。洗滌臟腑。則其他別證。自不生矣。

有大下之後。熱不退。再三下之。熱愈盛。若下之不愈。脈微氣虛力弱。不加以法。則無可生之理。若輟而不下。則邪熱極盛。陰氣極衰。脈息斷絕。必不可救。似此之證。是下之亦死。不下亦死。醫者到此。活人殺人。一彈指間。其不至手足失措者。幾希矣。直格云。傷寒汗後汗出不解。或反不汗。脈尚浮。白虎加蒼朮湯再解。神汗止身涼。此通仙之法也。如此則汗下之後。熱不退。不問有汗無汗。均宜白虎加蒼朮解之。又加人參亦妙。仍服涼膈解毒調之。

經云。三下而熱不退者即死。後人有四五次下以十數行而生者。此乃誤中耳。活者未一二。死者千百。後學切不可以爲法。但當依前用解毒合涼膈調之。使陽熱徐退。陰脈漸生。庶不失人命。

若傷飲不解散。成結胸之證。臨時擇用二十大小陷胸湯丸累下之。脈浮者不可下。是表證未出。小柴胡合小陷胸湯二十一投之。脈雖浮而熱大極者。二十二承氣徐徐疎利之。或有留飲過度。濕熱内生。自利不止。其熱未退。二十三解毒湯治之。

陽毒生斑。二十四涼膈加常歸。

怫鬱熱盛。在表燥而無汗。濕熱在裏。不能發於外。相搏遂成發黃。二十五茵陳湯調五苓散。甚者二十六茵陳合承氣下之。

煩心不得臥。二十七梔子湯。

悞下太早。遂成結胸。虛痞。二十八涼膈加枳殼桔梗。剛柔二症。譫語發狂。踰垣赴井。皆陽熱極盛者。二十九承氣合解毒下之。

汗下之後。煩渴飲水。則三十涼膈減桂五苓甘露益元選而用之。小便不通。五苓泄之。大便閉結。承氣下之。更有外證加減通聖散。方內隨證用藥。

婦人證治皆然。惟孕婦三四月并七八月不用硝。其餘月分用之無妨。

小兒減劑服之。

此中有古人治傷寒不傳之妙。後之學者。其慎寶之。

〔第一〕雙解散

防風通聖散

防風去蘆川芎

當歸焙

赤芍藥

大黃

麻黃

連翹

芒硝半兩

石膏

黃芩去腐

桔梗一兩

甘草二兩

滑石三兩

荆芥

白朮

梔子二錢半

右爲散。每服三錢。水一盞。薑三片。煎六分。溫服。大黃芒硝麻黃三味對證。旋入自利。去大黃芒硝。自汗去麻黃。

天水散 益元 六一

滑石六兩 甘草一兩

右爲末。每服三錢。溫蜜水調。暑月冷水亦可和解。傷寒傷風發汗。葱白五寸。豆豉五十粒。煎一盞。調四五錢。并三服。解利爲度。加薄荷尤妙。

通聖合益元

右七兩和勻。每服三錢。水一盞半。葱白五寸。豆豉五十粒。薑三片。煎一盞。溫服。

〔第二〕小柴胡。涼膈。天水合服。

小柴胡湯

北柴胡^{三兩}黃芩

人參

半夏

生薑

甘草

大棗^{一兩}

右爲散每服五錢

涼膈散

連翹^{二兩}梔子

大黃

薄荷

黃芩^{一兩}甘草

芒硝

右爲散每服三錢水一盞煎七分入蜜少許竹葉五片

〔第三〕涼膈合小柴胡

〔第四〕大柴胡合黃連解毒湯

大柴胡湯

柴胡^{去苗}大黃^{半兩}黃芩

白芍藥^分半夏^{泡七次}二錢

枳實^生三錢

右爲散分三服水一盞半生薑三片大棗一枚煎半盞溫服

黃連解毒湯

黃連 黃蘗 黃芩

梔子等分

右爲散每服半兩水一盞煎五分溫服

〔第五〕大柴胡合三一承氣湯

三一承氣湯

傷寒心要

大黃

芒硝

厚朴

枳實各半兩

甘草一兩

右剉，每服二錢半，水一大盞，薑三片，煎六分，入硝，再煎一二沸。

〔第六〕承氣合解毒湯。

〔第七〕瓜蒂散。

瓜蒂

赤小豆等分

右爲末，豆豉湯調下一錢，未吐再服。

〔第八〕涼膈散。

〔第九〕益元散。

風

〔第十〕雙解散。

〔第十一〕白虎湯。

知母兩半 甘草一兩 粳米一合 石膏四兩

右剉，每服五錢，水一觔，煎六分，溫服。

〔第十二〕承氣合解毒湯。

暑

〔第十三〕白虎湯。

〔第十四〕五苓散合天水散。

五苓散

豬苓

茯苓三錢
去皮

官桂一分 澤瀉一兩 白朮一錢

活人書三分 宜明論半錢

右細末

〔第十五〕承氣合解毒湯。

〔第十六〕白虎湯加蒼朮。

〔第十七〕涼膈合解毒湯。

〔第十八〕解毒合承氣湯。

〔第十九〕解毒涼膈天水合。

結胸

〔第二十〕大小陷胸湯丸。

大陷胸湯

大黃

芒硝三錢 甘遂三字匕

右到四錢水一饒煎大黃六分內消再煎一二沸內甘遂溫服未利再與。

傷寒心要

小陷胸湯

半夏四錢生薑切

黃連二錢栝樓實牛黃全剉

右剉水三盞煎栝樓至盡半內藥煎至一盞分作兩服。

大陷胸丸

大黃半兩葶藶二錢芒硝一錢

杏仁十二枚去皮尖

右大黃爲末研葶藶杏仁爲膏圓如彈子大甘之末三字蜜半匙水一錢煎半錢溫服一九一宿乃下未利再與。

〔第二十一〕小柴胡合小陷胸湯。

〔第二十二〕承氣湯。

大黃鋪紋者芒硝林頭有芒頭者厚朴去殼枳實各半

右剉如麻豆大分一半用水一碗半生薑三片煎至六分納硝煎一二沸絞去滓熱服。

〔第二十三〕解毒湯。

發斑

〔第二十四〕涼膈散加當歸。

發黃

〔第二十五〕茵陳湯調五苓散。

茵陳湯

茵陳一兩 大黃半兩 梔子十箇

右剉水二盞煎一盞溫服利爲度。

〔第二十六〕茵陳合承氣。

煩心不睡

〔第二十七〕梔子豉湯。

梔子七箇 豆豉二合

右水二盞先煮梔子盡半內豉煮半盞。

〔第二十八〕五苓空腸煎涼膈加桔梗枳殼。

剛柔二瘕

〔第二十九〕承氣合解毒湯。

汗後煩渴

〔第三十〕涼膈減桂 五苓 甘露 益口

傷寒心要

傷寒心要

甘露飲

茯苓

澤瀉

甘草

石膏

寒水石二兩
白朮

桂枝

豬苓半兩
滑石四兩

右爲末。每服三錢。湯調。或新汲水。薑湯尤妙。

右共十八方。如無大承氣。係第五三一承氣代之亦妙。通三十九件藥味。調理傷寒。曲盡其妙。百發百中。後之學者。詳辨脈證。審而用之。起沉痾於指掌。策奇功以活人。方知其妙也。

新增病後四方

小半夏湯。治汗下後嘔吐不已。

半夏五兩
赤茯苓三兩

右剉。每服半兩。水二盞。煎至一盞。投薑汁更煎一二沸。

五味子湯。治汗下後氣閉咳嗽。

五味子兩

半

麥門冬

人參

杏仁

陳皮

生薑一錢

棗子二枚

右剉。每服二錢。水二觔。煎一觔。作二服。

大橘皮湯。治汗後胃虛。

陳皮

甘草一兩
人參二兩

右剉。每五錢。水盞半。薑二片。煎至一盞。溫服。

赤茯苓湯。治胸膈滿悶。頭痛已得汗者。

陳皮

甘草

人參

半夏

川芎

白朮等分

右剉。每服五錢。水盞半。薑三片。煎一盞。溫服。

傷寒心要餘論

五臟六腑。應五運六氣。凡病微則當其本化。甚則兼其鬼賊之化。亢則害。承乃制。微則是其本經本臟之本化。造化之化也。病甚則如金衰不能制木。木則生火。木火者皆陽也。故風火多兼化。則風熱相搏。賊其金也。

臟腑之氣。應乎三陰三陽。實則行乎本化之氣。瀉之。衰則行其勝已之氣。瀉之。是爲殺其鬼賊也。

如諸陽畜熱。以涼膈合解毒服之。解散極熱。

如瀉火熱。解毒調胃承氣是也。

如吐法。用二仙散。

如調理傷寒。白虎涼膈合服解之。

傷寒三日。以裏連進雙解。如無汗。必是傳變。待三四日之間。以小柴胡解表裏之熱。仍間服白虎涼膈。繼熱七八日之間。欲下而表證猶在。以大承氣湯。大柴胡湯。雙行并煎。攻裏發表。最爲穩當。若是溫熱內甚。

自利者止涼膈。卻進解毒。間白虎服之。或惡心乾嘔吐者。白虎大作一劑。調解毒末五錢服之。即止。大小便不通。併有腹痛不能忍者。以無灰酒煎朴硝三兩。熱服即愈。亦按從治之法也。熱中伏寒下之已。或大承氣湯加木香瀉之尤妙。

傷寒久下。始病時。又誤服麻黃熱劑。大甚必致熱極。或有陽厥極深。身冷脈微。陽極似陰之證。庸醫以爲陰證是也。須當急救其陰。以白虎涼膈日進三服。脈氣漸生。身體漸溫。然後以大承氣下之。夫大承氣救急之妙劑。如咽膈吐逆不利。當令熱服。開其鬱結。利而即愈也。

如傷寒汗下之後。自汗虛熱不止。於白虎湯加人參蒼朮一服如神。汗止身涼。此法至妙。不容詳盡。如赤白痢。先服黃連阿膠丸。次服解毒湯。

傷寒瘡瘍。破傷風。與傷寒治法一同。但以雙解涼膈白虎承氣臨時斟酌用之。雙解涼膈白虎瀉心。此理傷寒之妙劑。

孕婦臨月可服。益元涼胎。產後仍服。如血不盡。則以涼膈與四物合煎調理。經血甚者。大承氣合四物。乃瀉中有補也。

涼膈同四物。名玉燭散。婦人產後之妙劑。

涼膈四物合大承氣湯。名三和湯。

大承氣合四物治婦人一切血積血聚等疾。加紅花尤妙。初生小兒。五七日有熱證。不得已。只以益元散。

時時灌之。如小兒夜啼。用涼膈調之。肚饑臨睡服。
凡瘡瘍癰瘰。涼膈加當歸治之。