

產育寶慶集
衛生家寶產科備要（一）



漢書卷之九
卷之九



產
育
寶
慶
集

郭稽中纂

中
華
書
局

序

妊娠之理。內經定以十月爲正產者。尙以間有過期者。蓋古之賢聖之生如此。然聞其語。未見其人也。比年以來。妊之過產者。遠者不得而知。近在燕趙間。時復有之。方妊之初也。信其爲妊。及其過產。則反疑其非妊也。問之產媼。則曰未之見也。問之名醫。則曰出月。出月者貴。問之方士。則曰妖也。以妖治之。問之庸醫。則曰病也。以病治之。二者俱失。至有母子俱不救者。旣而方知其妊也。雖悔其可追耶。余聞之甚可悼矣。恨無可考之方以破其惑也。一日過醫公李寧之家。示一書曰產育寶慶集。披讀一二。蓋宋儒李師聖郭稽中楊子建輩之所編集。至生產篇云。婦人懷胎有七月八月九月十月而產者。亦有經一年至二年四年五年而後產者。蓋人之生。陰注陽定。自有時日。不可改移。今獨限以十月。似爲未盡。讀不終篇。不覺屢嘆。惜乎此書在世希有。若能廣傳。使天下共知。則人生安得罹殤天之禍乎。意謂婦人方經雖多。而產書難其全者。若是一或廢失。世間必不復有也。因問誰氏之書。公曰。外郎楊士表所秘藏也。輒親往謁。告以情實。求之。忻然見許。遂得原書印本。方議刊行。公曰。此止一產書也。若更將御藥院雜病方論并入。月產圖體。元子借地法。安產藏衣方位。附之。合爲一集。可爲完書矣。余喜從之。猶恐有錯謬未盡者。更命諸名醫復加校正。余謂公曰。書則完矣。當如之何矣。參謀周德甫聞之。毅然贊成。遂命工刊行。自今以始。庶令妊婦得安。產媼無失。家自可以修藥。人自可以爲醫。來者可知而傳之愈廣矣。冀致君序。

產育寶慶集卷上

宋郭稽中纂

第一論曰。熱疾胎死腹中者。何答曰。因母患熱疾。至六七月以後。臟腑極熱。薰灼其胎。是以致死。緣兒身死。冷不能自出。但服黑神散。煖其胎。須臾胎氣溫煖。即自出。何以知其胎之已死。但看產婦舌色青者。是其驗。

黑神散

桂心 當歸 芍藥 甘草炙 乾薑炮 生地各一兩 黑豆炒去皮 附子炮去皮臍

右爲末。每服二錢。空心溫酒調下。一法無附子。有蒲黃。

陳言評曰。夫妊娠謂之重身。二命係焉。將理失宜。皆能損胎。不特病薰灼所致。或因傾仆驚恐。出入觸冒。及素有癥瘕積聚。壞胎最多。候其舌青。即知子死。養胎論云。而青舌赤母死。子生。青唇吐涎。子母俱死。又有雙懷二胎。或一死一生。其候尤難知。是非臨期觀變。未易預述。不可不備述也。然以黑神散溫胎。未若補助產母。使其氣正。免致虛乏困頓。胎自下矣。催生丹殊勝黑神散。

催生丹

治胎死腹中。或產母氣乏委頓。產道乾澀。
蒼朮米泔浸 桔梗二兩 陳皮六錢 白芷 桂心 甘草炙各三錢 當歸 川烏頭炮去皮尖 乾薑炮 厚朴製

南星炮附子

炮去皮
臍

半夏

湯洗七
次

茯苓

芍藥

各二兩

杏仁

炒去皮
尖

阿膠

銹炒各二
錢五分

川芎

錢半

枳殼

銹炒
四錢

南木香一錢

右爲末每服一二錢溫酒下覺熱悶用新汲水調白蜜服

第二論曰難產者何答曰胎側有成形塊呼爲兒枕子欲生時枕破與敗血裏其子故難產但服勝金散逐其敗血卽自生若逆生橫生並皆治之

勝金散

麝香一錢

鹽豉

一兩用舊青布裹了燒令通
紅急以乳鉢搗碎爲末

右共爲末取秤槌燒紅以酒淬之調下藥一錢七

陳言評曰產難不只胎側有兒枕破裏凝隨其胎息因緣自有難易其遇橫逆多因坐草太早努力過多兒轉未逮或已破水其血必乾致胎難轉若先露脚謂之逆先露手謂之橫法當以微針刺之使自縮入卽服神應黑散以固其血必自轉生養生方云倉皇之間兩命所係不可不廣傳蓋贊黑散之功也或以鹽搽兒脚底抓搔之

神應黑散

治橫生逆生難產

百草霜

香白芷各等
分

右爲末每服二錢童子小便好醋各一茶脚許調勻更以沸湯浸四五分服止一服見功甚者再服卽

分娩矣。一名烏金散。

第三論曰。胎衣不下者何。答曰。母生子訖。血流入衣中。衣爲血所脹。是故不得下。治之稍緩。脹滿腹中。以次上衝心胸。疼痛喘急者難治。但服奪命丹。以逐去衣中之血。血散消脹。胎衣自下而無所患。

奪命丹

附子

半兩。炮去皮。臍。

牡丹皮一兩。

乾漆一分。搗碎炒煙盡。

右爲末。醋醋一升。大黃末一兩。同熬成膏。和藥丸如桐子大。溫酒下五七丸。不以時。

牛膝湯 治產兒已出。胞衣不下。臍腹堅脹急痛甚。及子死腹中不得出。

牛膝

酒浸。

瞿麥各四兩。

滑石八兩。

當歸酒浸。

木通各六兩。

葵子五兩。

按陳言第三論評闕。

第四論曰。產後血暈悶者何。答曰。產後氣血暴虛。未得安靜。血隨氣上。迷亂心神。故眼前生花。極甚者令人悶絕。不知人口。噤神昏氣冷。醫者不識。呼爲暗風。若作此治之。病必難愈。但服清魂散即愈。

清魂散

澤蘭葉

人參各一分。

荊芥穗一兩。

川芎半兩。

右爲末。溫酒熱湯各半盞調一錢急灌之下咽即開眼。氣定省人事。陳言評曰。產後眩暈。頃刻害人。須量虛實爲治。若胸中宿有痰飲。阻病不除。產後多致眩暈。又血盛氣

弱氣不使血逆而上攻此等皆非清魂可療仍用半夏茯苓湯血壅須用牡丹皮散但駛藥尤難輒用當識輕重所謂擾乎可擾擾亦無擾若氣血平人同去血多致暈者芎藭湯尤佳

半夏茯苓湯

半夏湯洗三兩

茯苓熟地各一兩

陳皮

細辛

蘇葉

川芎

人參

芍藥

桔梗

甘草各六錢

右咬咀每服四大錢水二盞薑七片煎七分去渣空心服下有客熱煩渴口生瘡者去陳皮細辛加前胡知母腹冷下利者去地黃入桂心炒胃中虛熱大便秘小便濇加大黃一兩八錢去地黃加黃芩六錢

牡丹皮散

治產後血暈悶絕狼狽若口噤則拗開灌之必效

牡丹皮

大黃蒸

芒硝各一兩

冬瓜子半合

桃仁三七粒

去皮尖

右咬咀每服五錢水三盞煎至一盞半去渣入芒硝再煎分二服欲產先煎下以備緩急金匱以此治腸難但分兩少異

芎藭湯

方在第十論

第五論曰產後口乾痞悶者何答曰產後榮衛大虛血氣未定食麵太早胃不能消化麵毒結聚於胃脘上薰胸中是以口乾煩渴心下痞悶醫者不識認為胸膈壅滯以藥下之萬不得已但服見睨丸見睨丸

薑黃 京三棱 萸澄茄 陳皮去白 高良薑 人參 蓬莪茂

右七味等分爲末用細切蘿蔔漫火煮令爛研細將汁煮稠丸桐子大蘿蔔湯下三十九不以時

陳言評曰產後口乾痞悶未必只因食麪或產母內積憂煩外傷躁熱飲食甘辛使口乾痞悶當隨其所因調之可也煩心宜四物湯去地黃加人參烏梅煎若外傷燥熱看病何經當隨經爲治難以備舉飲食所傷見睨丸卻能作效四物湯方見第六論

第六論曰產後乍寒乍熱者何答曰陰陽不和敗血不散皆令乍寒乍熱產後血氣虛損陰陽不和陰勝則乍寒陽勝則乍熱陰陽相乘則或寒或熱若因產勞傷藏府血弱不得宣越故令敗血不散入於肺則熱入於脾則寒醫若人誤作瘧疾治之則繆矣陰陽不和宜增損四物湯敗血不散宜奪命丹又問二者以何別之答曰時有刺痛者敗血也但寒熱無他證者陰陽不和也增損四物湯不一皆隨病加減增損四物湯

當歸 人參 芍藥 川芎 炮薑各一錢 甘草四錢

右咬咀每服四錢水一盞薑三片煎六分去渣熱服

奪命丹方見第三論

陳言評曰乍寒乍熱榮衛不和難以輕議若其敗血不散豈止入脾肺二藏耶大抵一陰閉一陽即作寒熱陰勝故寒陽勝故熱只可云敗血循經流入閉諸陰能寒閉諸陽則熱血氣與衛氣解則休遇再

會而復作。大調經散、五積散、入醋煎佳。

大調經散 治產後血虛惡露未消。氣爲敗濁凝滯。榮衛不調。陰陽相乘。憎寒發熱。或自汗。或腫滿。皆氣血未平之故也。

大豆炒去皮。一兩半。 茯神一兩。 眞琥珀錢一。

右爲末。用濃煎烏頭紫蘇湯下。

五積散 治感寒濕。與脾胃氣閉。腰腹痛。及有積聚。

蒼朮米泔浸一宿。二十兩。

桔梗十兩。

陳皮六兩。

白芷 甘草炙。

當歸各二兩。

川芎一兩。

芍藥

白茯苓半夏湯去滑。各一兩。

麻黃去節。春夏二兩。秋冬三兩。

乾薑春夏三兩。秋冬四兩。

厚朴薑製炒。二兩。

枳殼

桂分兩。原

附子炮去皮。尖。二兩。

右先將前十二味。咀微炒。令香。取出。當風涼之。入後枳殼。桂。朴。三味。同爲細末。每服三錢。水一盞。薑

三片。棗二枚。煎七分。食前溫服。產婦陣疎。難產。經二三日不生。胎死腹中。或產母氣乏。委頓。產道乾澀。

加順元散。水七分。酒三分。煎。相繼兩服。氣血內和。卽瘥。胎死者。不過三服。當下。其順元散。量產母虛實。

加減。

順元散

烏頭炮去皮。尖。二兩。

附子炮去皮。尖。二兩。

天南星炮。各一兩。

木香半兩。

右爲末。同前法煎。此藥治內外感寒。脈沉伏遲細。手足冷。毛髮恟慄。傷寒陰症。大啜一二杯。氣和汗出。

即愈。

第七論曰。產後四肢浮腫者何。答曰。產後敗血乘虛停積于五臟。循經流入于四肢。流淫日深。卻還不得。腐壞如水。故令四肢面目浮腫。醫人不識。便作水氣治之。凡治水腫。多用導水藥。極能虛人。夫產後既虛。又以藥虛之。是爲重虛。往往多致夭枉。但服調經散。血行腫消。即愈。

調經散

沒藥另研

琥珀另研

桂心

赤芍藥

當歸各一錢

細辛

麝香另研各半錢

右爲末。每服半錢。用生薑汁溫酒各少許。調勻服。

陳言評曰。產後浮腫多端。有自懷孕腫至產後不退者。有產後失於將理。外感風寒暑濕。內作喜怒驚憂。血與氣搏。留滯經絡。氣分血分不可不辨。要當隨所因脈證治之。宜得其情。調經散治血分固效。但力淺難憑。不若吳茱萸湯枳實湯奪魄散。大調經散。皆要藥也。

加減吳茱萸湯。治婦人藏氣本虛。夙挾風冷。胸膈滿痛。腰脇絞刺。嘔吐惡心。飲食減少。身面虛浮。惡寒

戰慄。或泄利不止。少氣羸困。及因生產藏氣暴虛。邪冷內勝。宿疾轉甚。

吳茱萸湯洗七次炒

桔梗 甘草炙

乾薑炮

麥冬去心

防風

細辛

當歸酒洗炒

半

夏湯洗七次

茯苓

丹皮

桂心各半兩

右咬咀。每服四錢。水盞半。煎七分。去渣。空心熱服。

枳實湯 治心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰氣分。

枳實 鉄炒去麩一兩五錢 白朮 兩一

右咬咀每服四錢水盞半煎七分去渣溫服腹中軟即散。

奪魄散 治婦人產後虛腫喘促利便即愈。

生薑汁 取白麵各三兩 半夏 七個洗去滑湯

右以生薑汁溲麵裹半夏爲七餅子炙焦熟爲末熱水調一錢小便利爲效。

大調經散 最治產後腫滿喘急煩渴小便不利。方見第六論

第八論曰產後乍見鬼神者何答曰心主身之血脉因產傷耗血脉心氣則虛敗血停積上于于心心不受觸遂致心中煩燥起臥不安乍見鬼神言語顛倒醫工不識呼爲風邪如此治之必不得愈但服調經散每服加生龍腦一捻得睡即安。

調經散 方見第七論

按陳言第八論評闕。

第九論曰產後不語者何答曰人心有七孔三毛產後血氣弱多致停積敗血閉于心竅神志不能明了又心氣通于舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語如此但服七珍散七珍散

人參 石菖蒲 川芎 熟乾地黃各一兩 細辛一錢 防風 硃砂研各半兩

右爲末。每服一錢。薄荷湯調下。不以時。

按陳言第九論評闕。

第十論曰。產後腹痛。又瀉利者。何。答曰。產後腹胃虛怯。寒邪易侵。若未滿月。飲冷當風。乘虛入流于盲膜。散于腸脇。故腹痛作陣。或如錐刀所刺。流入大腸。水穀不化。洞泄腸鳴。或下赤白。腹脇脹。或走痛不定。急服調中湯立愈。若醫者以爲積滯攻之。則禍不旋踵。謹之。

調中湯

良薑 當歸 桂心 芍藥 附子炮 川芎各一兩 甘草炙五錢

右咬咀。每服三錢。七水三盞。煎一盞。去渣熱服。

陳言評曰。產後下利。非止一證。當隨所因而調之。既云飲冷當風。何所不至。寒熱風濕。本屬外因。喜怒憂思。還從自性。況勞逸飢飽。皆能致病。若其洞泄。可服調中。赤白帶下。非此能愈。各隨門數。別有正方。今錄桃膠散。白頭翁湯。以備用。餘從滯下門中選用之。

沉香桃膠散 治產後利下赤白。裏結後重。疹刺疼痛等證。

桃膠瓦上焙乾 沉香 蒲黃紙隔炒各等分

右爲末。每服二錢。陳米飲調下。空心服。

白頭翁湯 治產後下利虛極。

白頭翁 甘草 阿膠各二兩 黃連 蘗皮去粗皮 秦皮去粗皮

右咬咀。每服四錢。水一盞半。煎七分。去渣。空心服。

第十一論曰。產後遍身疼痛者何。答曰。產後百節開張。血脉流走。遇氣弱則經絡分肉之間。血多留滯。累日不散。則骨節不利。筋脉引急。故腰背不得轉側。手脚不能動搖。身熱頭痛也。若醫以爲傷寒治之。則汗出而筋脉動搖。手足厥冷。變生他病。但服趁痛散以默除之。

趁痛散

牛膝 當歸 桂皮去 白朮 黃耆 獨活 生薑各五錢 薤白 甘草各一分

右爲粗末。每服半兩。水五盞。煎至二盞。去滓。熱服。

陳言評曰。趁痛散不特治產後氣弱血滯。兼能治太陽經感風。頭疼腰痛。自汗發熱。若其感寒傷食。憂恐驚怒。皆致身腫發熱頭痛。況有蓐勞諸證尤甚。趁痛散皆不能療。不若五積散入醋煎用。卻不妨。第十二論曰。產後大便祕澀者何。答曰。產婦臥水血俱下。腸胃虛竭。津液不足。是以大便祕澀不通也。若過五六日。腹中悶脹者。此有燥糞在臟腑。以其乾澀未能出耳。宜服麻仁丸以津潤之。若誤以爲有熱。而投之以寒藥。則陽消陰長。變動百出。性命危也。

麻仁丸

麻仁研 枳殼炙 人參 大黃各半兩

右爲末。鍊蜜丸。梧桐子大。空心溫湯下二十九丸。未通。加九數。

陳言評曰。產後不得利。利者百無一生。去血過多。藏燥大便秘澀。則固當滑之。大黃似難輕用。惟葱涎調蠟茶爲丸。復以葱茶下之。必通。

阿膠枳殼湯 治產後虛羸。大便秘澀。

阿膠 枳殼軼炒去分

右爲末。蜜丸如桐梧子大。別研滑石爲衣。溫酒下二十九丸。半日來未通。再服。

第十三論曰。產後血崩者何。答曰。產後傷耗經絡未得平復。而勞役損動。致血暴崩下。淋漓不止。或因鹹酸不節。傷蠱榮衛。氣衰血弱。亦變崩中。若小腹滿痛。肝經已壞。爲難治。急服固經丸以止之。

固經丸

艾葉 赤石脂煨 補骨脂炒 木賊各半兩 附子一枚。炮去皮臍

右爲末。陳米飲和丸。梧子大。食前溫酒下二十九丸。米飲亦得。

陳言評曰。血崩不是輕病。況產後有此。是謂重傷。恐不止。鹹酸不節。而能致之。多因憂驚恐悲。藏氣不平。或產後服斷血藥早。致惡血不散。鬱滿作堅。亦成崩中。固經丸似難責效。不若大料煮芎藭當歸加芍藥湯。候定。續次隨證合諸藥治之。爲得。

芎藭散 治產後去血過多。暈悶不省。及傷胎去血多不止。懸虛心煩。眩暈頭重。目昏耳聾。舉頭欲倒。諸證。

芎藭 當歸洗去土。焙乾。各等分。

右剉爲散。每四錢水一盞半。煎七分。去渣熱服。

第十四論曰。產後腹脹悶滿。嘔吐不定者。何答曰。血散於脾胃。脾受之不能運化。精微而成腹脹。胃受之則不得受納。水穀而生吐逆。醫者不識。若以尋常治脹止吐藥療之。病與藥不相干。轉更傷動正氣。疾愈難治。但服抵勝湯必瘥。

抵勝湯

赤芍藥 半夏湯洗七次。 澤蘭葉 人參 陳皮各二錢。 甘草炙。一錢。

右咬咀。作一劑。水三碗。薑半兩。煎至兩盞。去渣服。

按陳言第十四論評闕。

第十五論曰。產後口鼻黑氣起及鼻衄者。何答曰。陽明者。經脈之海。起于鼻。交頤中。還出挾口。交人中。左之右。右之左。產後氣消血散。榮衛不理。散亂入于諸經。卻還不得。故令口鼻黑起。及變黑衄。此緣產後虛熱。變生此疾。其疾不可治。名曰胃絕肺敗。不出方。

按陳言第十五論評闕。

第十六論曰。產後喉中氣急喘者何。答曰。榮者血也。衛者氣也。榮行脉中。衛行脉外。相隨上下。謂之榮衛。因產所下過多。榮血暴竭。衛氣無主。獨聚于肺中。故令喘也。此名孤陽絕陰。爲難治。若惡露不快。敗血停凝。上薰于肺。亦令喘急。如此但服奪命丹。血出喘息自定。

奪命丹

方見第三論

陳言評曰。產後喘急固可畏。若是敗血上薰于肺。猶可責效奪命丹。若感風寒。或因憂怒飲食鹹冷等。奪命丹未可均濟。況孤陽絕陰乎。若榮血暴絕。宜大料煮芎藭湯。亦自可救。傷風寒宜旋覆花湯。性情鬱發。宜小調經散。用桑白皮。杏仁。煮湯調下。傷食宜見睨丸。五積散。見脫丸見第五論。五積散見第六論。或即第七論中調經散。

旋覆花湯 治產後傷感風寒暑濕。咳嗽喘滿。痰涎壅塞。坐臥不安寧。

旋覆花 赤芍藥 半夏麴 前胡 麻黃去根 荊芥穗 五味子 甘草炙 茯苓 杏仁各等

右咬咀。每服四錢。水一盞半。薑五片。棗一個。煮七分。去渣。空心服。

第十七論曰。產後中風者何。答曰。產後五七日內。強力下牀。或一月之內。傷于房室。或懷憂發怒。擾薄沖和。或因著灸。傷動藏府。得病之初。眼澀口噤。肌肉瞤搐。以漸腰脊筋急。強直者不可治。此人作非偶。衛中風所得也。

陳言評曰。問產後中風。風是外邪。血虛則或有中之者。直答以人作不可治。問答不相領解。如何開示。