



1

1

1



100



1

A vertical grayscale bar used for color calibration, featuring a series of 11 rectangular patches of varying shades of gray, from white at the top to black at the bottom. Above the patches is a small color calibration chart with a grid of colored squares.



傷寒九十論

許叔微述

中華書局

叢書集成初編

傷寒微旨論（及其他一種）

中華書局出版發行

（北京王府井大街三十六號）

秦皇島市資料印刷廠印刷

一九八五年北京新一版

開本：七八七乘一〇九二毫米三十二分之一

統一書號：一七〇一八·一五一

傷寒九十論

此據琳琅秘室叢
書本排印初編各
叢書僅有此本

四庫未收書

傷寒九十論提要

張金吾藏書志

宋白沙許叔微知可述。先列病證。後論治法。剖析頗精。是書諸家書目俱未著錄。伏讀欽定四庫全書總目云。叔微書。屬辭簡雅。不諧於俗。故明以來。不甚傳布。是則因傳本稀少。故藏書家俱未之見歟。陳振孫曰。叔微有傷寒治法八十一篇。未知卽此書否。

傷寒九十論

提要

傷寒九十論目錄

- 辯桂枝湯用芍藥證第一。
桂枝加厚朴杏子湯證第三。
大青龍湯證第五。
陽明蜜兌證第七。
臍中出血證第九。
傷寒暴死證第十一。
大柴胡湯證第十三。
傷寒自解證第十五。
筋惕肉瞤證第十七。
桂枝加葛根湯證第十九。
剛瘧證第二十一。
太陰證第二十三。
指甲黑青證第二十五。
傷寒九十論 目錄
- 桂枝加附子湯證第二。
麻黃湯證第四。
陽明可下證第六。
腎虛陽脫證第八。
陰中伏陽證第十。
夜間不眠證第十二。
陽明急下證第十四。
熱入血室證第十六。
陽明當下證第十八。
葛根湯證第二十。
厥陰證第二十二。
太陽中喝證第二十四。
瞪目直視證第二十六。

舌卷囊縮證第二十七

邪入大經證第二十九

桂枝證第三十一

少陽證第三十三

三陽合病證第三十五

發熱惡寒證第三十七

結胸可灸證第三十九

漏風證第四十一

妊娠傷寒腳腫證第四十三

狐惑證第四十五

溼家發黃證第四十七

先汗後下證第四十九

陰病陽脈證第五十一

青筋牽引證第五十三

刺陽明證第五十五

循衣摸牀證第二十八

太陽桂枝證第三十

內併論桂枝麻黃膏龍用藥三證

少陰證第三十二

兩感證第三十四

白虎加人參湯證第三十六

結胸可下證第三十八

汗後吃逆證第四十

小便出血證第四十二

風溫證第四十四

發黃證第四十六

黃入清道證第四十八

太陽瘀血證第五十

辯少陰脈緊證第五十二

下膿血證第五十四

陰陽交證第五十六

陰陽易證第五十七。

傷寒耳聾證第五十九。

遺尿證第六十一。

衄血證第六十三。

傷寒溫瘧證第六十五。

臟結證第六十七。

傷寒協熱利證第六十九。

霍亂轉筋證第七十一。

汗後勞復證第七十三。

面垢惡寒證第七十五。

傷寒閉目證第七十七。

手足逆冷證第七十九。

失汗衄血證第八十一。

格陽關陰證第八十三。

懷懷怫鬱證第八十五。

叉手冒心證第五十八。

揚手躑足證第六十。

舌上滑胎證第六十二。

傷寒脅痛證第六十四。

發斑證第六十六。

陽結證第六十八。

胃熱嘔吐證第七十。

兩脛逆冷證第七十二。

汗後瘡瘍證第七十四。

傷寒下利證第七十六。

傷寒表實證第七十八。

寒熱類傷寒證第八十。

脾約證第八十二。

太陽陽明合病證第八十四。

兩手撮空證第八十六。

傷寒九十論 目錄

下利服承氣湯證第八十七。
血結胃證第八十九。

淫溫證第八十八。
六陽俱絕證第九十。

傷寒九十論

宋 白沙許叔微知可述

辯桂枝湯用芍藥證一

馬亨道庚戌春病發熱頭疼鼻鳴惡心自汗惡風宛然桂枝證也時賊馬破儀真三日矣市無芍藥自指圖園採芍藥以利劑一醫曰此赤芍藥耳安可用也予曰此正當用再啜而微汗解

論曰仲景桂枝加減法十有九證但云芍藥聖惠方皆稱赤芍藥孫尚藥方皆曰白芍藥聖惠方太宗朝翰林王懷隱編集孫兆爲國朝醫師不應如此背戾然赤者利白者補予嘗以此難名醫皆愕然失措謹案神農本草稱芍藥主邪氣腹痛利小便通順血脈利膀胱大小腸時行寒熱則全是赤芍藥也又桂枝第九證云微寒者去赤芍藥蓋懼芍藥之寒也惟芍藥甘草湯一證云白芍藥謂其兩脛拘急血寒也故用白芍藥以補非此時也素問云濡者陽氣有餘也陽氣有餘爲身熱無汗陰氣有餘爲多汗身寒傷寒脈濡身熱無汗蓋邪中陰氣故陽有餘非麻黃不能發散中風脈滑多汗身寒蓋邪中陽故陰有餘非赤芍藥不能刮其陰邪然則桂枝用芍藥赤者明矣當參百證歌

桂枝加附子湯證二

有一李姓士人得太陽因汗後汗不止惡風小便澀足攣曲而不伸予診其脈浮而大浮爲風大爲虛此

證。桂枝湯第七證也。仲景云。太陽病發汗遂漏不止。其人惡風。小便難。四肢微急。難以屈伸者。桂枝加附子。三投而汗止。再投以芍藥甘草。而足得伸。數日愈。論曰。仲景第十六證云。傷寒脈浮。自汗出。小便數。心煩。微惡寒。腳攣急。反與桂枝湯以攻其表。此誤也得之便厥。咽中乾。煩躁。吐逆者。作甘草乾薑湯。若厥愈足溫者。更作芍藥甘草湯與之。其腳即伸。若胃氣不和。讖語者。少與調胃承氣湯。蓋第七證則爲發汗漏不止。小便難。第十六證則爲自汗。小便數。故仲景於證候紛紛。小變異。便變法以治之。故於湯不可不謹。

桂枝加厚朴杏子湯證三

戊申正月。有一武弁在儀真。爲張遇所虜。日夕置於舟艙板下。不勝踉伏。後數日得脫。因飽食。解衣捫竊。以自快。次日遂作傷寒。醫者以因飽食傷而下之一醫。以解衣中邪而汗之。雜治數日。漸覺昏困。上喘息高。醫者惶惶。罔知所指。予診之曰。太陽病下之。表未解。微喘者。桂枝加厚朴杏子湯。此仲景法也。醫者爭曰。某平生不曾用桂枝。況此藥熱。安可愈喘。予曰。非汝所知也。一投而喘定。再投而濺濺汗出。至晚身涼而脈已和矣。醫者曰。予不知仲景之法。其神如此。豈誑惑後世也哉。人自寡學。無以發明耳。

麻黃湯證四

鄉人邱忠臣。寓毗陵薦福寺。病傷寒。予爲診視。其發熱頭疼。煩渴。脈雖浮數無力。自尺以下不至。予曰。雖麻黃證。而尺遲弱。仲景云。尺中遲者。營氣不足。血氣微少。未可發汗。予於建中湯加當歸黃芪。令飲之。翌

日病者不耐其家曉夜督發汗藥其言至不遜予以鄉人隱忍之但以建中調理而已及六七日尺脈方應遂投以麻黃湯啜第二服狂言煩躁且悶須臾稍定已中汗矣五日愈

論曰仲景雖云不避晨夜卽宜便治醫者亦須顧其表裏虛實待其時日若不循次第雖暫時得安虧損五臟以促壽限何足尙哉昔范雲爲陳霸先屬霸先有九錫之命期在旦夕矣雲偶感寒疾恐不及豫盛事請徐文伯診視之懇曰便可得愈乎文伯曰便差甚易但恐二年後不復起爾雲曰朝聞道夕死可矣況二年乎文伯以火燒地布桃柏葉設席置其臥上頃刻汗解以溫粉撲之翌日愈甚喜文伯曰不足喜也後二年果卒矣夫取汗先期尙促壽限況不顧表裏不待時日便欲速愈乎每見病家不耐三四日晝夜促汗醫者顧利恐別更醫隨情順意鮮不致斃故書此以爲龜鑒

大青龍湯證五

何保養從王太尉軍中得傷寒脈浮濇而緊予曰若頭疼發熱惡風無汗則麻黃證也煩躁則青龍湯證也何曰今煩躁甚予投以大青龍湯三投汗解論曰桂枝麻黃青龍皆表證發汗藥而桂枝治汗出惡風麻黃治無汗惡寒青龍治無汗而煩三者皆欲微汗解若汗多亡陽爲虛則煩躁不眠也

陽明可下證六

一武弁李姓在宣化作警傷寒五六日矣鎮無醫抵郡召予予診視之曰脈洪大而長大便不通身熱無

汗。此陽明證也。須下。病家曰。病者年踰七十。恐不可下。予曰。熱邪毒氣併畜於陽明。況陽明經絡多血少氣。不問老壯。當下。不爾。別請醫占。主病者曰。審可下一聽所治。予以大承氣湯。半日。殊未知。診其病。察其證。宛然在。予曰。藥曾盡否。主者曰。恐氣弱不禁。但服其半耳。予曰。再作一服。親視飲之。不半時間。索溺器。先下燥糞十數枚。次溏洩一行。穢不可近。未離已中汗矣。灑然周身。一時頃。汗止身涼。諸苦遂除。次日予自鎮歸。病人索補劑。予曰。服大承氣湯得差。不宜服補劑。補則熱仍復。自此但食粥。旬日可也。故予治此疾。終身止大承氣一服而愈。未有若此之捷。

論曰。老壯者形氣也。寒熱者病邪也。臟有熱毒。雖衰年亦可下。藏有寒邪。雖壯年亦可溫。要之與病相當耳。失此是致速斃也。謹之。

陽明蜜兌證七

庚戌仲春。艾道先染傷寒。近旬日。熱而自汗。大便不通。小便如常。神昏多睡。診其脈。長大而虛。予曰。陽明證也。乃兄景先曰。舍弟全似李大夫證。又屬陽明。莫可行承氣否。予曰。雖爲陽明。此證不可下。仲景陽明自汗。小便利者。爲津液內竭。雖堅不可攻。宜蜜兌導之。作三劑。三易之。先下燥糞。次溏洩。已而汗解。論曰。二陽明證雖相似。然自汗小便利者。不可蕩滌五藏。爲無津液也。然則傷寒大證相似。脈與證稍異。通變爲要。仔細斟酌。正如以格局看命。雖年月日時皆同。貴賤窮通不相伴者。於一時之頃。又有淺深也。

腎虛陽脫證八

朱保義撫辰庚戌春權監務予一日就務謁之見擁爐忍痛若不禁狀予問所苦小腸氣痛求予診之予曰六脈虛浮而緊非但小腸氣恐別生他疾越數日再往臥病已五日矣入其室見一市醫孫尙者供藥予診之曰此陰毒證腎虛陽脫脈無根蒂獨見於皮膚黃帝所謂懸絕仲景所謂譬如羹上肥也早晚喘急未幾而息已高矣孫生尙與尤附湯灸臍下予曰雖虛扁之妙無及矣是夕死故論傷寒以真氣爲主論曰傷寒不拘陰證陽證陰毒陽毒要之真氣強壯者易治真氣不守受邪纔重便有必死之道何也陽證宜下真氣弱則下之使脫陰證宜溫真陰弱溫之則客熱便生故醫者難於用藥非病不可治也主本無力也經曰陽勝則身熱腠理閉喘粗爲之俛仰汗不出而熱齒乾以煩冤腹滿死陰勝則身寒寒則厥厥則腹滿死帝曰調此二者奈何岐伯曰女子二七天癸至七七止男子二八精氣溢八八止婦人月事以時下故七欲損也男子精欲滿不欲竭故八欲益也如此則男婦身常無病無病精氣常固雖有寒邪易於調治故曰二者可調是知傷寒真氣壯者易治也

臍中出血證九

一婦人得傷寒數日咽乾煩渴脈弦細醫者汗之其始衄血繼而臍中出血醫者驚駭而遁予曰少陰發汗之所致也蓋少陰不當發汗仲景云少陰強發汗必動其血未知從何道而出或從口鼻或從耳目是爲下厥上竭此爲難治仲景云無治法無藥方予投以薑附湯數服血止後得微汗愈論曰本少陰證而誤汗之故血妄行自臍中出若服以止血藥可見其標而不見其本予以治少陰之本

而用薑附湯故血止而病除。

陰中伏陽證十

鄉人李信道權獄官得病六脈俱沈不見深按至骨則弦細有力頭疼身溫煩躁手指末皆冷中滿惡心更兩醫矣而醫者不曉但供調藥予往視之曰此陰中伏陽也仲景方無此證而世人患者多若用熱藥以助之則陰邪隔絕不能引導其陽反生客熱用寒藥則所伏真火愈見銷鑠須是用破陰丹行氣導水奪真火之藥使火升水降然後得汗而解予令以冷鹽湯下破陰丹三百丸作一服不半時煩躁狂熱手足漸溫譫語躁擾其家甚驚予曰汗證也須臾稍寧略睡澀然汗出自晷達旦方止身涼而病除破陰丹黃水銀各一兩結沙子和丸桐子大每服三十丸冷鹽湯送下出中藏經方脈舉要

傷寒暴死證十一

己未歲一時官病傷寒發熱狂言煩躁無他惡證四日死或者以爲兩感然其證初無兩感證候是歲得此疾三日四日死者甚多人竊怪予歎之曰是運使然也已爲土運土運之歲上見太陰蓋太乙天符爲貴人中執法者其病速而危中行令者其病徐而持中貴人者其病暴而死謂之異也又曰臣爲君則逆逆則其病危其害速是年少宮土運木氣大旺邪中貴人故多暴死氣運當然何足怪也

夜間不眠證十二

陳姓士人初得病身熱脈浮自汗醫者麻黃湯汗之發熱愈甚夜間不得眠頭重煩悶悸悸然中風證強

責汗之過也。仲景云太陽病發汗後，大汗出，胃中乾燥，不得眠，其人欲得飲水者，少少與之，令胃氣和則愈。予先與豬苓湯，次投之以當歸、地黃、麥門冬、芍藥、烏梅之類爲湯，飲之不汗而愈。論曰：黃帝鍼經曰：衛氣者晝行陽，夜行陰，衛氣不得入於陰，常行於外，行於外則陽滿，滿則陽蹵盛而不得入於陰，陰虛則夜不得眠也。今津液內竭，胃中乾燥，獨惡於陽，陰無所歸，其候如此，故以當歸、地黃補血，用烏梅以收之，故不汗自愈。

大柴胡湯證十三

羽流蔣尊病，其初心煩喜嘔，往來寒熱，醫初以小柴胡湯與之，不除。予診之曰：脈洪大而實，熱結在裏，小柴胡安能除也。仲景云傷寒十餘日，熱結在裏，復往來寒熱者，與大柴胡，二服而病除。

論曰：大黃爲將軍，故蕩滌溼熱，在傷寒爲要藥。今大柴胡湯不用，誠誤也。王叔和曰：若不加大黃，恐不名大柴胡，須是酒洗生用，乃有力。昔後周姚僧坦名善醫，上因發熱，欲服大黃，僧坦曰：大黃乃是快藥，至尊年高，不宜輕用上弗從，服之遂不起。及至元帝有疾，諸醫者爲至尊至貴，不可輕服，宜用平藥。僧坦曰：脈洪而實，必有宿食，不用大黃，病不能除。上從之，果下宿食而愈。此明合用與不合用之異也。

陽明急下證十四

鄉里豪子得傷寒，身熱、目痛、鼻乾、不眠、大便不通、尺寸俱大，已數日矣。自昨夕汗大出，予曰：速以大柴胡下之。衆醫駭然曰：陽明自汗、津液已竭，當用蜜兌，何故用大柴胡藥？予曰：此仲景不傳妙處，諸公安知之。

予力爭，竟用大柴胡兩服而愈。

論曰：仲景論陽明云：陽明病，多汗者，急下之。人多謂已自汗，若更下之，豈不表裏俱虛也？論少陰云：少陰病一二日，口乾燥者，急下之。人多謂病發於陰，得之日淺，但見乾燥，若更下之，豈不陰氣愈盛也？世人罕讀，予以爲不然。仲景稱急下之者，亦猶急當救表，急當救裏，凡稱急者，急下之。有三處：纔覺汗出多，未至津液乾燥，速下之，則爲徑捷，免致用蜜兌也。蓋用蜜兌已是失下，出於不得已耳。若胃中識得了，何疑殆之有哉。

傷寒自解證十五

閩人李宗古得疾，口中氣熱，脣乾，屈體臥，足冷，舌上有胎。予診之，尺寸俱緊，或者謂氣熱口乾，疑其陽勝，跪足臥，足冷，疑其陰勝，而又陰陽俱緊，是誠可疑也。若不熟讀仲景方法，何能治？予曰：尺寸俱緊，是寒邪勝也。仲景云：陰陽俱緊，法當清邪中於下焦。又云：陰陽俱緊，口中氣出，脣乾舌燥，跪臥，足冷，鼻中涕出，舌上胎滑，勿妄治也。到七日以來，其人發熱，手足溫者，此爲欲解，蓋已上證候，皆是陰盛陽弱，故仲景云勿妄治者，誠恐後人之疑也。故予以抑陰助陽溫劑與之，緊脈漸退，四體和不汗而自解矣。

熱入血室證十六

辛亥二月，毗陵學官王仲景妹始傷寒，七八日，昏寒，喉中涎響如鋸，目瞑不知人，病勢極矣。予診之，詢其未昏寒以前證，母在側曰：初病四五日，夜間譫語，如見鬼狀。予曰：得病之初，正值經候來否？答曰：經水方