

産

後

編



20195^產

後

編

傅
山
著

中
華
書
局

叢書集成初編

產後編

中華書局出版發行

(北京王府井大街三十六號)

秦皇島市資料印刷廠印刷

一九八五年北京新一版

開本：七八七乘二〇九二毫米三十二分之一

統一書號：一七〇一八·一五一

產後編

此據海山仙館叢
書本排印初編各
叢書僅有此本

產後編目錄

上卷

產後總論

產前後方症宜忌

正產 傷產 調產 催生 凍產 熱產 橫產 盤腸產 難產 死產 下胞 斷臍 新產治法

產後用藥十誤 產後寒熱 胎前患傷寒疫症痢疾墮胎等症

血塊

血暈

厥症

血崩

氣短似喘

妄言妄見

傷食

忿怒

類瘡

類傷寒二陽症

類傷寒三陰症

類中風

類瘧

出汗

盜汗

口渴兼小便不利

遺尿

下卷

誤破尿胞

患淋

便數

瀉

完穀不化

痢

霍亂

嘔逆不食

咳嗽

水腫

流注

膨脹

怔忡驚悸

骨蒸

心痛

腹痛

小腹痛

虛勞

遍身疼痛

腰痛

脅痛

陰痛

惡露

乳癰

風甚

不語

補編

大便不通

鷄爪風

浮腫

產後編上 共四十三症

產後總論

陽曲傅 山青主手著

凡病起於血氣之衰。脾胃之虛。而產後尤甚。是以丹溪先生論產後必大補氣血爲先。雖有他症。以未治之。斯言盡治產之大旨。若能擴充立方。則治產可無過矣。夫產後憂驚勞倦。氣血暴虛。諸症乘虛易入。如有氣母專耗散。有食母專消導。熱不可用芩連。寒不可用桂附。寒則血塊停滯。熱則新血崩流。至若中虛外感。見三陽表症之多。似可汗也。在產後而用麻黃。則重竭其陽。見三陰裏症之多。似可下也。在產後而用承氣。則重亡陰血。耳聾脅痛。乃腎虛惡露之停。休用柴胡。謬語出汗。乃元弱似邪之症。非同胃實。厥由陽氣之衰。無分寒熱。非大補不能回陽而起弱。痙因陰血之虧。不論剛柔。非滋榮不能舒筋而活絡。乍寒乍熱。發作無期。症似瘡也。若以瘡治。遷延難愈。言論無倫。神不守舍。病似邪也。若以邪治。危亡可待。去血過多。而大便燥結。肉菰荅加於生化。非潤腸承氣之能通。去汗過多。而小便短澀。六君子倍加參芪。必生津助液之可利。加參生化湯類服。救產後之危。長生活命丹屢用。甦絕穀之人。

癰疔脫肛。多是氣虛下陷。補中益氣之方。口噤拳攣。乃因血燥類風。加參生化之劑。產戶入風而痛甚。服宜羌活養榮湯。玉門傷涼而不閉。洗宜鱗兒黃硫散。怔忡驚悸。生化湯加以定志。似邪恍惚。安神丸助以歸脾。因氣而悶滿虛煩。生化湯加木香爲佐。因食而噯酸惡食。六君子加神麴麥芽爲良。蘇木莪朮。大能破血。青皮枳殼。最消滿脹。一應耗氣破血之劑。汗吐宣下之法。止可施諸壯實。豈宜用於胎產。大抵新產後。先問惡露如何。塊痛未除。不可遽加參朮。腹中痛止。補中益氣無疑。至若亡陽脫汗。氣虛喘促。頻服加參生化湯。是從權也。又如亡陰火熱。血崩厥暈。速煎生化原方。是救急也。王太僕云。治下補下。治以急緩。緩則道路達而力微。急則氣味厚而力重。故治產常遵丹溪而固本。服法宜效太僕以頻加。凡付生死之重寄。須着意於極危。欲求俯仰之無虧。用存心於愛物。此雖未盡產症之詳。然所聞一症。皆援近鄉治驗爲據。亦未必無小補云。

正產

正產者。有腹或痛或止。腰脊酸痛。或勢急而胞未破。名弄胎。服八珍湯。加香附自安。有胞破數日而痛尙緩。亦服上藥俟之。

傷產

傷產者。胎未足月。有所傷動。或腹痛。臍痛。或服催生藥太早。或產母努力太過。逼兒錯路。不能正產。故臨月必舉動從容。不可多睡飽食飲酒。但覺腹中動轉。卽正身仰臥。待兒轉順。與其臨時費力。不如先時慎重。

調產

調產者。產母臨月擇穩婆。辦器用。備參藥。產時不可多人喧鬧。二人扶身。或憑物站。心煩用滾水調白蜜一匙。獨活湯更妙。或飢服糜粥少許。勿令飢渴。有生息未順者。只說有雙胎。或胎衣不下。忽令產母驚恐。

催生

催生者。因坐草太早。困倦難產。用八珍湯。稍佐以香附乳香。以助血氣。胞衣早破。漿血已乾。亦用八珍湯。

凍產

凍產者。天寒血氣凝滯。不能速生。故衣裳宜厚。產室宜煖。背心下體尤要。

熱產

熱產者。暑月宜溫涼得宜。若產室人衆。熱氣蒸逼。致頭痛面赤昏暈等症。宜飲清水少許。以

解之。然風雨陰涼亦當避之。

橫產

橫產者。兒居母腹。頭上足下。產時則頭向下。產母若用力逼之。胎轉至半而橫。當令產母安然仰臥。令其自順。穩婆以中指挾其肩。勿使臍帶羈絆。用催生藥。努力即生。

當歸 紫蘇 各三錢 長流水煎服。即下。

一方。用好京墨磨服之。即下。

一方。用敗筆頭一個。火鍛。以藕節自然汁調服之。即下。

一方。用益母草六兩。濃煎。加重便一大杯。調服。即下。

盤腸產

盤腸產者。產則子腸先出。然後生子。其腸或未即收。以革麻子四十九粒。研碎塗頭上。腸收。急急洗去。遲則有害。又方。止用四十粒。去皮研爲膏。塗頂中。收即拭之。如腸燥。以磨刀水潤之。再用磁石煎湯服之。須陰陽家用過有驗者。

難產

難產者。交骨不開。不能生產也。服加味芎歸湯。良久即下。

小川芎_{一兩}當歸_兩敗龜版_{一個}酒炙婦人髮灰_{一握}須用生過男女者爲末水一鍾煎七分服

死產

死產者子死腹中也驗母舌青黑其胎已死先用平胃散一服酒水各一鍾煎八分投朴硝煎服卽下用童便亦好後用補劑調理

下胞

胞衣不下用滾酒送下失笑散一劑或益母丸或生化湯送鹿角灰一錢或以產母髮入口作吐胞衣卽出有氣虛不能送出者腹必脹痛單用生化湯

全當歸_兩川芎_{錢三}白朮_{錢一}香附_{錢一}加人參_{錢三}更妙用水煎服

一方用革麻子二兩雄黃二錢研膏塗足下湧泉穴衣下急速洗去

平胃散

南蒼朮_{米泔水浸炒}厚朴_{鹽炒}陳皮炙草_{各二錢}

共爲粗末或水煎或酒煎煎成時加朴硝_{錢二}再煎一二沸溫服

失笑散

五靈脂蒲黃俱研爲細末每服三錢熱酒下

斷臍

斷臍必以綿裹咬斷爲妙。如遇天寒或因難產，母子勞倦，宜以大麻油紙燃，徐徐燒斷，以助元氣。雖兒已死，令煖氣入臍，多得生。切勿以刀斷之。

滑胎散 臨月常服數劑，以便易生。

當歸^{三錢} 川芎^{五錢} 杜仲^{二錢} 熟地^{三錢} 枳殼^{七錢} 山藥^{二錢} 水二鍾，煎八分，食前溫服。如氣體虛

弱人，加入人參、白朮，隨宜服之。如便實多滯者，加牛膝二錢。

治產祕驗良方

治橫生逆產，至數日不下，一服卽下。有未足月忽然胎動，一服卽安。或臨月先服一服，保

護無虞，更能治胎死腹中及小產傷胎無乳者。一服卽如原體。

全當歸^{一錢} 川芎^{五錢} 川貝母^{一錢} 去心荊芥穗^{各八分} 黃芪^{各八分} 厚朴^炒 蘼艾^{各七} 紅花^{各七} 兔絲

子^{錢二} 白芍^{一錢二} 不用枳殼^{六分} 羌活^{六分} 甘草^{五分}

上十三味，只用十二味，不可加減。安胎去紅花，催生去蘼艾，用井水鍾半，薑二片爲引，熱

服。渣用水一鍾，煎半鍾，熱服。如不好，再用水一鍾，煎半鍾，服之卽效。不用二劑。

催生兔腦丸 治橫生逆產神效

臘月兔腦髓_{一錢}。母丁香_{一錢}。乳香_{一錢}。另研麝香_{一分}。兔腦爲丸。芡實大。陰乾密封。用時以溫酒送下_{一丸}。

奪命丹

臨產未產時。目反口噤。面黑唇青。口中吐沫。命在須臾。若臉面微紅。子死母活。急用蛇退。蠶故子_{燒灰不存性}。髮灰_{錢一}。乳香_{五分}。共爲細末。酒下。

加味芎歸湯治子宮不收。產門不開。

人參_{錢二}。黃芪_{錢一}。川芎_{錢一}。當歸_{錢二}。升麻_{分八}。炙草_{分四}。五味子_{粒十五}。再不收。加半夏_{分八}。白芍_{分八}。酒炒。

新產治法

生化湯先連進二服。若胎前素弱。婦人見危症。熱症。墮胎。不可拘帖數服。至病退乃止。若產時勞甚。血崩形脫。卽加入參三四錢在內。頻服無虞。若氣促亦加入參。加參於生化湯者。血塊無滯。不可以參爲補而弗用也。有治產不用當歸者。見偏之甚。此方處置萬全。必無一失。世以四物湯治產。地黃性寒滯血。芍藥微酸無補。伐傷生氣。誤甚。

產後用藥十誤

一因氣不舒。而誤用耗氣順氣等藥。反增飽悶。陳皮用至五分。禁枳實厚朴。

二因傷氣而誤用消導。反損胃氣至絕穀。禁枳殼、大黃、蓬、稜、麴、朴。

三因身熱而誤用寒涼。必致損胃增熱。禁苓、連、梔、柏、升、紫。

四因日內未曾服生化湯。勿用參、芪、朮。以致塊痛不消。

五毋用地黃。以滯惡露。

六毋獨用枳殼、牛膝。枳實以消塊。

七便祕。毋用大黃、芒硝。

八毋用蘇木、稜、蓬以行塊。芍藥能伐氣。不可用。

九毋獨用山查湯。以攻塊定痛而反損新血。

十毋輕服濟坤丹。以下胎下胞。

產後危疾諸症。當頻服生化湯。隨症加減。照依方論。

產後寒熱。

凡新產後。榮衛俱虛。易發寒熱。身痛腹痛。決不可妄投發散之劑。當用生化湯為主。稍佐發散之藥。產後脾虛。易於停食。以致身熱。世人見有身熱。便以爲外感。遽然發汗。速亡甚矣。當於生化湯中。加扶脾消食之藥。大抵產後。先宜補血。次補氣。若偏補氣。而專用參、芪。

非善也。產後補虛，用參芪芎歸白朮陳皮炙草，熱輕則用茯苓淡滲之藥，其熱自除，重則加乾薑，或云大熱而用薑何也？曰此熱非有餘之熱，乃陰虛內生熱耳。蓋乾薑能入肺分，利肺氣，又能入肝分，引衆藥生血，然必與陰血藥同用之。產後惡寒發熱，腹痛者，當主惡血，若腹不痛，非惡血也。

產後寒熱，口眼歪邪，此乃氣血虛甚，以大補爲主。左手脈不足，補血藥多於補氣藥，右手脈不足，補氣藥多於補血藥，切不可用小續命等發散之藥。

胎前患傷寒疫症，瘧疾，墮胎等症。

胎前或患傷寒疫症瘧疾，熱久必致墮胎，墮後愈增熱，因熱消陰血，而又繼產失血故也。治者甚勿妄論傷寒瘧疫未除，誤投梔子鼓湯紫苓連柏等藥，雖或往來潮熱，大小便秘，五苓承氣等藥，斷不可用，只重產輕邪，大補氣血，頻服生化湯，如形脫氣脫，加生脈散，以防血量，蓋川芎味辛能散，乾薑能除虛火熱，雖有便秘煩渴等症，只多服生化湯，自津液生而二便通矣。若熱用寒劑，愈虛中氣，誤甚。

產後諸症治法

血塊第一