

国家执业医师资格考试丛书

最新

国家执业医师资格考试

2003 临床医师考试 全真模拟及精解 (第二版)

《临床医师考试全真模拟及精解》专家组 编

◎ 以国家临床执业医师资格考试大纲为依据

◎ 内容涵盖资格考试的主要考点

◎ 专家出题 全真模拟

◎ 考前冲刺 实战训练



北京大学医学出版社

1 [A] [B] [C] [D] [E]
2 [A] [B] [C] [D] [E]
3 [A] [B] [C] [D] [E]
4 [A] [B] [C] [D] [E]

1 [A] [B] [C] [D] [E]
[A] [B] [C] [D] [E]
[B] [C] [D] [E]
[C] [D] [E]

国家执业医师资格考试

临床医师考试全真模拟及精解

(第二版)

《临床医师考试全真模拟及精解》专家组 编

北京大学医学出版社

LINCHUANG YISHI KAOSHI QUANZHEN MONI JI JINGJIE

图书在版编目 (CIP) 数据

临床医师考试全真模拟及精解/《临床医师考试全真模拟及精解》专家组编.—2版.—北京:北京大学医学出版社,2003.3

国家临床执业医师考试辅导教材

ISBN 7-81071-429-5

I. 临… II. 临… III. 临床医学-医师-资格考核-解题 IV. R4-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 010886 号

从 2003 年 3 月第 1 次印刷起,封面无防伪标不准销售

北京大学医学出版社出版发行

(100083 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内 电话:010-62092230)

责任编辑:李小云 药蓉

责任校对:汤云法 兰晶

责任印制:郭桂兰

莱芜市圣龙印务书刊有限责任公司印刷 新华书店经销

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:26.5 字数:650千字

2003年3月第2版 2003年3月第1次印刷 印数:1-10000册

定价:39.00元

版权所有 不得翻印

第二版前言

出版这套丛书的动机源自执业医师（助理医师）资格考试后的座谈会，与会的考生及有关人士一致认为执业医师资格考试是成功的，试题内容涉及作为合格医师必须掌握的基本理论、基本技能和相应的法规知识，对提高我国医师队伍的总体素质将起到积极的作用。但也有不少考生反映医学课程门类多，内容广泛，虽然经过较长时间的复习，临考前仍感到“心中无底，思路不清”；还有些考生对题意理解偏差而未能答对，尤其工作了多年的考生，对现行的试题题型不熟悉。基于此，为了帮助考生复习，增强应考信心；为了帮助考生熟悉试题题型，避免无谓的失误；为了帮助考生熟悉考试过程和自我测试，加强临考前的“冲刺”练习；我们组编了这套试题精解及全真模拟丛书，包括临床、口腔、公卫医师及助理医师共6册，与医师资格考试的门类相一致。正式出版以来，深受广大考生的欢迎，予以好评。

国家医师资格考试委员会于2001年12月组织有关专家，对《国家执业医师（助理医师）资格考试大纲》进行了全面的修订，为了适应新《大纲》的要求，满足广大考生的需要，我们组织相关专家对这套丛书进行了相应的更新与修订，以使本套丛书与当前的考试大纲、考试内容、考试形式相一致，达到全真模拟的效果。

每本书的主要内容：①国家执业医师资格考试试题题型介绍与答题技巧；②三套全真模拟国家执业医师（助理医师）资格考试试卷，按照以往考试的试卷，在试题所侧重的知识点、各学科试题在试卷中的比重、各类题型的比例以及考试的时间要求等方面进行了全真模拟。

祝愿本书读者顺利通过国家执业医师资格考试！

编者

目 录

考试题型介绍与答题技巧	(1)
临床执业医师全真模拟试卷 (一)	(4)
第一单元	(4)
第二单元	(23)
第三单元	(42)
第四单元	(61)
答题卡	(81)
试卷 (一) 答案及试题分析	(89)
第一单元	(89)
第二单元	(102)
第三单元	(115)
第四单元	(128)
临床执业医师全真模拟试卷 (二)	(142)
第一单元	(142)
第二单元	(160)
第三单元	(179)
第四单元	(198)
答题卡	(219)
试卷 (二) 答案及试题分析	(227)
第一单元	(227)
第二单元	(240)
第三单元	(253)
第四单元	(266)
临床执业医师全真模拟试卷 (三)	(280)
第一单元	(280)
第二单元	(299)
第三单元	(318)
第四单元	(337)
答题卡	(357)
试卷 (三) 答案及试题分析	(365)
第一单元	(365)
第二单元	(378)

第三单元	(391)
第四单元	(404)

考试题型介绍与答题技巧

国家执业医师资格考试采用的题型有 A 型题和 B 型题。A 型题中, A1、A2、A3/A4 型题均出现了; B 型题中只出现了 B1 型题。现分别介绍于下 (所列例题均选自历届临床执业医师资格考试试卷):

一、A1 型题

A 型题属于最佳选择题类型。A1 型题为单个最佳选择题, 每道题由 1 个题干和 5 个备选答案组成 (见例题 1)。要求应考者找出 1 个符合题干要求的最佳或恰当的答案, 此为正确答案, 其余 4 个则为干扰答案。5 个备选答案之间往往具有比较意义, 干扰答案或是完全不符合题干要求, 也可以是部分符合题干要求, 因此答题时应审慎选择, 以排除似乎有理而实际是不合适的答案。有时在备选答案中出现“以上都不是”(见例题 2), 这有两种情况: ①“以上都不是”作为正确答案, 其他 4 个答案均是干扰答案, 而且是绝对不符合题干要求的, 真正的正确答案没有出现; ②5 个备选答案中已含有正确答案, 而“以上都不是”只是 1 个干扰答案而已, 答题者应慎之! A1 型题中还有一种否定型形式, 试题有多个正确答案或涉及不止 1 个相关问题时常采用否定型形式 (见例题 3)。题干中有 1 个特别标注的 (用黑体或加着重号标注) 否定词 (不、不是、不能、除外、错误、无关等), 要求应试者在 5 个备选答案中选出符合题干要求的答案, 而答案的内容与题干的主旨陈述是相悖的, 或者是最不合适的, 或者是例外的, 或者是用得最少的。

例题 1 胸膜腔内压等于

- A. 大气压 - 非弹性阻力
- B. 大气压 + 跨肺压
- C. 大气压 + 跨胸壁压
- D. 大气压 - 肺弹性回缩力
- E. 大气压 + 肺弹性回缩力

正确答案: D

• **例题 2** 能治疗癫痫发作而无镇静催眠作用的药物是

- A. 地西洋
- B. 苯妥英钠

- C. 苯巴比妥
- D. 扑米酮
- E. 以上都不是

正确答案: B

例题 3 单纯性二尖瓣狭窄的病变不伴有

- A. 左心房肥厚
- B. 左心房扩张
- C. 右心室肥厚
- D. 左心室肥厚
- E. 心脏呈梨形

正确答案: D

二、A2 型题

A2 型题是病历摘要型最佳选择题, 多用于考查临床学科的知识与技能 (见例题 4), 但基础医学与其他学科也常采用 (见例题 5)。试题由一个叙述性的简要病历 (或其他主体) 作为题干和 5 个备选答案组成。也有否定型和“以上都不是”型。

例题 4 男性,66 岁,昏迷 1 天入院,既往无糖尿病史,BP 21.3/11.3kPa (160/85mmHg),血糖 38.9mmol/L (700mg/dl),血钠 150mmol/L,血 pH7.35,血酮体弱阳性,可能诊断是

- A. 糖尿病酮症酸中毒昏迷
- B. 饥饿性酮症酸中毒
- C. 高渗性非酮症性糖尿病昏迷
- D. 乳酸性酸中毒
- E. 脑血管意外

正确答案: C

例题 5 细菌经紫外线照射会发生 DNA 损伤,为修复这种损伤,细菌合成 DNA 修复酶的基因表达增强,这种现象称为

- A. DNA 损伤
- B. DNA 修复
- C. DNA 表达
- D. 诱导
- E. 阻遏

正确答案: D

三、A3/A4 型题

A3 型题为病历组型最佳选择题。此类题的结构是先叙述一个临床案例,然后在案例下提出若干道考题,每道考题均与案例有关,但测试点不同,各考题之间相互独立(见例题 6)。每道考题备有 5 个备选答案,要求选择 1 个最佳的答案,其余的答案可以是错误的,也可以是部分正确的,但只能有 1 个最佳的答案。此类型也有否定型形式。A3 型题和后面讲述的 A4 型题多用来考查临床学科的知识 and 技能,但也有可能在此类试题中提出某个问题来考查基础医学或其他学科的知识 and 技能。

A4 型题为病历串型最佳选择题。试题的结构类似 A3 型题,也是先叙述 1 个临床案例,然后提出若干个相关的问题,与 A3 型题不同的是当病情逐渐展开时,可逐步增加新的信息(见例题 7)。每个问题均与开始叙述的临床案例有关,又与随后增加的信息有关,所以回答这样的试题一定要仔细考虑两者的要求。A4 型题中的每个问题也有 5 个备选答案,要求找出 1 个最佳的答案,其余的备选答案可以是部分正确,也可以是错误的。A4 型题也有否定型形式,否定词下常用着重号标出以提醒应试者。

例题 6 (1~3 题共用题干)

男,51 岁,胸骨后剧烈疼痛 4 小时,伴大汗淋漓,血压 10.7/8.0kPa (80/60mmHg),心率 134 次/分,面色苍白,四肢冰冷,心电图示急性广泛前壁心肌梗死。

1. 该患者血压低的原因是

- A. 血容量不足
- B. 合并右室梗死
- C. 舒张期充盈不足
- D. 心源性休克
- E. 疼痛性休克

2. 对指导治疗最有帮助的辅助检查是

- A. 心电图和血压监测

B. 心肌酶谱监测

C. 漂浮导管血流动力学监测

D. 超声心动图

E. 胸部 X 线片

3. 对该患者最理想有效的治疗措施是

A. 毛花苷 C 强心

B. 多巴胺升压

C. 尿激酶溶栓

D. 主动脉内球囊反搏泵

E. 直接 PTCA 术

正确答案: 1 题 D; 2 题 A; 3 题 E

例题 7 (1~5 题共用题干)

某矿工，男性，40岁，因塌方事故时被泥土、矿石压埋致伤。当时不能站立，腰部疼痛无力，双下肢不能自主活动，双腹股沟以下感觉消失，急送医院。

1. 正确的搬运方法是
 - A. 搂抱
 - B. 一人背
 - C. 一人抬头，一人抬足
 - D. 三人用手平直托起，保持躯干平直
 - E. 两人抬上肢，两人抬下肢
2. 到医院检查，发现病人腰背有后突畸形，应首先考虑的诊断是
 - A. 胸腰段棘突骨折
 - B. 胸腰段横突骨折
 - C. 胸腰段椎体骨折
 - D. 肋骨骨折
 - E. 局部血肿
3. 此时首选的检查方法是
 - A. CT检查
 - B. MRI检查

四、B1型题

B型题为配伍题。B1型题是标准配伍题，试题的形式为开始是5个备选答案，其后提出至少2道试题，要求应试者为每一道试题从备选答案中选出与其关系最密切的答案（见例题8），每个备选答案可以被选用一次、多次或不被选用。

例题8（1~3题共用备选答案）

- A. 霍乱
- B. 黄热病
- C. 艾滋病
- D. 流行性感冒

- C. X线检查
- D. 肌电图检查
- E. 核素检查

4. 假设患者经1周卧床观察后双下肢瘫明显恢复，应考虑
 - A. 脊髓震荡
 - B. 脊髓受压
 - C. 脊髓横断
 - D. 马尾神经损伤
 - E. 神经根损伤
5. 假设X线显示椎体单纯压缩性骨折，压缩不到1/3，其首选治疗方法是
 - A. 仰卧于木板床上
 - B. 两桌法过牵复位
 - C. 手术脊椎融合
 - D. 手术内固定
 - E. 石膏背心外固定

正确答案：1题D；2题C；3题C；4题A；5题A

E. 渗出性皮肤病

1. 《传染病防治法》规定的甲类传染病有
 2. 《传染病防治法》规定的乙类传染病有
 3. 《传染病防治法》规定的丙类传染病有
- 正确答案：1题A；2题C；3题D

临床执业医师全真模拟试卷（一）

第一单元

第一节

A1 型选择题（1~41 题）

答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 属于慢性肉芽肿性炎的疾病是
 - A. 流行性脑膜炎
 - B. 肠阿米巴
 - C. 结核
 - D. 慢性阑尾炎
 - E. 慢性支气管炎
2. 先天性甲状腺功能减低症的治疗中，错误的是
 - A. 需甲状腺素终生治疗
 - B. 临床症状改善， T_4 、TSH 正常，此时甲状腺素剂量可作为维持量
 - C. 甲状腺素治疗维持到青春期即可停药
 - D. 甲状腺素自小量开始逐渐增加剂量
 - E. 出生后 1~2 月开始治疗，可不遗留神经系统损害
3. 关于胎盘生乳素（HPL）下列正确的是
 - A. 是一种甾体激素
 - B. 主要由郎罕细胞分泌
 - C. 随妊娠进展而增加，直至孕末期
 - D. 可用于促排卵
 - E. 葡萄胎时 HPL 升高
4. 有关防止术后肺不张的措施，错误的是
 - A. 术前锻炼深呼吸
 - B. 急性上呼吸道感染病人应先控制感染
 - C. 防止术后呕吐物吸入
 - D. 及时用镇咳药控制咳嗽
 - E. 嗜烟者应术前 1 周禁烟
5. 属于真核细胞型的微生物是
 - A. 螺旋体
 - B. 放线菌
 - C. 真菌
 - D. 细菌
 - E. 立克次体
6. 学龄前期儿童的特点中，错误的是
 - A. 体格发育较前减慢

- B. 智力发育更完善，能做较复杂的动作
C. 能用较复杂的语言表达思维和感情
D. 具有高度的可塑性
E. 脑的发育完全成熟
7. 避孕效率最高的措施是哪一种
A. 复方短效口服避孕药
B. 长效避孕针
C. 宫内放置节育器
D. 安全期自然避孕法
E. 阴道隔膜
8. 以下有关乳癌叙述不正确的是
A. 乳癌最常见的远处转移为肺、骨、肝
B. 乳癌早期表现为无症状乳房肿块
C. 乳癌的大小决定其预后
D. 内分泌治疗是乳癌治疗的一个重要组成部分
E. 乳癌发病率与雌激素水平有明显关系
9. 肾小球滤过的动力是
A. 入球小动脉血压
B. 出球小动脉血压
C. 肾动脉血压
D. 血浆胶体渗透压
E. 有效滤过压
10. 下列物质中哪个不是第二信使
A. IP_3
B. Ca^{2+}
C. cAMP
D. GMP
E. DAG
11. 在致甲亢的各种病因中，哪种最多见
A. 自主性高功能甲状腺结节
B. Graves 病
C. 甲状腺癌
D. 多结节性甲状腺肿伴甲亢
E. 亚急性甲状腺炎伴甲亢
12. 下述局麻药作用哪一项是错误的
A. 阻断电压依赖性 Na^+ 通道
B. 对静息状态的 Na^+ 通道作用最强
C. 提高兴奋阈值
D. 减慢冲动传导
E. 延长不应期
13. 遗忘综合征最常见于下列哪个疾病
A. 慢性酒精中毒
B. 一氧化碳中毒
C. 铅中毒
D. 有机磷中毒
E. 阿托品中毒
14. 12 个月小儿，标准头围是
A. 34cm
B. 38cm
C. 42cm
D. 44cm
E. 46cm
15. 关于目前医院内获得性肺炎的病原学特点，不正确的是
A. 肺炎链球菌少见
B. 需氧革兰阴性杆菌最多见
C. 病原日益复杂多样
D. 金黄色葡萄球菌占 10%
E. 耐药菌株显著高于医院外获得性肺炎
16. 下列哪项不是手术指征
A. 胃溃疡瘢痕性幽门梗阻
B. 胃溃疡经 4 周内科规律治疗无好转
C. 溃疡病急性穿孔伴腹膜炎
D. 胃镜检查发现慢性胃炎
E. 溃疡恶变
17. 根据《医疗事故处理条例》的规定，患者或其家属应当自其知道或应当知道其身体健康受到损害之日起多长时间内向卫生行政部门提出医疗事故争议处理的

- 申请
- A. 15 日
 - B. 3 个月
 - C. 6 个月
 - D. 1 年
 - E. 2 年
18. 下列情况中确定消化性溃疡的主要依据是
- A. 慢性、周期性、节律性疼痛
 - B. 胃液分析胃酸增高
 - C. 查体有剑突下压痛
 - D. 钡餐透视有腔外龛影
 - E. 幽门螺杆菌监测阳性
19. 侵蚀性葡萄胎、绒癌最常见的转移部位是
- A. 脑
 - B. 肺
 - C. 宫旁
 - D. 阴道
 - E. 肾
20. 关于流行病学，下列哪种说法是正确的
- A. 流行病学从基因水平认识疾病
 - B. 流行病学从细胞水平认识疾病
 - C. 流行病学从群体水平认识疾病
 - D. 流行病学从个体水平认识疾病
 - E. 流行病学从分子水平认识疾病
21. 以下关于冠状动脉粥样硬化的易患因素不包括
- A. 高血压
 - B. 高胆固醇
 - C. 糖尿病
 - D. 肥胖
 - E. 甲亢
22. 观察 PPD 试验结果的时间为
- A. 12 小时内
 - B. 12 ~ 24 小时
 - C. 24 ~ 48 小时
 - D. 48 ~ 72 小时
 - E. 72 小时后
23. 关于细菌性阴道病，哪项不正确
- A. 主要由厌氧菌感染
 - B. 阴道排液增加，有恶臭味
 - C. 分泌物为匀质稀薄
 - D. 阴道 pH < 4.5
 - E. 阴道分泌物中找到线索细胞即可诊断
24. 下列各项为肺癌常见症状，除了
- A. 刺激性咳嗽
 - B. 大咯血
 - C. 咳脓痰
 - D. 痰中带血
 - E. 胸痛
25. 基本转录因子中直接识别、结合 TATA 盒的是
- A. TF II A
 - B. TF II B
 - C. TF II D
 - D. TF II E
 - E. TF II F
26. 关于门脉高压症并发食道静脉曲张破裂出血后，哪项错误
- A. 脾比出血前肿大
 - B. 腹水比出血前加重
 - C. 肝昏迷发生率比出血前增高
 - D. 可出现黄疸
 - E. 可发生急性肾功能衰竭
27. 当外界温度等于或高于体表温度时，机体散热的方式是
- A. 辐射
 - B. 传导
 - C. 对流

- D. 蒸发
E. 对流与蒸发
28. 下列不符合缺铁性贫血的检验是
A. 血清铁降低
B. 血清总铁结合力降低
C. 平均红细胞血红蛋白浓度降低
D. 平均红细胞体积降低
E. 血清铁蛋白降低
29. 下列关于股骨干骨折的描述哪一个是正确的
A. 查体时需测出骨擦音才能确定诊断
B. 超过 3 岁的儿童均可采用垂直悬吊牵引
C. 不超过 3 岁的儿童可采用垂直悬吊牵引
D. 产伤引起的新生儿股骨干骨折必须手术治疗
E. 股骨干病理性骨折不需手术治疗
30. Ⅲ度房室传导阻滞，反复发作阿 - 斯综合征，最适宜的治疗是
A. 安装人工心脏起搏器
B. 注射阿托品
C. 静点异丙基肾上腺素
D. 静点肾上腺皮质激素
E. 应用扩张心血管药物
31. 膀胱癌最常见的临床表现是
A. 排尿困难
B. 尿中有腐肉样物排出
C. 无痛性血尿
D. 尿频
E. 尿流中断
32. 一老年患者近来反复出现夜间呼吸困难，被迫坐起，坐起后呼吸困难减轻，最大可能诊断是
A. 心源性哮喘
B. 支气管肺癌
C. 慢性支气管炎
D. 变态反应性肺浸润
E. 肺气肿
33. 导致乳房皮肤出现橘皮样改变是由于
A. 癌性溃疡
B. 皮肤多个瘤样结节
C. 癌灶侵犯库柏韧带
D. 癌灶侵入乳管
E. 癌细胞堵塞皮下淋巴管
34. 可产生血浆凝固酶的细菌为
A. 表皮葡萄球菌
B. 金黄色葡萄球菌
C. 流感嗜血杆菌
D. 军团菌
E. 结核菌
35. Charcot 三联征对什么病有诊断意义
A. 急性化脓性胆管炎
B. 急性出血性胰腺炎
C. 急性胆囊炎
D. 十二指肠憩室
E. 胃、十二指肠溃疡
36. 慢性心房纤颤伴快速心室率，首选治疗措施是
A. 药物复律，使之恢复为窦性节律
B. 积极治疗，预防栓塞并发症
C. 减慢心室率，使心室率控制在 60~80 次/分，活动后心室率加快不超过 100 次/分。
D. 积极治疗原发病因
E. 控制诱发因素
37. 骨盆骨折后急诊导不出尿液时首先应考虑是
A. 膀胱破裂
B. 前尿道损伤

- C. 后尿道损伤
- D. 出血性休克
- E. 肾衰无尿

38. 下列哪种物质中毒具有缺氧和抑制酶的活力双重中毒机理

- A. 硫化氢
- B. 氰化物
- C. 砒霜
- D. 汽油
- E. 棉酚

39. 新生儿溶血症是属于

- A. I 型超敏反应
- B. II 型超敏反应
- C. III 型超敏反应

D. IV 型超敏反应

E. I 型超敏反应 + IV 型超敏反应

40. 下列药物中不属于抑酸药的是

- A. 雷尼替丁
- B. 阿托品
- C. 丙谷胺
- D. 奥美拉唑
- E. 碳酸氢钠

41. 碳酸锂的下述不良反应中哪项是错误的

- A. 恶心、呕吐
- B. 口干、多尿
- C. 肌无力、肢体震颤
- D. 胰岛素分泌减少加重糖尿病症状
- E. 过量引起意识障碍、共济失调

A2 型选择题 (42 ~ 53 题)

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

42. 对长期大量用糖皮质激素治疗疾病的患者，医师所作的下列分析中哪一项是不正确的

- A. 患者可表现出向心性肥胖
- B. 患者血液皮质激素水平较高
- C. 患者血液中促肾上腺皮质激素水平较高
- D. 患者肾上腺皮质束状带萎缩
- E. 所治的疾病痊愈后不应突然停药

43. 某学校食堂数十名学生在进食奶油蛋糕后 2~4 小时，出现恶心、剧烈呕吐，伴有强烈的腹痛，水样泻，体温正常或低热，这些症状最可能是哪一种食物中毒

- A. 沙门菌食物中毒
- B. 亚硝酸盐食物中毒
- C. 副溶血性弧菌食物中毒
- D. 葡萄球菌肠毒素食物中毒

E. 肉毒梭状芽胞杆菌的肉毒毒素食物中毒

44. 患者，男性，32 岁，被开水烫伤，伤及双手和右臂部，双手自腕以下属 II 度烧伤，右臂部为 I 度烧伤，该患者烧伤面积为

- A. 9%
- B. 7%
- C. 5%
- D. 3%
- E. 1%

45. 中年女性，白带增多 2 个月。检查发现宫颈中度糜烂，巴氏涂片 I 级，经激光治疗后，白带减少，宫颈光滑，其修复过程是

- A. 柱状上皮增生修复
- B. 鳞状上皮不典型增生

- C. 鳞状上皮化生
D. 宫颈管腺上皮鳞化
E. 鳞状上皮间变
46. 一个健康婴儿前囟 $1.0\text{cm} \times 1.5\text{cm}$ ，体重 7.2kg ，能独坐一会儿、用手摇玩具，能认熟人和陌生人，其月龄是
A. 3 个月
B. 6 个月
C. 8 个月
D. 10 个月
E. 12 个月
47. 女性，28 岁，既往体健，性格内向，敏感多疑。半年来低热，诊断为系统性红斑狼疮。住院应用肾上腺皮质激素治疗。病情好转，激素量已减低。近 1 个月来说话增多，情绪易激惹，兴奋，躁动。根据患者临床症状应考虑其初步诊断是
A. 精神分裂症
B. 躁狂症
C. 肾上腺皮质激素所致精神障碍
D. 系统性红斑狼疮所致精神障碍
E. 反应性精神病
48. 患者李某，男，45 岁，接受同种异体肾脏移植后 20 天，出现发烧、局部胀痛、肾功能降低、少尿、尿中白细胞增多等症，应首先考虑为
A. 超急排斥
B. 急性排斥
C. 慢性排斥
D. 细菌感染
E. 肾脏供血不全
49. 女性，26 岁，病史不清，昏迷不醒、抽搐来就诊，查体：呼吸困难，皮肤湿冷，瞳孔明显缩小，下列哪种情况可能性大
A. CO 中毒
B. 阿托品中毒
C. 巴比妥类药物中毒
D. 有机磷中毒
E. 脑血管意外
50. 男性，25 岁，近 3 个月反复出现口腔及舌部白斑白膜，涂片及培养均有白色念珠菌。既往体健，但 5 年来沾有吸毒恶习。查体温不高，血 WBC $4.2 \times 10^9/\text{L}$ 。对于查找反复真菌感染的原因，下列各项检查中最有帮助的是
A. 检查血清免疫球蛋白水平
B. 骨髓穿刺检查造血情况
C. 查血糖
D. 抗 HIV 抗体
E. 检查血清补体 C3 水平
51. 男性，25 岁，因车祸受伤 2 小时入院。查体：嗜睡，呼唤能睁眼；回答问题有错误；对疼痛刺激能定位。其 Glasgow 昏迷分级计分应为
A. 12 分
B. 15 分
C. 10 分
D. 9 分
E. 5 分
52. 男性，55 岁，咳嗽、咳痰 10 年，活动时气短 2 年，慢性支气管炎、肺气肿诊断明确，因病情加重伴呼吸困难、紫绀入院，未予吸氧。下列血气结果与之相符的是
A. PaO_2 降低， PaCO_2 升高
B. PaO_2 正常， PaCO_2 升高
C. PaO_2 升高， PaCO_2 正常
D. PaO_2 升高， PaCO_2 升高
E. PaO_2 正常， PaCO_2 降低
53. 患者，男性，20 岁，因车祸伤就诊，测血压 $80/40\text{mmHg}$ ，心率 110 次/分，该患

者应首先输入

A. 10%葡萄糖液

B. 5%葡萄糖液

C. 平衡盐溶液

D. 5%糖盐水

E. 全血

B1 型选择题 (54 ~ 65 题)

答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(54 ~ 56 题共用备选答案)

A. 支气管哮喘

B. 支气管扩张

C. 慢性支气管炎、肺气肿

D. 支气管肺癌

E. 特发性肺间质纤维化

54. 固定性湿啰音 (大水泡音)

55. 弥漫的哮鸣音，呼气相延长

56. 局限性哮鸣音

(57 ~ 59 题共用备选答案)

A. 智力低下，尿有鼠尿臭味

B. 嗜睡、腹胀、便秘、少动

C. 四肢细长、晶状体脱位

D. 特殊面容、高腭弓、通贯手

E. 智力正常、“O”形腿

57. 21 - 三体综合征

58. 苯丙酮尿症

59. 先天性甲状腺功能减低症

(60 ~ 61 题共用备选答案)

A. Hippocrates 法

B. 骨牵引复位法

C. 切开复位法

D. Allis 法

E. 无需牵引，仅用旋转法

60. 桡骨小头半脱位的复位方法是

61. 肩关节前脱位的常用复位方法是

(62 ~ 65 题共用备选答案)

A. 切口分类及愈合记录为“Ⅰ/甲”

B. 切口分类及愈合记录为“Ⅲ/丙”

C. 切口分类及愈合记录为“Ⅱ/甲”

D. 切口分类及愈合记录为“Ⅱ/乙”

E. 切口分类及愈合记录为“Ⅲ/甲”

62. 腹股沟疝修补术，切口愈合良好

63. 右胫腓骨开放骨折，清创内固定后切口愈合良好

64. 腰椎结核伴椎旁冷脓肿病灶清除术，切口愈合良好

65. 胃大部切除术，切口有血肿

A3/A4 型选择题 (66 ~ 80 题)

答题说明

以下提供若干个案例每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(66 ~ 67 题共用题干)

一发热病人，近 5 天来体温维持在 39 ~ 41℃，24 小时内体温波动相差不超过 1℃。查体：腹部玫瑰疹，肝脾肿大。

66. 该病人的热型是

- A. 间歇热
- B. 波状热
- C. 回归热
- D. 稽留热
- E. 弛张热

67. 该病人最可能的诊断是

- A. 败血症
- B. 肾综合征出血热
- C. 伤寒
- D. 疟疾
- E. 风湿热

(68 ~ 70 题共用题干)

男性，60 岁，肠梗阻 3 天入院。查体：血压 70/40mmHg，血钠 125mmol/L，血钾 3.2mmol/L，血气分析 pH7.31。

68. 治疗时首先

- A. 补钾
- B. 给予升压药
- C. 扩容
- D. 纠正酸中毒
- E. 急诊手术解除梗阻

69. 该患者 $[\text{HCO}_3^-]$ 最少高于多少时，不需补充碱剂

- A. 10 ~ 12mmol/L
- B. 12 ~ 14mmol/L
- C. 14 ~ 16mmol/L
- D. 16 ~ 18mmol/L
- E. 以上都不是

70. 若需要补充碱剂，如果补充碱剂过快，患者不会发生下列哪种情况

- A. 手足抽搐
- B. 神志改变
- C. 高钾血症
- D. 低钾血症
- E. 惊厥

(71 ~ 74 题共用题干)

3 岁患儿，曾多次患肺炎，平时无紫绀。查体：心前区隆起，心尖搏动弥散，胸骨左缘第 2 肋间闻及Ⅲ级粗糙的连续性机器样杂音，向颈部传导，有震颤，有水冲脉。

71. 此患儿特别应注意的体征是

- A. 脉压减少
- B. 脉压增宽
- C. 下肢血压低
- D. 腹部血管杂音
- E. 三凹征

72. 血流动力学改变是

- A. 体循环血流量增加